PHARMACOPOEIAS Lille

T.p. without price
Engraved headpiece to dedication

PHARMACOPŒA

INSULENSIS.

PHARMACOPŒA JUSSU SENATUS INSULENSIS

TERTIO EDITA.

INSULIS FLANDRORUM,
Typis J. B. Henry.

M. DCC. LXXII.



NOBILISSIMO
AMPLISSIMOQUE
URBIS INSULENSIS
SENATUI.

QUAM provida ſit veſtra, NOBILISSIMI AMPLISSIMIQUE DOMINI in promovendâ publicâ hujuſce civitatis ſalute cura, vel ſola noſtra res medica loquitur abunde: Collegium namque noſtrum opus veſtrum eſt, veſtriſque

faustis auspiciis non minori laude quam fructu studia Anatomica vigent & Botanica florent. Novum addidistis summi hujus studii vestri documentum, dùm omnibus PharmacopϾ hujus urbis, jussu vestro olim editæ, exhaustis exemplaribus, de novâ editione ageretur: toti huic negotio animum non modo dedistis, sed auctoritate vestrâ illud sustentastis, & ad exoptatam maturitatem deduxistis. Crescet inde & medentium certitudo & ægrotantium solamen: rem promovebunt experti omnes civitatis nostræ in Pharmaciâ Magistri, & vestris pro utilitate publicâ curis planè respondebunt. In nostris nunc est votis, NOBILISSIMI, AMPLISSIMIQUE DOMINI, *ut quam sub vestris auspiciis exaravimus oppellam, quam jussu vestro, Medici rerum Pharmaceuticarum scientissimi, & Pharmacopæi solertissimi, pro rei necessitate emendarunt rescinderunt & amplificarunt, faventer amplectimini & contra omnes malevolos tueri dignemini.*

Ita vovent,

JOANNES-BAPTISTA LESTIBOUDOIS, Medicus, Botanices Professor, à Senatu delegatus.

PETRUS-JOSEPHUS RICQUET, Medicus, à Senatoribus collegii Medicorum pro tempore Assessor.

CATALOGUS

Medicorum Collegii Insulensis, 3ª. die Aprilis 1771.

Petrus-Josephus BOUCHER.
Claudius DIRAT.
Petrus-Antonius-Josephus CARBONNELLE.
Josephus-Servatius VANGRAEFSCEPE DE CYSSAU.
Jacobus-Antonius DEHENNE.
Andreas-Vesien DESOMBRAGES.
Joannes-Baptista LESTIBOUDOIS.
Jacobus-Josephus FAUVEL.
Petrus-Josephus RICQUET.
Elegius-Franciscus DUTEL.
Nicolaus-Josephus SALADIN.
Philippus-Josephus MERLIN.
Joannes-Laurentius DAMBROISE.
Ludovicus-Augustus DE HENNION
Paulus-Josephus MARTIN.
Antonius-Franciscus DESMILLEVILLE.
Leo-Angelus-Franciscus CORROYEZ.
Franciscus-Josephus SIFFLET.
Jocobus-Philippus-Annulphius SALMON.
Franciscus-Josephus LEROUX.
Ludovicus-Franciscus-Ernestus SAVARIN.
Constantius-Fidelis COPLO.

RATIO OPERIS.

PHARMACOPŒA INSULENSIS anno 1640, primùm in-4.° edita, anno 1694, Typis iterùm mandata fuit in-folio, & jam dudum editionis hujus penitùs exhauſtæ nulla proſtabant exemplaria.

ALIUNDE, remedia olim quidem uſitata, at nunc obſoleta, in officinis aſſervare tenebantur hujus urbis Pharmacopœi, qui plurium & laude dignorum à Medicis neoreticis inventorum remediorum formulas deſiderabant.

AD hæc, detecta nova in Naturali Hiſtoriâ, ars Galenica feliciter hodiè reformata, inventa noſtri ſæculi in arte Chymicâ, & applicatio horum omnium ad materiam Medicam, cauſæ erant cur à Medicis & Pharmacopœis, non modò hujus urbis, ſed & totius provinciæ, exoptaretur hæc tertia Pharmacopœæ noſtræ Editio.

HUJUS operis utilitas, neceſſitas, viros materiæ Medicæ ſtudioſos, theoricâ ac practicâ Pharmaceutice peritos, medicamenta in curandis hujus provinciæ morbis expertos, exigebant.

CLAM & confidenter Domini LESTIBOUDOIS & RICQUET, Medici hujus urbis operi niſus ſuos adhibuerunt, & Manuſcriptum novæ Pharmacopœæ codicem SENATUI menſe auguſto anni 1770 obtulerunt; ſed candidè aſſenſi ſunt aliqua in hoc opere eſſe mutanda, emendanda, addenda.

NOS autem à SENATU delegati, hoc diù ſcrutati ſumus mutantes, reſcindentes & addentes, maximè curando ut

& civibus utilem & SENATU noſtro dignam concinnaremus Pharmacopœam.

AT viribus noſtris non confidentes, non modo à Pharmacopœis à SENATU deſignatis nova quædam remedia præparari curavimus, ut certior formularum ratio evaderet; ſed cum cæteris Collegis noſtris pluries communicavimus, & non ſine fructu.

TANDEM, ſic redactum opus, auſpicium SENATUS AMPLISSIMI & civium benevolentiam mereri credimus.

PETRUS-JOSEPHUS BOUCHER, collegii Medicorum Decanus, urbis Scabinus, è Regiâ Scientiarum Academiâ Pariſienſis, Academiæ Regiæ Chirurgicæ Socius, Anatomes & Chirurgiæ Profeſſor à Senatu delegatus.

PETRUS-ANTONIUS-JOSEPHUS CARBONNELLE, collegii Medicorum à Senatoribus pro tempore Aſſeſſor, & curiæ Pharmacopœorum Præfectus.

NICOLAUS-JOSEPHUS SALADIN, collegii Medicorum Syndicus, Matheſeos Profeſſor à Senatoribus delegatus.

PAULUS-JOSEPHUS MARTIN, à Senatoribus collegii Medicorum pro tempore Aſſeſſor.

ADJUNCTI erant Pharmacopœi,

ANTONIUS-SIMON GHESQUIERE, Decanus.

PETRUS-FRANCISCUS DE BRIGODE, Inſpector & Juratus antiquior.

LUDOVICUS-JOSEPHUS DECROIX.

PETRUS-JOSEPHUS BOUDIN.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT DU LIBRAIRE.

LE retard de la publication de cet Ouvrage, eſt dû à des cauſes dont le détail intéreſſeroit peu le Public. La multiplicité des *remaniemens*, pour parler le langage de l'Art Typographique, les contradictions qu'ont éprouvées les premières copies des Auteurs, les additions fréquentes qu'on y a faites, ſont les principales raiſons qui ont empêché la Pharmacopée de paroître dans le temps déterminé par la Souſcription. Si le Public cependant a ſouffert de ces retards, il y gagne ſûrement du côté de l'Ouvrage, qui revu par des perſonnes choiſies dans le Corps de MM. les Médecins de cette Ville, a dû acquérir un nouveau degré de mérite en paſſant par leurs mains. Comme nous ſommes comptables envers le Public, & que tout ce qui pourroit altérer la confiance qu'il doit avoir en nous, eſt de conſéquence dans un moment ſur-tout, où nous ouvrons une Souſcription pour le *Recueil d'Arrêts du Parlement de Flandres*, nous ne pouvons pas laiſſer ignorer que quelques gens en place, ont paru deſirer que nous faſſions paſſer à MM. DE JUSSIEU & MACQUER, de l'Académie des Sciences, une copie imprimée de la Pharmacopée, avant de la rendre publique. Le ſuffrage de deux hommes auſſi célèbres doit donner à cet Ouvrage toute l'authenticité qu'il mérite, & y mettre le ſceau de l'utilité que s'efforceroient en vain de rompre les gens malintentionnés. On trouvera ici la partie de leurs Lettres que l'on peut publier; quant à leurs Obſervations, on a cru devoir les conſerver en entier; tout ce qui vient de pareilles mains eſt toujours précieux.

Il ne nous reſte qu'à rendre compte au Public des ſoins que s'eſt donné M. SALADIN, Médecin, qui a veillé à l'impreſſion de cet Ouvrage; on lui doit d'autant plus de reconnoiſſance qu'il lui a fallu un travail ſuivi pour combiner les différentes corrections qu'on lui a fait paſſer, & ſuivre la meilleure route.

OBSERVATIONS

Sur la Pharmacopée de Lille, par M. DE JUSSIEU, *de l'Académie des Sciences, Médecin de la Faculté de Paris, Démonſtrateur des Plantes au Jardin du Roi, & de la Société Royale de Londres, &c.* (a)

Page 18, *au mot* Anacardium.

LINNÆUS a eu tort de citer l'*Anacardium orientale*, comme ſynonyme de ſon *Bontia germinans.* Ce ſont deux plantes très-différentes. Il faut ſupprimer ici la dernière phraſe.

Page 20, *au mot* Aniſum.

La *Badiane* ou *Anis* étoilé de la Chine, eſt citée dans le *Species* de LINNÆUS, ſous le nom de *Illicium Aniſum.* Sp. ed. 2, p. 664.

Page 29, *au mot* Benzoïnum.

Ce n'eſt pas le *Laurus Benzoin* qui fournit la vraie *Réſine* de Benjoin. Nous ne connoiſſons point encore l'Arbre d'où elle découle; cet Arbre ne croît que dans les Indes Orientales. Le *Laurus Benzoin* ne vient que dans la Virginie & autres pays d'Amérique; ſes feuilles froiſſées ont une odeur approchante de celle du *Benjoin*, ce qui avoit fait croire à BOERHAVE que c'étoit le vrai *Benjoin.*

Page 40, *au mot* Catechu.

C'eſt ſur le témoignage de M. ALBERT, Chirurgien-Major de Pon-

---

(a) *Copie de la Lettre de M.* DE JUSSIEU *à J. B.* HENRY.

M.

. . . .

J'aurois deſiré pouvoir vous renvoyer tout de ſuite........ la Pharmacopée de Lille, que vous m'aviez fait remettre par M......., pour l'examiner & vous faire part de mes obſervations. Je n'y ai trouvé que peu de choſes à changer dans les citations des phraſes Botaniques, & j'ai eu ſoin de les noter à la marge. Cet Ouvrage me paroît bien fait, bien préſenté, & propre à remplir ſon objet. La ſuite qui traitera des Compoſitions, demande beaucoup de préciſion, & doit être ſoumiſe à la critique des Gens de l'Art. C'eſt à eux qu'il faudra vous adreſſer pour avoir un jugement ſûr. Mes avis ne peuvent être reçus que ſur les articles qui traitent de Botanique ou d'Hiſtoire naturelle.......... J'apprendrai avec plaiſir la réuſſite de votre Ouvrage, parce que je m'intéreſſe à tout ce qui contribue à l'utilité publique..............

J'ai l'honneur d'être....... DE JUSSIEU.

tichery, que l'on avoit avancé que le *Cachou* étoit tiré du fruit de l'*Areque*, mais des notions plus exactes, fournies par M. DUPLEIX, certifient que cette substance est une fécule que l'on retire d'un Arbre nommé *Cat-ché.*

Page 55, *au mot* Eruca Sylvestris.

Le *Sinapi Erucæ folio P.* est bien le *Sisymbrium tenuifolium* LINN. Ainsi on peut supprimer l'interrogation. TOURNEFORT les avoit regardé comme différens, mais LINNÆUS & VAILLANT les confondent.

Page 66, *au mot* Hermodactylus.

L'*Hermodactylus folio quadrangulo. T.* n'est point le vrai *Hermodacte* des boutiques. La plante qui fournit ce dernier, n'est point ou peu connue. Par son Bulbe elle paroît être une espèce de *Colchique*, du moins elle ressemble beaucoup au Bulbe du *Colchique* ordinaire.

Page 68, *au mot* Hypocistis.

LINNÆUS dans son *Nov. Systema*, a séparé l'*Hypociste* du genre de l'*Asarum*, dont il différe en effet beaucoup. Il en a fait un genre particulier sous le nom de *Cytinus Hypocistis.*

Page 69, *au mot* Ipecacuanha.

Il n'est par sûr que l'*Ipecacuanha* que nous employons, soit celui que PISON indique. Nous savons seulement que le nôtre est la racine d'une espèce de *Violette*, qui croît en divers lieux de l'Amérique, & en particulier à Cayenne, où BARRERE la cite.

Page 97, *au mot* Rhabarbarum.

La vraie *Rhubarbe* de la Chine, est le *Rheum palmatum.* LINN. & non celle qui est citée ici.

Page 100, *au mot* Sagu.

Le *Cycas circinalis* est un Arbre très-différent de celui qui fournit le *Sagou.* Ce dernier est cité & figuré dans l'*Herbarium amboinense*, *tom.* 1, *p.* 72, *t.* 17. sous le nom de *Sagus seu Palma farinaria.* On y parle très-au long de ses usages & de la manière de retirer le *Sagou.* Les Habitans d'Amboine le nomme *Sagoë.* Il est aussi figuré dans *Seba*, *tom.* 1, *t.* 25.

Page 102, *au mot* Sanguis.

Le *Draco arbor Clus.* qui fournit le vrai *Sang-Dragon* des Canaries, est nommé dans le *Novum Systema Linnæi*, *Drakæna Draco.* Le *Sang-*

Dragon des Indes, qui eſt en larmes, vient de l'Arbre nommé dans KÆMPFER *Dsjerenang*, qui paroît être un eſpèce de *Calamus*, ſelon le caractère de LINNÆUS.

Page 108, *au mot* Simarouba.

Il faut ſupprimer ici la citation de *Burſera gummifera*: c'eſt un Arbre très-différent du vrai *Simarouba*, qui fait un genre à part. Il n'eſt pas encore décrit, mais on connoît ſon caractère, & il ſera publié dans la ſuite des Plantes de Cayenne, qui doit paroître bientôt.

Page 110, *au mot* Styrax.

On a cru juſqu'à préſent que le *Storax calamite* ſe retiroit du *Styrax folio Mali Cotonei*, parce qu'on avoit trouvé ſur cet Arbre quelques grains d'une réſine analogue: mais il eſt conſtaté que le *Storax* découle du *Liquidambar* oriental, dont parle M. DUHAMEL dans ſon traité des Arbres & Arbuſtes.

Page idem, *au mot* Tacamahaca.

Ce n'eſt point l'eſpèce de Peuplier appellé *Tacamahaca*, qui fournit la Gomme de *Tacamahaca*. L'Arbre d'où elle découle, croît dans les Indes Orientales, & nous eſt abſolument inconnu.

OBSERVATIONS

Sur la Pharmacopée de Lille, par M. Macquer, Médecin de la Faculté de Paris, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de Suéde, de la Société Royale de Londres & de Thurin, &c. [a]

Page 164, Gummi purificatio.

CEs fortes d'évaporations doivent fe faire à feu très-doux, & pour le mieux au bain-marie.

Page 165, Ari Fecula.

Il eft bon que dans les Pharmacies il y ait de ces fécules lavées, & non lavées.

Page 166, Catechu purificatio.

Même obfervation que pour le procédé de la purification des Gommes Réfines.

Page 169, Purificatio Nitri.

Le *Nitre* ne fe criftallife à proprement parler que par refroidiffement; & par cette raifon il ne forme point de pellicule, qui n'eft due qu'à la cryftallifation par évaporation. Le vrai moyen de reconnoître fi une diffolution de *Nitre* eft au point de cryftallifation lorfqu'elle eft chaude, c'eft d'en faire refroidir promptement une petite quantité.

Le *Nitre* de la troifième cuite, tel qu'il eft demandé dans le procédé, ne peut fournir qu'une quantité infiniment petite d'eau-mère.

Page 170, Seri Lactis præparatio.

Le petit *Lait* fe clarifie beaucoup mieux en lui faifant prendre quel-

---

[a] *Copie de la Lettre de M. Macquer à J. B. Henry.*

M.

. . . .

J'ai revu avec tout le foin & toute l'attention dont je fuis capable, la partie Chymique de la nouvelle Pharmacopée qu'on fe propofe de publier inceffamment. Je puis vous dire, fans flatterie, Monsieur, que cet Ouvrage m'a paru en général très-bien fait, & que je regarderois comme une grande injuftice, de ne pas ratifier bien fincèrement le jugement avantageux & équitable qu'en a déjà porté le célébre M. de Jussieu; j'ai mis comme lui mes obfervations à la marge; elles ne font pas toutes également importantes; il y en a même qui le font fort peu. Le bien public étant le but du petit travail que j'ai fait à ce fujet, je me trouve affurément plus que récompenfé, fi je puis me flatter d'y avoir contribué par-là en quelque chofe.

J'ai l'honneur d'être........ MACQUER.

ques bouillons avec le blanc d'œuf: d'ailleurs l'ébullition ne cause aucune altération au petit *Lait*, & la quantité de crême de Tartre prescrite ici, peut lui donner une saveur acide.

Page 170, Succorum defecatio.

Il n'y a guère que les Sucs acides ou très-aqueux qui puissent se clarifier ainsi d'eux-mêmes par résidence, tous les autres ont besoin, les uns d'un certain degré de chaleur, les autres de l'ébullition, & la plus part même avec le blanc d'œuf, sans quoi ils ne passeroient point par le philtre, ou passeroient troubles.

Page 182, *ligne dernière.*

Mollioris, n'auroit-il pas été mieux que *liquidi*?

Page 184, Sal Kinæ-kinæ.

Il est bon de détacher cet extrait de dessus les assiettes lorsqu'il est encore un peu chaud, à cause de la promptitude avec laquelle il s'humecte à l'air.

Page 196, Syrupus hordeatus.

Le Sirop d'*Orgeat* est plus agréable sans décoction d'*Orge*.

Page 206, Canon II.

On bannit de plus en plus les Mortiers de cuivre ou de bronse des bonnes Pharmacies, & on leur substitue ceux de marbre, de verre ou de fer, suivant la nature des substances qu'on a à piler.

Page 260, Spiritus Vini rectificatus.

L'épreuve de l'inflammation de la poudre par l'*esprit de Vin*, est infidelle, car comme le meilleur *esprit de Vin* fournit de son eau principe lorsqu'il est décomposé par l'inflammation, il arrive que si l'on brûle sur une petite quantité de poudre beaucoup d'*esprit de Vin* le mieux rectifié, la poudre n'est point enflammée, tandis qu'au contraire un *esprit de Vin* fort médiocre pourra enflammer la poudre, si l'on n'en met qu'une petite quantité sur beaucoup de poudre.

Page 263, Spiritus Aceti.

Les premières portions de la liqueur qui montent à une chaleur douce, sont à la vérité très-peu acides, mais ce sont les plus suaves & les plus spiritueuses. Le véritable acide du vinaigre monte ensuite, mais ce n'est qu'à un degré de chaleur plus fort, & tel que le vinaigre distillé

en contracte néceſſairement une odeur d'empyreume, qu'il paroît par cette raiſon preſque impoſſible d'éviter entièrement.

Page idem, Spiritus vitrioli.

Cette opération ne ſe pratique plus, depuis qu'on a trouvé le moyen d'obtenir l'acide vitriolique du *Soufre*, par un procédé beaucoup moins pénible, moins diſpendieux & moins embarraſſant.

Page 264, *ligne dernière.*

Si l'on veut obtenir de l'*Ether* bien pur, il faut avant cette rectification l'agiter avec un peu d'*Alkali* du *Tartre*, pour le débarraſſer d'un peu d'acide ſulfureux, dont il eſt rarement exempt, ce qui ſeroit un grand inconvénient pour la liqueur d'*Hoffmann.*

Page 265, Spiritus Nitri dulcificatus.

Pluſieurs bons Auteurs preſcrivent de diſtiller ce mélange, dans lequel on fait même entrer une plus grande quantité d'*eſprit de Vin*, & l'acide nitreux en eſt beaucoup plus dulcifié. D'ailleurs lorſque l'*eſprit de Nitre* n'a été ainſi dulcifié que par la ſimple digeſtion, il s'en dégage tant d'air, que tôt ou tard il fait caſſer les bouteilles dans leſquelles on le conſerve, & l'on évite cet inconvénient en le faiſant diſtiller.

Page 266, Spiritus Salis dulcificatus.

Même remarque que pour l'*eſprit de Nitre* dulcifié ci-deſſus, excepté pour le dégagement de l'air.

Page 268, *à la note*, *de* Spiritus Salis ammoniaci cum Calce.

Noms impropres, mais à la vérité uſités.

Page 274, Mercurius ſublimatus.

M. Beaumé a reconnu par beaucoup d'expériences que le *Mercure doux*, ſublimé tant de fois qu'on voudra, n'en devient pas plus doux pour cela, parce que par ces ſublimations il ſe décompoſe toujours une portion de *Mercure doux*, qui devient Sublimé corroſif, d'où il ſuit que quand une fois le *Mercure doux* a été préparé par une ſeule ſublimation, le meilleur moyen de le rendre encore plus doux, c'eſt de le porphiriſer & de le laver, en verſant deſſus de l'eau bouillante, juſqu'à ce que cette eau n'ait plus de ſaveur métallique. L'effet de ce lavage eſt d'enlever une portion de Sublimé corroſif que contient toujours le *Mercure doux*. Ces lavages font prendre au *Mercure doux* une nuance un peu griſe : ſi l'on veut qu'il reſte très-blanc, il faut ajouter environ un gros de ſel *Ammoniac* dans l'eau du lavage, pour une livre de *Mer-*

cure

cure doux, & même plus ; ce Sel d'ailleurs ne change point l'état du *Mercure doux*. Voyez l'*Avant-Coureur*, année 1771.

Page 283, *ligne* 12.

Les *Alkalis* ne verdiſſent pas ſenſiblement la teinture de *Tourne-ſol*.

Page 288, Tartarum Emeticum.

Il eſt bon d'être prévenu que lorſque le verre d'*Antimoine* & la crême de *Tartre* ſont en poudre fine, l'effervefcence qui ſe produit pendant leur combinaiſon, eſt ſi prompte & ſi grande, qu'une bonne partie du mêlange peut ſortir de la baſſine ſi elle eſt bien pleine.

Page 290, Sal mirabile Glauberi.

Ce procédé eſt très-incommode à cauſe des vapeurs de l'acide marin concentré : d'ailleurs ſi on veut le pratiquer, il eſt abſolument inutile que le *Sel marin* ſoit *décrépité*. Il ſemble qu'il auroit mieux valu preſcrire de combiner de l'acide vitriolique, juſqu'au point de ſaturation avec du *Sel de Soude* ; ou prendre le réſidu de quelque opération qui contint le *Sel de Glauber* tout fait, tel que le *caput mortuum* de la diſtillation de l'*eſprit de Sel*, par l'intermede de l'acide vitriolique, ou même la liqueur dont on a retiré le *Sel ſédatif*, par le procédé qui ſuit immédiatement celui-ci.

Page idem, Sal ſedativum.

Aucun acide ne fait la moindre effervefcence avec le *Borax*, l'eſpéce de bouillonnement qu'on apperçoit lorſqu'on verſe de l'acide vitriolique concentré dans la diſſolution de ce *Sel*, ne dure qu'un inſtant, & n'eſt que l'effet de ſon mêlange avec l'eau, car il produit un ſemblable bouillonnement avec l'eau pure, & ce bouillonnement eſt très-différent d'une véritable effervefcence : de plus, il faut une légère ſurabondance d'acide pour que le *Sel ſédatif* puiſſe ſe bien ſéparer & cryſtalliſer.

Page 299, Aqua Calcis.

Les eaux de *Chaux*, première & ſeconde, & même troiſième & quatrième, ſont auſſi fortes les unes que les autres ; ſi l'on veut de l'eau de *Chaux* plus foible, le vrai moyen c'eſt de mêler avec l'eau de *Chaux* ordinaire, la quantité d'eau commune qu'on juge à propos.

AUCTORES CITATI.

ACT. SCIENT. Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris, in-4.
ADV. LOB. Math. de Lobel, Stirpium Adverſaria nova, Antverpiæ, 1576, in-fol.
ARTED. Petri Artedi, Bibliotheca ichthyologica, Lugduni Batavorum 1738, in-8.
ALDROVAN. Uliſſes Aldrovandus, Libri 7, de animalibus inſectis, Bononiæ, 1638, in-fol.

BUFFON. Hiſtoire naturelle, par M. de Buffon, Paris, 1769, in-12.
BOT. MONSP. Petri Magnol, Botanicum Monſpelienſe, Monſpelii, 1686, in-8.
BREYN. Jacobi Breynii, Gedanenſis Prodromus, Gedani, 1680 & 1689, in-4.
ejuſdem Centuriæ Plantarum, Gedani, 1678, in-fol.
BOERH. Hermanni Boerhaavii, de Viribus Medicamentorum, Pariſiis, 1740, in-12.
BRUNF. Othonis Brunfelſii, Herbarum vivæ Icones, Argentorati, 1530, in-fol.
BARRELIER. Plantæ per Hiſpaniam, Italiam & Galliam obſervatæ, *édidit. Antoni de Juſſieu*, Pariſiis, 1714, in-fol.
BRISS. Ornithologia à D. Briſſon, Pariſiis, 1740, in-4.
Le Regne animal, diviſé en neuf claſſes, Paris; 1756, *par le même.*
BOMARE. Mineralogie, par M. Valmont de Bomare, Paris, 1762, in-8.
BEL. AQ. Petri Bellonii de Aquatilibus, Libri 2, Pariſiis, 1553, in-8.
CÆSALP. Andreæ Cæſalpini, de Plantis, Libri 16, Florentinæ, 1583, in-4.
CAM. Joachimi Camerarii Hortus medicus, & phiſoſophicus, Francofurti, 1588, in.4.
Mathioli Epitome, Francofurti, 1586, in-4. *ejuſdem.*
CATESB. Hiſtoire naturelle de la Caroline, par Catesby, Londres, 1756, in-fol.
CLERCQ. Hiſtoire naturelle de l'homme malade, par M. Clercq, Paris, 1768, in-8.

CLUS. Caroli Cluſii, rariarum Plantarum Hiſtoria, Antverpiæ, 1601, in-fol.
De exoticis Libri 10, Anverpiæ, 1605, in-fol.
COMM. HORT. Caſpari Commelini Horti Medici Amſtelodamenſis Deſcriptio, Amſtelodami, 1697, & 1701, in-fol
CRANTZ INST. Inſtitutiones Rhei herbariæ, auctore Crantz, Viennæ Auſtriæ, 1766, in-8.
CORD. IN DIOSC. Valerii Cordi in Dioſcoridem Annotationes, Tiguri 1591, in-fol.
DAL. Samuelis Dalei Pharmacologia, Lugduni Batavorum, 1739.
DILL. Dillenii Hiſtoria Muſcorum, Oxoniis, 1741, in-4.
DOD. Dononei Stirpium Hiſtoriæ Pemptades 6, Antverpiæ, 1616, in-fol.
FUCHS. Leonardi Fuchſii Hiſtoria Stirpium, Baſileæ, 1542, in-fol.
FERMIN. Deſcription de Surinam, par Philippe Fermin, Amſterdam, 1769, in-8.

GEOF. Stephani-Francifci Geoffroy, Tractatus de Materia Medica, Pariſiis, 1741, in-8.

GEOF. PL. Vide. PL.

GESN. Conradi Geſneri Tigurini, hiſtoriæ Animalium Libri 5, Francofurti, 1503,

GRON. J. F. Gronovii Flora virginica, Lugduni-Batav. 1739, in-8.

in-fol.

HERM. PARAD. Pauli Hermanni, Paradiſus Batavus, Lugduni Batav. 1698, in-4.

HERN. MEX. Nova Plantarum Animalium & Mineralium Mexicanorum Hiſtoria Romæ, 1648 & 1651, in-fol.

HORT. LUG. BAT. Horti Academici Lugduno-batavi Catalogus Plantarum, Auctore P. Hermanno, 1687, in-8.

H. R. P. Hortus regius Pariſienſis, Pariſiis 1665, in-fol.

J. B. Joannis Bauhini Hiſtoria Plantarum univerſalis, Ebroduni, 1651, in-fol.

JONST. Jonſton, Hiſtoria naturalis de quadrupedibus, Avibus, &c. Amſtelodami, 1657, in-fol.

KÆMPF. Amœnitatum exoticarum, &c. Faſciculi. Lemgoviæ, 1712, in-4.

LAF. Mémoire ſur le Gins-eng, par François Lafitau, Paris, 1728, in-12.

LIN. Linnæi, Specis Plantarum, editio 2, Holmiæ, 1763, in-8.
Linnæi Syſtema Naturæ, editio 12, Holmiæ, 1767, in-8.
Ejuſdem Mantiſſa *ad calcem editionis* 12, *Syſtematis Naturæ.*
Linnæi Specimen materiæ Medicæ, Holmiæ, in-8.

LUGD. Hiſtoria generalis Plantarum, Lugduni, 1587, in-fol.

LISTER. M. Liſter Hiſtoriæ Animalium Angliæ, Londini, 1678, in-4.

LOB. ICON. Mathiæ Lobelii Plantarum Icones, Antverpiæ, 1581, in-4. oblongo.

LOB. HIST. *Ejuſdem* Hiſtoria Stirpium, Antverpiæ, 1576, in-fol.

MEAD. Richard Mead, Opera omnia, Paris, 1751, in 8.

MARCG. BRAS. Georgii Marcgravii, Hiſtoriæ rerum naturalium Braſiliæ Libri 8, *extant cum G. Piſonis Hiſtoriâ Braſiliæ.*

MATTH. Petri Andreæ Matthioli, Commentarii in Dioſcoridem, Venetiis, 1565, in-fol.

MERIAN. Mariæ Sybiliæ Merian, Metamorphoſis Inſectorum Surinamentium, Amſtelodami, 1705 & 1709, in-fol.

MICHEL. Petri Antonii Michelii, nova Plantarum Genera, Florentinæ, 1729, in-fol.

MONARD. Nicolai Monardes, de ſimplicibus Medicamentis ex occidentali Indiâ delatis, Antverp. 1574, in-8.

MORIS. Roberti Moriſon, Plantarum Hiſtoria univerſalis, Oxonii, 1680, in-fol. & Plantarum umbelliferarum Diſtributio nova, Oxonii, 1672, in-fol.

MUNTING. Abrahami Muntingii Phytographia curioſa, Amſtelodami, 1727, in-fol.

P. Caſpari Bauhini, Pinax Theatri Botanici, Baſileæ, 1671, in-4.

PARK. Joannis Parkenſonii, Theatrum Botanicum, Londini, 1649, in-fol. *ejuſdem* Paradiſus terreſtris, Londini, 1629.

Pis. Guillelmi Pisonis Historia naturalis Brasiliæ, Amstelodami, 1658, in-fol.

Phytant. Joh. Wilh. Weinmanni Phytantozeiconographiæ, Ratisbonæ, 1737, in-fol.

Pomet. Histoire générale des Drogues, Paris, 1735, in-4.

Prosp. Alp. Prosperi Alpini, de Plantis Ægypti, Venetiis, 1633, in-4.

Pl. Description des Plantes & Animaux de la matière Médicale de M. Geoffroy, en 730 Planches, Paris, 1767, in-8.

Pluk. Leonardi Pluknetii Almagestum botanicum, Londini, 1696, in-4. *ejusdem* Almagesti Mantissa, Londini, 1700, in-fol.

Plum. Plumerii nova Plantarum Americanarum Genera, Parisiis, 1703, in-4. *ejusdem*, Species Plantarum Americanarum, *cum priore extat. Ejusdem*, Icones per Burmannum, Amstelodami, 1755, in-fol.

Raj. Joannis Ray, Synopsis methodica piscium, Londini, 1713, in-8. *ejusdem*, Synopsis methodica Stirpium britannicarum, Londini, 1724, in-8. *ejusdem*, Historia Plantarum, Londini, 1686, in-fol. *ejusdem*, Historia Insectorum, Londini, 1710, in-4.

Reaum. Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes, par M. de Reaumur, Paris, 1734, in-4.

Rheed. Mal. Hortus malabaricus, Amstelodami, 1678.

Ruelli. Joannis Ruelli de Naturâ Stirpium, Parisiis, 1536, in-fol.

Rump. Georgii-Everardii Rumphii Herbarium Amboinense, Amstelodami, 1741, in-fol.

Seba. Alberti Sebæ rerum naturalium Thesauri Descriptio, Amstelodami, 1735, in-fol.

Sloan. Hans Sloane Catalogus Plantarum quæ in Jamaïcâ sponte proveniunt, Londini, 1696, in-8. *ejusdem*, Historia Plantarum Jamaïcentium, Londini, 1707, in-fol.

T. Josephi Piton de Tournefort Institutiones rei herbariæ, Parisiis, 1700, *cum Corollario.*

Voyage au Levant, par le même, Paris, 1717, in-4.

Histoire des Plantes qui naissent aux environs de Paris, par le même, Paris, 1725, in-12.

Taber. Icon. Jacobi Theodori Tabernemontani Icones Plantarum, Francofurti, 1590.

Trag. Hieronimi Tragi de Stirpibus, Libri 3, Argentorati, 1552, in-4.

Trew. Christ. Jacobi Trewii, Plantarum selectarum Decuriæ, Norimbergæ, 1750, in-fol.

Vaill. Sebast. Vaillant, Botanicon Parisiense, Parisiis, 1747, in-fol.

Wall. Min. Wallerii Mineralogia, Stockolm, 1747, in-8.

Willis. Thomæ Willis, Opera medica & physica, Lugduni, 1676, in-4.



PHARMACOPŒA INSULENSIS.

PROŒMIUM.

ARS PHARMACOPŒA de Medicamentis tractat.

MEDICAMENTUM ſimplex eſt aut compoſitum: *Simplicia* à naturâ largiuntur; *compoſita* verò à Pharmacopœo fabrefacta ſunt.

Tria naturæ *Regna*, *Vegetabile*, ſcilicet, *Animale* & *Minerale*, tres Medicamentorum ſimplicium *Claſſes* conſtituunt.

Ars Medicamenta conficiendi GALENICA eſt vel CHYMICA. Prior Medicamentorum ſimplicium ſelectionem, præparationem & miſturam, poſterior eorum analyſim & ſyntheſim docet.

PARS PRIMA.

DE MEDICAMENTIS SIMPLICIBUS.

CLASSIS PRIMA.

DE SIMPLICIBUS È VEGETABILI REGNO.

BOTANICA, ſeu PHYTOLOGIA, Vegetabilium cognitionem tradit. Videant tyrones TOURNEFORTII & LINNÆI opera.

VEGETABILIA vel *Noſtratia* ſunt & *Indigena*, vel *Exotica* & è longinquis regionibus allata.

Dividuntur in *Arbores*, *Frutices*, *Suffrutices* & *Herbas*. Horum partes ſunt *Radices*, *Cortices*, *Ligna*, *Folia*, *Flores*, *Fructus*, *Semina*, *Gummi*, *Reſinæ*, *&c.*

GUMMI, inflammationis non capacia, in aquâ ſolâ ſunt ſolubilia: RESINÆ verò, inflammabiles, in oleo & ſpiritu vini ſolvuntur.

Ut materiam medicam cognoſcant faciliùs tyrones, methodicas diviſiones, Tabularum ſynopticarum ope, adjicimus.

TABULA SYNOPTICA.

PLANTARUM EXOTICARUM PARTES.

1. RADICES,

Acori veri.
Anchufæ.
Angelicæ.
Ariftolochiæ.
Behen.
Capparis.
Chinæ.
Contrayervæ.
Cofti arabici.
Curcumæ.
Cyperi.
Dictamni albi.
Galangæ majoris.
Galangæ minoris.
Gentianæ.
Gen-feng.
Glycyrrhizæ.
Hermodactylorum.
Jalappæ.
Ipecacuanhæ.
Ireos florentinæ.
Mechoacannæ.
Pareyræ bravæ.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rhapontici.
Salab.
Sarfæparillæ.
Scillæ.
Senecæ.
Serpentariæ virginianæ.
Spicæ celticæ.
Spicæ indicæ.
Turbith.
Zedoariæ.
Zinziberis.

2. CORTICES,

Cafcarillæ.
Caffiæ ligneæ.
Caffiæ caryophyllatæ.
Cinnamomi.
Cofti indici.
Kinæ-Kinæ.
Simaroubæ.
Suberis.
Tamarifci.
Winterani.

3. LIGNA,

Afpalathi.
Aloës.
Guajaci.
Nephritici.
Rhodii.
Santalorum.
Saffafras.
Xylobalfami.

4. MEDULLÆ,

Sagu, &c.

5. CULMI,

Calami aromatici, &c.

6. FOLIA,

Apalachinæ.
Botryos.
Dictamni cretici.

Malabathri.
Sennæ.
Theæ.

7. FLORES,
Junci odorati.
Stœchadis arabicæ.

8. PISTILLA,
Croci.

9. SEMINA & GRANA,
Agni caſti.
Ammeos.
Amomi racemoſi.
Aniſi.
Bamiæ moſchatæ.
Cardamomi majoris.
Cardamomi minoris.
Carthami.
Carvi.
Cevadillæ.
Coriandri.
Cumini.
Dauci cretici.
Fœniculi dulcis.
Oryzæ.
Petroſelini macedonici.
Seſami.
Seſeleos maſſilienſis.
Staphidis agriæ.
Sementinæ.

10. FRUCTUS.
Amygdalæ.
Anacardium.
Badian.
Balanus myrepſica.
Cacao.
Coffea.
Capſicum.
Caryophylli aromatici.
Carpobalſamum.
Caſſia fiſtulata.
Cocculi orientales.
Colocynthis.
Cubebæ.
Dactyli.
Fabæ indicæ.
Ficus ſiccæ.
Folliculi Sennæ.
Goſſypium.
Granata.
Jujubæ.
Baccæ Lauri.
Baccæ Juniperi.
Macis.
Myrobalani.
Nuces Cupreſſi.
Nuces moſchatæ.
Nuces vomicæ.
Olivæ.
Paſſulæ.
Pinei Nuclei.
Piper nigrum.
Macropiper.
Piſtacia.
Ricinoïdes.
Sebeſten.
Tamarindi.
Vanilla.

11. SUCCI,
LIQUIDI.
Vinum. *Acetum.*
Oleum Olivarum.
Oleum Palmarum.
CONCRETI.
Acacia vera.
Aloë.
Glycyrrhizæ Succus.
Hypociſtis.
Manna.
Catechu.

Opium.
Scammonium.

12. BALSAMA.

Balſamum,
Canadenſe.
Copaïba.
Peruvianum nigrum.
Peruvianum album.
Tolutanum.
Judaïcum.
Liquidambar.
Terebinthina.

13. GUMMI.

Ammoniacum.
Arabicum.
Aſſa-fetida.
Euphorbium.
Galbanum.
Gutta Gamba.
Gummi Hederæ.
Opopanax.
Sagapenum.
Sarcocolla.
Tragacanthum.

14. RESINÆ.

Benzoïnum.
Caranna.
Colophonia.
Copal.
Elemi.
Guajaci.
Gummi Anime.
Lacca.
Sandaracha.
Sanguis Draconis.
Styrax calamita.
Styrax liquida.
Tacamahaca.
Thus.
Pix.

15. GUMMI RESINÆ.

Bdellium.
Maſtiche.
Myrrha.
Labdanum.

16. SALIA.

Essentialia.
Saccharum.
Tartarum.
Lixivialia.
Kali.

PLANTÆ INDIGENÆ.

1. MONOPETALÆ REGULARES.

Diandræ, *ſeu ſtaminib. duobus.*
Veronica.
Beccabunga.

Triandræ, *ſeu ſtaminibus 3.*
Valeriana.

Tetrandræ, *ſeu ſtaminib. 4.*
Gallium luteum.
Apparine.
Rubia tinctorum.
Cruciata.

Pentandræ, *ſeu ſtaminib. 5.*

Monogynæ.

Seminibus 4 *nudis.*
Lithoſpermum.
Cynogloſſum.
Pulmonaria.
Symphytum.

Borrago.
Bugloffum.
CAPSULA SUPRA RECEPTACULUM.
Menyanthes.
Cyclamen.
FRUCTU INFRA RECEPTACULUM.
Caprifolium.
BACCA SUPRA RECEPTACULUM.
Mandragora.
Alkekengi.
Solanum.
Dulcamara.
Frangula.
Rhamnus catharticus.
STAMINIBUS DECLINATIS.
Verbafcum.
Stramonium.
Hyofciamus.
Nicotiana.
DIGYNÆ, *feu piftillis duobus.*
Afclepias.
Gentiana.
TRIGYNÆ, *feu piftillis 3.*
Sambucus.
OCTANDRÆ, *feu ftaminib. 8.*
Thymelæa.
Mezereum.
DECANDRÆ, *feu ftaminib. 10.*
Uva Urfi.
Lujula.
MONADELPHÆ, *feu piftillo excipiente.*
Althæa.
Alcea.
Malva.
MONŒCÆ, *feu flor. mafculin. & femin. feparatìm in eâdem plantâ.*
Momordica.
Cucurbita.
Citrulus.
Melo.
Cucumer.
Bryonia.

2. LILIACEÆ.

TRIANDRÆ, *feu ftaminibus 3.*
Iris noftras.
Colchicum.
HEXANDRÆ, *feu ftaminibus 6.*
HEXAPETALÆ, *feu petalis 6.*
SPATHACEÆ, *feu membranâ inclufæ.*
Allium.
Allioprafum.
Cepa.
Porrum.
NUDÆ, *feu fine fpathâ.*
Lilium album.
Corona imperialis.
Afparagus.
MONOPETALÆ.
Polygonatum.
Lilium convallium.

3. TETRADYNAMÆ, *feu Cruciatæ.*

SILICULOSÆ.
Lepidium.
Nafturtium hortenfe.
Burfa paftoris.
Thlafpi.
Cochlearia.
Raphanus rufticanus.
SILIQUOSÆ.
Cardamine.
Nafturtium aquaticum.
Sifymbrium.
Sophia Chirurgorum.
Eruca.
Eryfimum.
Alliaria.

Barbarea.
Cheiri.
Braſſica rubra.
Napus.
Sinapi.
Glaſtum.

4. LEGUMINOSÆ, *ſeu Papilionaceæ.*

Geniſta.
Galega.
Anonis.
Lupinus.
Colutea.
Faba.
Cicer rubrum.
Lens.
Melilotus.
Orobus.
Fœnugræcum.

5. RINGENTES.

LABIATÆ, *ſeu Gymnoſpermæ.*

DIANDRÆ, *ſeu ſtaminibus 2.*

Verbena.
Roſmarinus.
Salvia.
Horminum.

TETRANDRÆ, *ſeu ſtaminib. 4.*

Bugula.
Polium montanum.
Chamædrys.
Marum.
Chamæpitys.
Satureïa.
Hyſſopus.
Nepeta.
Lavandula.
Scordium.
Betonica.
Sideritis.
Pulegium.
Mentha.
Hedera terreſtris.
Lamium.
Marrubium.
Cardiaca.
Origanum.
Majorana.
Thymus.
Serpillum.
Meliſſa.
Calamintha.
Ocymum.
Brunella.

PERSONATÆ, *ſeu Angioſpermæ.*

DIANDRÆ, *ſeu ſtaminibus 2.*

Gratiola.

TETRANDRÆ, *ſeu ſtaminib. 4.*

COROLLÆ CLAUSÆ.

Euphraſia.
Cymbalaria.
Linaria.

COROLLÆ PATENTES.

Scrophularia.
Digitalis.
Acanthus.

6. POLYPETALÆ REGULARES.

TETRAPETALÆ, *ſeu petalis 4.*

ACALYCINÆ, *ſeu ſine calyce.*

Clematitis.

CALYCE DIPHYLLO, *ſeu duob. foliis.*

Portulaca.
Papaver.

CALYCE TETRAPHYLLO, *ſeu foliis 4.*

Herba Paris.

PENTAPETALÆ, *ſeu petalis 5.*

ACALYCINÆ, *ſeu, ſine calyce.*

Nigella.

Phytolacca.
Helleborus niger.

CALYCE MONOPHYLLO, *seu integro.*
Groſſularia.
Caſtanea equina.
Caryophyllus ruber.
Behen noſtras.
Saxifraga.
Saponaria.
Agrimonia.
Aurantium.
Citreum Malum.

CALYCE PENTAPHYLLO, *seu foliis 5.*
Linum.
Pyrola.
Sedum.
Anacampſeros.
Spergula.
Ruta.
Tilia.
Pæonia.
Chelidonium minus.
Ranunculus bulboſus.
Geranium.
Hypericum.

CALYCE INVOLUCRO.
Eryngium.

HEXAPETALÆ, *seu petalis 6.*
Helleborus albus.
Salicaria.
Berberis.

POLYPETALÆ.
Hepatica nobilis.
Nymphæa alba.

7. ICOSANDRÆ. *Stamina calyci inſerta.*

MONOGYNÆ, *ſeu unico piſtillo.*
Myrtus.
Prunus.
Armeniaca Malus.
Ceraſus.

DIGYNÆ, *ſeu duobus piſtillis.*
Spina alba.

PENTAGYNÆ, *ſeu piſtillis 5.*
Meſpillus.
Pyrus.
Poma.
Cydonium.
Ulmaria.

POLYGYNÆ, *ſeu piſtillis pluribus.*
Roſa.
Rubus.
Fragaria.
Pentaphyllum.
Argentina.
Caryophyllata.

8. UMBELLATÆ.

INVOLUCRO DUPLICI.
Sanicula.
Daucus.
Meum.
Crithmum.
Leviſticum.
Angelica.
Berula.

INVOLUCRO UNICO.
Chærophyllum.
Myrrhis odorata.

INVOLUCRO NULLO.
Anethum.
Fœniculum.
Pimpinella alba.
Apium.
Petroſelinum.

9. COMPOSITÆ.

TUBIPETALÆ, *ſeu Floſculoſæ.*
Dipſacus.

Scabioſa.

Scabiosa.
Bardana.
Carduus.
Cinara.
Eupatorium cannabinum.
Conysa major.
Petasites.
Calcitrapa.
Cyanus.
Tanacetum.
Artemisia.
Abrotanum.
Dracunculus esculentus.
Absinthium.

PLANIPETALÆ, *seu Semi-flosculosæ.*

Scorzonera.
Sonchus.
Lactuca.
Dens Leonis
Pilosella.
Endivia.
Cichorium.

RADIATÆ.

Carlina, *seu* Chamæleon albus.
Tussilago.
Senecio saracenicus.
Virga aurea major.
Enula campana.
Doronicum.
Helianthemum tuberosum.
Bellis.
Matricaria.
Chamæmelum.
Ptarmica Dracunculus.
Ageratum.
Millefolium.
Calendula.

10. APETALÆ, *seu petalo nullo.*

AMENTACEÆ, *seu julo instructæ.*

Betula.
Morus.
Quercus.
Juglans.
Castanea sativa.
Avellana.
Cupressus.
Salix.
Populus.
Sabina.

STAMINEÆ.

TETRANDRÆ, *seu staminibus 4.*

Alchimilla.

PENTANDRÆ, *seu staminibus 5.*

Herniaria.
Bonus Henricus.
Atriplex vulvaria.
Beta.

HEXANDRÆ, *seu staminibus 6.*

Acetosa hortensis.
Lapathum.

OCTANDRÆ, *seu staminibus 8.*

Polygonum.
Persicaria mitis.
Fagopyrum.
Bistorta.

DODECANDRÆ, *seu staminibus 12.*

Asarum.

MONŒCÆ, *seu flor. masculin. & femin. separatim in eadem planta.*

Lenticula.
Buxus.
Urtica.
Ricinus.
Parietaria.
Atriplex hortensis.

DIŒCÆ, *seu flor. mascul. & femin. in plantis diversis.*

Viscum.
Myrtus brabantica.
Cannabis.
Lupulus.
Mercurialis.
Fraxinus.

11. ANOMALÆ, *seu Irregulares.*

MONOPETALÆ.

Tithymalus Cataputia.
Esula.
Aristolochia.
Dracunculus major.

POLYPETALÆ.

Nasturtium indicum.
Dictamnus albus.
Aconitum cæruleum.
Anthora.
Aquilegia.
Fumaria.
Viola.
Satyrium.
Orchis.

12. GRAMINEÆ.

Gramen dactylon.
Avena.
Secale.
Hordeum.
Gramen loliaceum.
Triticum hybernum.

13. CRYPTOGAMÆ, *seu fructificationes inconspicuæ.*

ARBORES.

Ficus.

HERBÆ.

FILICES.

Equisetum.
Ophioglossum.
Filix.
Ceterach.
Lingua cervina.
Adiantum.
Polypodium.

MUSCI.

Muscus vulgaris.
Adiantum aureum.

ALGÆ.

Hepatica fontana.
Lichen.
Auricula Judæ.

FUNGI.

Agaricus quernus.
Crepitus Lupi.



ORDO VEGETABILIUM.

ABIES. *Le Sapin*. Pl. 80.

Abies conis ſurſùm ſpectantibus, ſive mas. P. 505.
Abies Taxi folio, fructu ſurſùm ſpectante. T. 585.
Pinus Picea. Lin. Sp. 1420.

Ex Abiete colligitur in ſylvis Tyrolis & Alſatiæ, TEREBINTHINÆ ſpecies vulgò *de Véniſe ou de Strasbourg* dicta. Eſt reſina Mellis recentis conſiſtentiæ, flaveſcens, acris, amaricans, odore non ingrata. Eligatur fragrans & tranſlucens.

ABIES PICEA. *La Pesse*.

Abies tenuiore folio, fructu deorſùm inflexo. T. 585.
Pinus Abies. Lin. Sp. 1421.

Pix paratur ex Piceæ tædis accenſis, ut & ex aliis arboribus reſinoſis, per ſenectutem nimiâ pinguedine ſtrangulatis. *Vide Pinus sylvestris*.

ABIES CANADENSIS. *Sapinette de Canada*.

Abies minor pectinatis foliis, conis parvis ſubrotundis. Pluk. Alm. 2.
Pinus balſamea. Lin. Sp. 1421.

Balsamum canadense ex Abiete canadenſi fluit.

ABROTANUM MAS. *L'Aurone-male*. *Pl*. 119.

Abrotanum mas anguſtifolium majus. P. 136. T. 459.
Artemiſia Abrotanum. Lin. Sp. 1185.

Herba eſt in uſu.

ABROTANUM FEMINA. *La Garderobe*. *Pl*. 120.

Abrotanum femina foliis teretibus. P. 136.
Santolina foliis teretibus. T. 459.
Santolina Chamæcypariſſus. Lin. Sp. 1179.

Herba eſt in uſu.

ABSINTHIUM MAJUS. *La grande Absinthe.* Pl. 121.

Absinthium vulgare majus. J. B. 3. 168.
Absinthium ponticum, seu romanum officinarum, seu Dioscorid. P. 138. T. 457.
Artemisia Absinthium. Lin. Sp. 1188.

ABSINTHIUM MINUS. *La petite Absinthe.* Pl. 122.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum. P. 138. T. 457.
Artemisia pontica. Lin. Sp. 1187.

Herba est in usu.

ABSINTHIUM SANTONICUM. *Barbotine, ou poudre a vers.*

Absinthium Santonicum gallicum. P. 139. T. 458.
Semen sanctum. Lob. Icon. 756.
Semen Zedoariæ Belgarum. Adv. Lob. 337.
Artemisia Santonicum. Lin. Sp. 1185.

Reperitur in Galliâ Narbonensi. Est spurium Semen contra.

ACACIA VERA. *Le vrai Acacia.* Pl. 95.

Acacia ægyptiaca seu vera. Officinarum.
Acacia foliis Scorpioïdis leguminosæ. P. 392.
Acacia vera. J. B. 429. T. 605.
Mimosa nilotica. Lin. Sp. 1506.

Acacia est succus foris nigricans, rufescens intùs; acerbus, austerus & astringens. Eligendus non nimis nigricans nec friabilis; sed tenax, atque in totum aquâ solubilis. In Ægypto è fructibus immaturis exprimitur, lento igne inspissatus atque induratus ad nos advehitur.

Verum Gummi arabicum, *La Gomme arabique*, vermiculatum est & vix ad nos adfertur. Post incisionem extillat ex Acacia vera. *Vide* Gummi senegalense.

ACACIA NOSTRAS. L'*Acacia de notre Pays.* Pl. 108.

Prunus sylvestris. P. 444. T. 623.
Prunus spinosa. Lin. Sp. 681.

Acacia nostras, seu Germanica officinarum est extractum è fructibus immaturis Pruni sylvestris, in Germaniâ elaboratum.

ACANTHUS. L'*Acanthe ou branche ursine.* Pl. 123.

Carduus Acanthus, seu Branca ursina. J. B. 3. 75.

Acanthus sativus, vel mollis Vergilii. P. 383. T. 176.
Acanthus mollis. LIN. SP. 891.

Folia in usu.

ACETOSA HORTENSIS. L'*Oseille ronde.* PL. 124.

Acetosa rotundifolia hortensis. P. 114. T. 503.
Rumex scutatus. LIN. SP. 480.

Folia, radices, semina in usu.

ACETOSA PRATENSIS. L'*Oseille longue.* PL. 124.

Oxalis vulgaris, folio longo. J. B. 2. 989.
Acetosa pratensis. P. 114. T. 502.
Rumex Acetosa. LIN. SP. 481.

Folia, radices, semina in usu.

ACONITUM CÆRULEUM. L'*Aconit.* PL. 398.

Aconitum cæruleum seu Napellus primus. P. 183. T. 425.
Aconitum Napellus. LIN. SP. 751.

Folia in usu.

ACORUS VERUS. *Le vrai Acore.* PL. 1.

Acorus verus, seu Calamus aromaticus officinarum. P. 34.
Acorus Calamus vulgaris. LIN. SP. 462.

Radix in usu.

ACORUS ADULTERINUS. *Le faux Acore.* PL. 1.

Acorus adulterinus. P. 34.
Iris palustris lutea. T. 360.
Iris Pseudo-Acorus. LIN. SP. 56.

Radix in usu.

ADIANTUM AMERICANUM. *Le Capillaire de Canada.* PL. 125.

Capillus Veneris canadensis. Officinarum.
Adiantum fruticosum brasilianum. P. 355.
Adiantum americanum, Cornuti. T. 543.
Adiantum pedatum. LIN. SP. 1557.

Herba in usu.

ADIANTUM VERUM. *Le Capillaire de Montpellier.* Pl. 125.

Capillus Veneris monspessulanensis. Officinarum.
Adiantum foliis Coriandri. P. 355. T. 543.
Adiantum Capillus Veneris. Lin. Sp. 1558.

Herba in usu.

ADIANTUM ALBUM. *Le Capillaire blanc.* Pl. 127.

Filicula fontana major, sive Adiantum album foliis Filicis. P. 358. T. 542.
Polypodium rhæticum. Lin. Sp. 1552.

Herba in usu.

ADIANTUM NIGRUM. *Le Capillaire noir ou commun.* Pl. 126.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro. P. 355.
Filicula quæ Adiantum nigrum officinarum pinnulis obtusioribus. T. 542.
Asplenium Adiantum nigrum. Lin. Sp. 1541.

ADIANTUM POLYTRICHUM. *Le Polytric.* Pl. 128.

Trichomanes, sive Polytrichum officinarum. P. 356. T. 539.
Asplenium Trichomanes. Lin. Sp. 1540.

Herba in usu.

ADIANTUM RUTA MURARIA. *La Sauve-vie.* Pl. 128.

Salvia vitæ. Officinarum.
Ruta muraria. P. 356. T. 541. Dod. 470.
Asplenium Ruta muraria. Lin. Sp. 1541.

Herba in usu.

ADIANTUM AUREUM. *La Perce-Mousse.* Pl. 129.

Polytrichum aureum majus. P. 356.
Muscus capillaceus major pediculo & capitello crassioribus. T. 550.
Polytrichum commune. Lin. Sp. 1573.

Herba in usu.

AGARICUS. L'*Agaric.* Pl. 116.

Agaricus, sive Fungus Laricis. P. 375. T. 562.
Boletus Abieti-Laricis dictæ. Lin. Mat. Med. 497.

AGARICUS est excrescentia arboris Laricis fungosa, rotundo-angulosa, & inæqualis. Ejus substantia interna candida est & friabilis; externa corticosa, cinerea & subrufa; sapor primò subdulcis, posteà amaricans & acris. Sit fragilis, splendens, candidus & levis.

AGARICUS QUERNUS. L'*AGARIC DE CHÊNE*.

Agaricus pedis equini facie. T. 562.
Boletus igniarius. LIN. SP. 1645.

Fortiter malleo contusus & præparatus, ad sistendas hæmorrhagias inservit.

AGERATUM. L'*EUPATOIRE DE MÉSUÉ*. PL. 130.

Ageratum foliis serratis. P. 221.
Ptarmica lutea suaveolens. T. 497.
Achillea Ageratum. LIN. SP. 1264.

Folia, flores, semina in usu.

AGNUS CASTUS. L'*AGNUS CASTUS*. PL. 131.

Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis. P. 475. T. 603.
Vitex Agnus castus. LIN. SP. 890.

Ejus semina sunt grana rotunda, Pipere minora, coloris cinerei, saporis subastringentis & acris.

AGRIMONIA. L'*AIGREMOINE*. PL. 132.

Eupatorium veterum; sive Agrimonia. P. 321.
Agrimonia officinarum. T. 301.
Agrimonia Eupatoria. LIN. SP. 643.

Folia in usu.

ALCEA. *LA MAUVE SAUVAGE*. PL. 133.

Alcea vulgaris major. P. 316. T. 97.
Malva Alcea. LIN. SP. 971.

Folia, radices in usu.

ALCHIMILLA. *LE PIED DE LION*. PL. 134.

Pes Leonis, sive Alchimilla. J. B. 2. 598.
Alchimilla vulgaris, P. 319, CLUS, *cvij.* T. 58, LIN. SP. 178.

Folia in usu.

ALKEKENGI. L'*Alkekenge ou Coqueret*. Pl. 135.

Solanum veſicarium. P. 166.
Alkekengi officinarum. T. 151.
Halicacabum veſicarium. Cam.
Phyſalis Alkekengi. Lin. Sp. 262.

Fructus in uſu.

ALLIARIA, L'*Alliaire*. Pl. 135.

Alliaria. P. 110. Dod. 886. Fuchs. 104.
Heſperis Allium redolens. T. 222.
Eryſimum Alliaria. Lin. Sp. 922.

Herba in uſu.

ALLIUM, L'*Ail*. Pl. 136.

Allium ſativum. P. 73. T. 383. Lin. Sp. 425.
Radices ſunt in uſu.

ALLIOPRASUM. *La Rocambole*. Pl. 137.

Allium ſativum alterum ſive Allioprаſum caulis ſummo circumvoluto. P. 73. T. 383.
Allium Scorodopraſum. Lin. Sp. 425.
Radices ſunt in uſu.

ALNUS. L'*Aune*. Pl. 138.
Alnus rotundifolia glutinoſa viridis. P. 428. T. 587.
Betula Alnus. Lin. Sp. 1394.
Folia, cortices ſunt in uſu.

ALOE SOCCOTRINA, L'*Aloes succotrin*. Pl. 102.

Aloë ſoccotrina anguſtifolia ſpinoſa flore purpureo. Com. Hort. Amst. *tom*. 1. *pag*. 91. T. 366.
Aloë perfoliata. Lin. Sp. 457.

Eſt ſuccus plantæ in inſulâ Soccoterâ inſpiſſatus & indè aſportatus. Eligatur Aloe pura, lucida, coloris dùm teritur, crocei, ſaporis amari, & odoris non ingrati.

ALOE VULGARIS. L'*Aloes hépatique*. Pl. 103.
Aloë vulgaris. P. 286. T. 366. Dod. 359.

Aloë,

Aloë vera. LIN. SP. 458.

ALOE VULGARIS, ſeu HEPATICA, fuſca foris, intùs hepatis inſtar flaveſcit: colligitur in Chinâ & indè advehitur.

ALOE CABALLINA, ab HEPATICA odore nauſeoſo myrrhato diſtingui poteſt. CABALLINA, etiam ſi multoties aquâ abluatur, rursùſque inſpiſſetur, fetorem ex toto nunquàm amittit.

ALOE BARBADENSIS, in cucurbitis adfertur: SOCCOTRINA non inferior eſt. Colligitur in Barbados Americæ inſulâ.

ALSINE MEDIA. *LA MORGELINE.* PL. 139.

Alſine vulgaris, ſive Morſus Gallinæ. J. B. 3. 363.
Alſine media. P. 250. T. 242. LIN. SP. 389.

Herba in uſu.

ALTHÆA, *LA GUIMAUVE*, PL. 140.

Althæa Dioſcoridis & Plinii. P. 315. T. 97.
Althæa ſive Biſmalva. J. B. 2. 954.
Althæa Ibiſcus. DOD. 655.
Althæa officinarum. LIN. SP. 966.

Tota planta in uſu.

AMMI, L'*AMMI*.

Ammi verum officinarum. DAL. 140.
Ammi parvum, foliis fœniculi. P. 159.
Fœniculum annuum, Origani odore. T. 312.
Siſon Ammi. LIN. SP. 363.

Semen ammeos eſt parvum, ſtriatum, è rufo ſpadiceum, ſaporis aromatici & acris. Eligendum recens, maturum, ſaporis acris. Ex Alexandriâ Ægypti advehitur.

AMMONIACUM GUMMI, *LA GOMME AMMONIAC.*

Ammoniacum officinis & gummi Ammoniacum. P. 494.
Gummi Ammoniacum. PARK. 1544.

Eſt concretum gummoſum & reſinoſum, è magnâ ferulaceâ plantâ Indiæ orientalis extillans, collectum. Eligendum eſt in granis, inſtar Olibani condenſatum & ab arenâ aliiſque quiſquiliis liberum, odoris gravis, Caſtoreum cum Allio redolens, ſaporis amari, parùm acris, digito tractatum molleſcens, exteriùs flavum & candidum intùs.

AMOMUM, L'*Amome*.

Amomum racemosum. P. 413.
Elettari primum. RHEED. MALAB. 11. p. 9. t. 5.

Eſt fructus ſiccus, racematim congeſtus, membranaceus, ſemina è nigro purpurea, anguloſa, rugoſa, aromatica, in capſulis pallidis, ſubovatis, trigonis, includens. Rarò ex Indiâ orientali racemos integros, aut capſulas integras accipimus. PIMENTA vocantur falsò AMOMUM.

AMYGDALUS, L'*Amandier doux*, PL. 141.

AMYGDALUS AMARA, L'*Amandier amer*. PL. 141.

Amygdalus ſativa fructu majori. P. 442. T. 627.
Amygdalus ſylveſtris amara. P. 442. T. 627.
Amygdalus communis. LIN. SP. 677.

AMYGDALUS *arbor* unica reperitur, ſed fructûs ſapore, vel dulci vel amaro, differt. AMYGDALÆ majores, AMBROSINÆ dictæ, non rancidæ, nec vermiculoſæ eligantur. Copioſè in Provinciâ, Occitaniâ & aliis calidis regionibus colitur.

ANACARDIUM, L'*Anacarde*. PL. 60.

Anacardium. P. 511.
Anacardium orientale. JONST. 156.
Œpata. RHEED. MAL. 4. p. 95. t. 45.
Bontia germinans. LIN. SP. 891.

ANACARDIUM OCCIDENTALE, L'*Acajou*. PL. 61.

Anacardii alia ſpecies. P. 512.
Anacardium occidentale. JONST. 156.
Arbor Acajou, vulgò Cajou. PISON. 193.
Anacardium occidentale. LIN. SP. 548.

ANACARDIUM eſt fructus nigricans arboris Indicæ. ANACARDIUM ORIENTALE compreſſi cordis figuram æmulatur, OCCIDENTALE reniforme eſt, & *Acajou* vocatur. Sub involucro duplici nucleum ſolidum albicantem, ſaporis ſubdulcis, condit. In involucri meditullio ſuccus oleoſus ſaporis acris & adurentis reperitur.

ANACAMPSEROS, L'*Orpin*, *ou la Reprise*, PL. 142.

Telephium vulgare. P. 287.
Anacampſeros, vulgò Faba craſſa. J. B. 3. 681. T. 264.

Sedum Telephium. LIN. SP. 616.

Herba in uſu.

ANAGALLIS, *LE MOURON.* PL. 144.

Anagallis flore phœniceo. P. 252. T. 142.
Anagallis mas. DOD. 32.
Anagallis arvenſis. LIN. SP. 211.

Herba in uſu.

ANCHUSA, L'*ORCANETTE.*

Anchuſa monſpeſſulanenſis. Officinarum.
Anchuſa puniceis floribus. P. 255.
Bugloſſum radice rubra, ſive Anchuſa vulgatior floribus cæruleis. T. 134.
Anchuſa tinctoria. LIN. SP. 192.

Radices ANCHUSÆ, ſeu *Alkannæ rubræ*, eligantur parvæ, fibroſæ, quæ purpureæ magis in totâ ſubſtantiâ ſunt; majores enim intùs albicant. Ex Galliæ provinciis & ex Oriente afferuntur.

ANETHUM, L'*ANETH.* PL. 145.

Anethum hortenſe. P. 147. T. 318.
Anethum graveolens. LIN. SP. 377.

Semina in uſu.

ANGELICA, L'*ANGELIQUE DE BOHEME.* PL. 2.

Angelica ſativa. P. 155.
Imperatoria ſativa. T. 317.
Angelica Archangelica. LIN. SP. 360.

Radices, folia, & ſemina in uſu.

ANIME GUMMI, *LA GOMME ANIMÉ.* PL. 82.

Arbor ſiliquoſa ex quâ Gummi Anime elicitur. P. 404.
Courbaril bifolia, fructu pyramidato. PLUM. GEN. 49.
Hymenæa Courbaril. LIN. SP. 537.

Eſt reſina arida, foris albida, intùs palleſcens, aliquatenus tranſlucens, friabilis, ſaporis terebinthinacei. Dùm accenditur odorem ſpargit ſuavem. Ex arbore Novæ Hiſpaniæ & Braſiliæ elicitur, & in fruſtis variæ magnitudinis advehitur.

ANISUM, L'*Anis*. Pl. 146.

Anisum herbariis. P. 159.
Anisum vulgare. Dod. 299.
Apium Anisum dictum, semine suaveolente majori. T. 305.
Pimpinella Anisum. Lin. Sp. 379.

Eligenda semina, matura, majora, stipitibus libera, oblonge rotunda, striata, coloris viridiusculi, saporis dulcis & aromatici.

ANISUM INDICUM, L'*Anis de la Chine*. Pl. 76.

Anisum peregrinum. P. 159.
Anisum stellatum, Badian. Phytant. N.° 138.
Evonymo affinis philippina Anisum spirans. Pluk. Alm. 140.
Badianifera. Lin. Mat. Med. 510.

Capsula seminalis Anisi indici est in usu: stellam fulvo fuscam, in singulo radio granum sæpius condentem, æmulatur. Sapor sit dulcis, Fœniculum & Anisum redolens: capsulæ vel radii sint majores, oleo & sapore prædivites.

ANONIS, L'*Arrête-Bœuf, ou Bugrande*. Pl. 147.

Anonis spinosa, flore purpureo. P. 389. T. 408.
Anonis sive Resta Bovis vulgaris purpurea. J. B. 2 395.
Ononis spinosa. Lin. Sp. 1006.

Radices in usu.

ANTHORA, L'*Anthore*. Pl. 3.

Aconitum salutiferum, sive Anthora. P. 184. T. 425.
Aconitum Anthora. Lin. Sp. 751.

Anthoræ radices sunt bulbi Olivæ magnitudinis, fusci foris, intùs albi coloris. Eligendæ recentes, gustu amaræ, sapore acres, vermibus non exesæ nec cariosæ. In Alpibus & aliis Tirolis & Helvetiæ montibus nascuntur.

APALACHINE, L'*Apalachine, ou Thé de la Mer du Sud*.

Cassine vera Floridanorum arbuscula baccifera, Alaterni fermè facie, foliis alternatim sitis, tetrapyrene. Catesb. 57.

Cassine foliis lanceolatis, alternis, semper virentibus, floribus axillaribus. Mill. *t*. 83. *f*. 2.

Prinos glaber. Lin. Sp. 471.

Folia Apalachines intensivè sunt amara: eorum infusio absque

molestiâ vomitum ciet; ideò apud Americanos magni æstimantur. Reperiuntur & in Africâ.

APPARINE, *Le Grateron*, Pl. 148.
Apparine vulgaris. P. 334. T. 114. Dod. 353.
Gallium Apparine. Lin. Sp. 157.

Herba in usu.

APIUM, L'*Ache.* Pl. 149.

Apium palustre & Apium officinarum. P. 154. T. 305.
Eleoselinum. Dod. 695.
Apium graveolens. Lin. Sp. 379.

Herba in usu. *Vide APIUM DULCE.*

APIUM DULCE, *Le Celeri.*

Apium dulce, Celeri Italorum, H. R. P. T. 305.
Apium graveolens. Lin. Sp. 379.

Apium dulce culturâ tantùm differt ab Apio palustri. Datur alia species Apii palustris sed venenata, quæ *Sium alterum* à *Dodoneo*, & *Cicuta aquatica* à *Gesnero* vocatur, à priori non nisi foliis angustioribus discrepans. Ne hanc cum officinali confundas securiùs Apii dulcis radices in usum vocabis.

AQUIFOLIUM, *Le Houx.* Pl. 150.

Ilex aculeata baccifera folio sinuato. P. 425.
Aquifolium, sive Agrifolium vulgò. J. B. 1. 114. T. 600.
Ilex Aquifolium. Lin. Sp. 181.

Folia in usu.

AQUILEGIA, L'*Ancolie.* Pl. 151.

Aquilegia sylvestris. P. 144. T. 428.
Aquilegia vulgaris. Lin. Sp. 752.

Semina in usu.

GUMMI SENEGALENSE, *La Gomme du Sénégal.*

Acacia indica Farnesiana. Raj. Hist. 977. T. 605.
Mimosa Farnesiana. Lin. Sp. 1506.

Gummi Senegalense cum Gummi arabico virtutibus convenit;

Eligatur inſtar vitri pellucidum, purum & candidum. Nobis ex Guineâ advehitur.

ARGENTINA, L'*ARGENTINE*, PL. 152.

Potentilla. P. 321.
Argentina. DOD. 600.
Pentaphylloides argenteum alatum, *ſeu Potentilla.* T. 298.
Potentilla anſerina. LIN. SP. 710.

Herba in uſu.

ARISTOLOCHIA LONGA, L'*ARISTOLOCHE LONGUE.* PL. 4.

Ariſtolochia longa vera. P. 307. T. 162. LIN. SP. 1364.

Eligantur radices craſſiores, non carioſæ ſed ponderoſæ. In Hiſpaniæ, vinetis & dumetis creſcit.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA, L'*ARISTOLOCHE RONDE.* PL. 4.

Ariſtolochia rotunda flore ex purpurâ nigro. P. 307. T. 162.
Ariſtolochia rotunda. LIN. SP. 1364.

Laudantur radices ponderoſæ, non carioſæ. Advehuntur ex Galliâ & Hiſpaniâ.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS, L'*ARISTOLOCHE DES VIGNES*; *ou SARAZINE.* PL. 5.

Ariſtolochia Clematitis recta. P. 307. T. 162. LIN. SP. 1364.
Ariſtolochia ſaraſenica. DOD. 326.

Eſt radix tenuis, fuſca, multiſque fibris donata, ſaporis amari, acris, ſubaſtringentis, odoris non ingrati. Ex Italiâ & Hiſpaniâ advehitur: naſcitur quoque in Flandriâ.

ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA, L'*ARISTOLOCHE PETITE.* PL. 5.

Ariſtolochia Piſtolochia dicta. P 307. T. 162. LIN. SP. 1364.

Eſt radix ſublutea ex pluribus longis tenuibus filamentoſis radiculis, ab eodem centro prodeuntibus, compoſita, odoris aromatici non ingrati. Ex Galliâ & Hiſpaniâ adfertur. Hæc ARISTOLOCHIÆ ſpecies, *DIOSCORDI* & veteribus Græcis, ignota fuiſſe videtur.

ARMENIACA MALUS, L'*ABRICOTIER*, PL. 153.

Mala Armeniaca majora. P. 442.

Armeniaca fructu majori nucleo amaro. T. 623.
Prunus Armeniaca. LIN. SP. 679.

Nuclei in ufu.

ARTEMISIA, L'*ARMOISE.* PL. 154.

Artemifia vulgaris major. P. 137. T. 460. LIN. SP. 1188.

Variat colore caulis & floris.

EX ARTEMISIA CHINENSI paratur illa lanugo quæ MOXA dicitur.

Herba in ufu.

ARUM, *LE PIED DE VEAU.* 155.

Arum vulgare maculatum & non maculatum. P. 195. T. 158.
Arum maculatum. LIN. SP. 1370.

Radices in ufu.

ARUNDO SACCHARIFERA, *LA CANNE DE SUCRE.* PL. 111.

Arundo faccharifera. P. 18.
Saccharum officinarum. LIN. SP. 79.

SACCHARUM eft fuccus dulcis ex ARUNDINIBUS SACCHARIFERIS expreffus, concretus, & in Salis formam redactus. Hoc Sal Effentiale repetitis folutionibus & purificationibus, variat facchari fpecies: hinc *Saccharum Album*, *Regium*, *Candum*, *&c.*

ASARUM, *LE CABARET.* PL. 156.

Nardus ruftica. Officinarum.
Afarum. P. 197, T. 501. DOD. 358.
Afarum Europæum. LIN. SP. 633.

Folia & radices in ufu.

ASCLEPIAS, *LE DOMPT-VENIN.* PL. 157.

Afclepias flore albo. P. 303. T. 94.
Hirundinaria. TRAG. 180.
Afclepias Vincetoxicum. LIN. SP. 314.

Radices in ufu.

ASPALATHUS, *LE BOIS D'ASPALAT.*

Afpalathus cortice cinereo, ligno purpureo. P. 392.

Lignum Aspalathum, Officinarum.

Eſt lignum arboris exoticæ, reſinoſæ, necdùm ſatis deſcriptæ, ligno Aloës levius, laxius, & pallidius. Ex Indiâ orientali advehitur.

ASPARAGUS, L'*Asperge*. Pl. 158.

Aſparagus ſativa. P. 489. T. 300.
Aſparagus officinalis. Lin. Sp. 448.
Radices in uſu.

ASPERULA, *Le petit Muguet*. Pl. 159.

Aſperula ſive Rubeola montana odora. P. 334.
Apparine latifolia montana humilior. T. 114.
Aſperula odorata, flore albo. Dod. 355. Lin. Sp. 150.
Herba in uſu.

ASSA FŒTIDA, L'*Assa fœtida*. Pl. 99.

Hingiſch umbellifera, leviſtico affinis, radice Aſſam fœtidam fundente. Kempf. Amenit. Exot. 535.
Ferula Aſſafœtida. Lin. Sp. 356.

Assa Fœtida eſt Gummi parùm reſinoſum è grumis albeſcentibus, non numquàm roſei coloris, concretum; fœtor virtutis index, ad Allii odorem accedit, ſapor acris eſt & valdè ingratus, undè *Stercus diaboli* dicitur; è vulneratâ radice manat: recens, candidiſſimum & pingue, ab Aëris & Solis contactu lenteſcit, coloremque ſubrufum induit. Patria ejus ſola eſt Perſia.

ATTRIPLEX, L'*Arroche, ou bonne-Dame*. Pl. 160.

Attriplex hortenſis alba ſive pallide virens. P. 119. T. 505.
Attriplex hortenſis. Lin. Sp. 1493.
Herba in uſu.

ATTRIPLEX VULVARIA, L'*Arroche puante*. Pl. 161.

Attriplex fœtida. P. 119.
Chenopodium fœtidum. T. 506.
Chenopodium Vulvaria. Lin. Sp. 321.
Herba in uſu.

AVELLANA, L'*Aveline, ou Noisette*. Pl. 233.
Nux Avellana, ſive Corylus. Dod. 804.

Corylus

Corylus ſylveſtris. P. 418. T. 582.
Corylus Avellana. LIN. SP. 1417.

Fructus in uſu.

AVENA, L'*AVOINE*, PL. 162.

Avena vulgaris alba aut nigra. P. 23. T. 514.
Avena ſativa. LIN. SP. 118.

Semina in uſu. Ex his fit AVENA EXCORTICATA, *LE GRUAU D'AVOINE.*

AURANTIUM, L'*ORANGER*. PL. 163.

Aurantium, acri medullâ vulgare. T. 620. L'Oranger aigre.
Aurantium, dulci medullâ vulgare. T. 620. L'Oranger doux.
Citrus Aurantium. LIN. SP. 1100.

Fructu acri vel dulci, majori aut minori variat.

AURICULA JUDÆ, L'*OREILLE DE JUDAS*. P. 115.

Fungus membranaceus auriculam referens, ſive ſambucinus. P. 372.
Agaricus Auriculæ formâ. T. 562.
Tremella Auricula. LIN. SP. 1625.
Peziza Auricula. LIN. SYST. NAT. *pag.* 725.

In caudice Sambuci naſcitur. Coloris eſt è cinereo nigricantis. In aquâ molleſcit, & illam mucilaginoſam reddit. Fungis perniciosis accenſetur.

BALANUS MYREPSICA, *LA NOIX DE BEN*. PL. 62.

Glans unguentaria. P. 402.
Ben parvum. MONARDI.

Eſt fructus Avellanæ magnitudinis, triangularis, in putamine corticoſo, cinereo, nucleum pinguem condens. Arbor Myricæ ſimilis in Syriâ & Arabiâ naſcitur, & ab incolis montis Sinaï *Pharagon* dicitur.

BALSAMUM COPAIBA, *LE BAUME DE COPAHU.*

Arbor balſamifera braſilienſis, fructu monoſpermo. RAJ. HIST. 1593.
Arbor Copaïba. PISON. 118.
Copaïfera officinalis. LIN. SP. 557.

BALSAMUM COPAIBA est succus resinosus, ex albo flavescens, acris, amarus, aromaticus & fragrans: recens oleosæ consistentiæ, lapsu verò temporis tenax & glutinosus evadit. È Brasiliâ à Lusitanis in Europam advehitur.

BALSAMUM JUDAICUM, *Le Baume de Judée, ou de la Mecque.*

Balsamum syriacum, Rutæ folio. P. 400.
Balsamum. PROSP. ALP. 48.
Balsamum verum. J. B. 1. 298.
Amyris Opobalsamum. LIN. MANT. 65.

BALSAMUM JUDAICUM Resina est liquida, pretiosa, albicans aut leviter flavescens, fragrantiâ ad Citri odorem accedens, sapore acris & aromatica. Probatur recens quæ fluidior est, oleosa magis & fragrans: improbatur tenacior quæ vetustior & Terebinthinâ aut aliis adulterata mangoniis; quod facilè odore & sapore discernes. Arborem hoc Balsamum fundentem producit Arabia. Lignum dicitur XYLOBALSAMUM, fructus CARPOBALSAMUM.

BALSAMUM PERUVIANUM, *Le Baume du Pérou.*

Cabureiba, seu Balsamum Peruvianum. PISON. 119.
Balsamum ex Peru. J. B. 1. 295.

BALSAMUM PERUVIANUM est succus fluidus, tenax, resinosus, facilè flammam concipiens, suavemque spargens fumum, sapore subacris, odore fragrantissimus. Duplex Balsami Peruviani distinguitur species: nempe STYRAX ALBA, seu BALSAMUM PERUVIANUM ALBUM, ex inciso cortice *Cabureibæ* arboris manat, Terebinthinâ tenuius, limpidum, ex albo flavescens, sapore aliquantum amaro, odore ad Styracem accedente. Alia species, scillicet BALSAMUM PERUVIANUM NIGRUM, coctione ligni & foliorum ejusdem arboris elicitur; est Terebinthinæ consistentiæ, colore è rufo ad nigrum vergit, odore ad Benzoïnum accedit: improbatur minus bene olens & empyreuma referens. Ex Hispaniâ novâ hæ duæ Balsami species afferuntur.

BALSAMUM TOLUTANUM, *Le Baume de Tolu.*

Balsamum Tolutanum, foliis Ceratiæ similibus, quod candidum est. P. 401.
Balsamum de Tolu. J. B. 196.
Toluifera Balsamum. LIN. SP. 1. 549.

BALSAMUM TOLUTANUM est succus resinosus, tenax, mediæ inter

liquidum & densum consistentiæ; coloris è spadiceo ad aureum vergentis; odoris fragrantissimi ad Benzoïni & citri odorem accedentis; saporis dulcis & grati. Temporis lapsu exsiccatur & indurescit ita, ut fragile evadat. Advehitur in cucurbitis parvis ex Americâ meridionali. Circa urbem Tolu colligitur.

BAMIA MOSCHATA, *Graine de Musc.*

Alcea ægyptiaca villosa. P. 317.
Ketmia ægyptiaca, semine moschato. T. 100.
Granum moschatum. Rump. 38.
Hibiscus Abelmoschus. Lin. Sp. 980.

Sunt grana reniformia, pusilla, albicantia, odorem Moschi & Ambræ spirantia. Eligenda probè odorata & recentia. Ex Ægypto advehuntur.

BARDANA, *La Bardane.* Pl. 164.

Lappa major, Arctium Dioscoridis. P. 198. T. 450.
Bardana seu Lappa major. Dod. 58.
Arctium Lappa. Lin. Sp. 1143.

Cortex radicis & folia in usu.

BARBAREA, L'*Herbe de Sainte Barbe.* Pl. 552.

Eruca lutea latifolia, sive Barbarea. P. 98.
Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo. T. 226.
Erysimum Barbarea. Lin. 922.

Herba in usu.

BDELLIUM GUMMI, *Le Bdellium.*

Bdellium. P. 503. Raj. Hist. 1844.

Est lacryma gummosa, ferruginea, nigricans, in grana seu guttas concreta; sapore & odore Myrrham æmulans. Præfertur amarum, translucidum, dum frangitur pingue, odoratum, glebulamque hinc indè exsudantem exhibens. Elicitur ex arbore Guineæ, Arabiæ, & Indiæ, non satis huc usque cognitâ nec descriptâ.

BECCABUNGA, *Le Becabunga,* Pl. 165.

Anagallis aquatica major & minor, folio subrotundo. P. 252.
Veronica aquatica major & minor, folio subrotundo. T. 145.

Veronica Beccabunga. LIN. 16.

Herba in ufu.

BEHEN ALBUM, *LE BEHEN BLANC.* PL. 6.

Behen album. P. 235.
Jacea orientalis patula Carthami facie, flore luteo magno. T. COR. 32.
Centaurea Behen. L. 1292.

Radices BEHEN, optimæ cenfentur majores, non cariofæ, amarore non ingrato.

BEHEN RUBRUM, *LE BEHEN ROUGE.*

Limonium maritimum majus. P. 192. T. 341.
Limonium majus multis, aliis Behen rubrum. J. B. 3. *App.* 876.
Statice Limonium. LIN. SP. 394.

Radix in ufu.

BEHEN NOSTRAS, *LE BEHEN DU PAYS.*

Lychnis fylveftris, quæ Behen album vulgò. P. 205. T. 335.
Cucubalus Behen. LIN. SP. 591.

Herba in ufu.

BELLADONA, *LA BELLE-DAME.* PL. 166.

Solanum melanocerafus. P. 166.
Solanum maniacum multis, five Belladona. J. B. 3. 611.
Belladona majoribus foliis & floribus. T. 77.
Solanum lethale. DOD. 456.
Atropa Belladona. LIN. SP. 260.

Folia in ufu.

BELLIS MAJOR, *LA GRANDE MARGUERITTE.* PL. 167.

Bellis fylveftris, caule foliofo major. P. 261.
Leucanthemum vulgare. T. 492.
Bellis major. DOD. 265.
Chrifanthemum Leucanthemum. LIN. SP. 1251.

Herba & flores in ufu.

BELLIS MINOR, *La Paquerette*. Pl. 167.

Consolida minor. Herbariorum.
Bellis sylvestris minor. P. 261. T. 491.
Bellis perennis. Lin. Sp. 1248.

Folia & flores in usu.

BENZOINUM, *vel* BELZOINUM, *Le Benzoin*. Pl. 83.

Arbor virginiana, Citri vel Limonii folio, Bonzoïnum fundens. Com. Hort. Amst. *tom.* 1. *pag.* 189.
Assa dulcis. Officinarum.
Laurus Benzoin. Lin. Sp. 530.

Benzoinum est resina arida & indurata, è Flavescentibus, rutilantibus & albicantibus grumis in massam coacta; saporis acris, resinosi, odorisque suavis. Optimum quod *Amygdaloïdes* vocatur & maculas candidas, Amygdalarum instar, refert, suavissimumque spirat odorem. Heterogeneis inquinatum minùs pretiosum censetur. Ex arbore vulneratâ extillat in insulis Sumatrâ & Javâ, in regno Siam & in Virginiâ.

BERBERIS, L'*Épine vinette*. Pl. 168.

Berberis dumetorum. P. 454. T. 614.
Spina acida, sive Oxyacantha. Dod. 750.
Berberis vulgaris. Lin. Sp. 471.

Fructus & semina in usu.

BERULA, *La Berle*. Pl. 169.

Sium sive Apium palustre folis oblongis. P. 154. T. 308.
Sium sive Laver Dioscoridis, Olusatri folio, sive Pastinaca aquatica. Lob. Icon. 208.
Sium latifolium. Lin. Sp. 361.

Herba in usu.

BETA, *La Bette ou Poirée*, Pl. 170.

Beta alba vel pallescens, quæ Cicla officinarum. P. 118. T. 502.
Beta Cicla. Lin. Sp. 322.

Herba in usu.

BETA RUBRA, *La Bette-Rave*.

Beta rubra radice Rapæ. P. 118. T. 502.

Beta radice rubrâ crassâ. J. B. 2. 961.
Beta rubra. LIN. SP. 322.

Radix in usu.

BETONICA, *LA BETOINE.* PL. 171.

Betonica purpurea. P. 235. T. 203.
Betonica officinalis. LIN. SP. 810.

Folia & flores in usu.

BETULA, *LE BOULEAU*, PL. 172.

Betula. P. 427. T. 588. DOD. 839.
Betula alba. LIN. SP. 1393.

Folia in usu.

BISTORTA, *LA BISTORTE.* PL. 172.

Bistorta major, radice magis & minus intortâ. P. 192. T. 511.
Polygonum Bistorta. LIN. SP. 516.

Radix in usu.

BOMBAX, *LE COTON.*

Gossypium frutescens, semine albo. P. 430.
Xylon sive Gossypium herbaceum. J. B. 1. 343. T. 101.
Gossypium herbaceum. LIN. SP. 975.

Semen BOMBACIS coloris è nigro cinerei, Pisi magnitudinis, nucleum album, oleosum, dulcem condit. *Gossypium* seu BOMBAX colitur in Malthâ, Siciliâ & aliis Archipelagi insulis.

BONUS HENRICUS, *LE BON HENRI.* PL. 174.

Lapathum unctuosum. P. 115.
Tota bona. DOD. 651.
Chenopodium folio triangulo. T. 506.
Chenopodium Bonus Henricus. LIN. SP. 318.

Herba in usu.

BORRAGO, *LA BOURRACHE.* PL. 175.

Borrago floribus cæruleis. J. B. 3. 574. T. 133.
Borrago officinarum. LIN. SP. 197.

Folia & flores in usu.

BOTRYS VULGARIS, *LE BOTRYS VULGAIRE.* PL. 176.

Botrys ambrosioïdes vulgaris. P. 138.
Chenopodium ambrosioïdes, folio sinuato. T. 506.
Chenopodium Botrys. LIN. LP. 320.

Herba in usu.

BOTRYS AMERICANA, *LE BOTRYS, ou THÉ DU MEXIQUE.* PL. 177.

Attriplex odora suaveolens americana, seu mexicana. MORIS. 2. 605.
Chenopodium ambrosioïdes mexicanum. T. 506.
Botrys ambrosioïdes mexicana. P. 138. & *App.* 516.
Chenopodium ambrosioïdes. LIN. SP. 320.

Sponte crescit in Mexico & Lusitaniâ. Herba in usu.

BRASSICA RUBRA, *LE CHOU ROUGE.* PL. 178.

Brassica capitata rubra. P. 111. T. 219. DOD. 621.
Brassica oleracea rubra. LIN. SP. 932.

Folia in usu.

BRUNELLA, *LA BRUNELLE.* PL. 180.

Brunella major, folio non dissecto. P. 260. T. 182.
Consolida minor. MATH. 703.
Symphitum petræum. LOB. ICON. 474.
Prunella vulgaris. LIN. SP. 837.

Herba in usu.

BRYONIA, *LA BRYONE.* PL. 181.

Bryonia aspera, sive alba, baccis rubris. P. 297. T. 102.
Vitis alba sive Bryonia. J. B. 2. 143.
Bryonia alba. LIN. SP. 1438.

Radix in usu.

BUGLOSSUM, *LA BUGLOSSE.* PL. 183.

Buglossum angustifolium majus, flore cæruleo. P. 256. T. 134.
Anchusa officinalis. LIN. SP. 191.

Folia & flores in usu.

BUGULA, *LA BUGLE.* PL. 184.

Consolida media pratensis cærulea. P. 260.

Bugula. T. 209. DOD. 135.
Ajuga reptans. LIN. SP. 785.

Herba in uſu.

BUNIAS, *LE NAVET SAUVAGE, LA NAVETTE.*

Bunias ſylveſtris, Napus flore luteo. LOB. ICON. 200.
Napus ſylveſtris. P. 95. T. 229.
Neveta. RUELLII.
Braſſica Napus. LIN. SP. 931.

A NAPO SATIVO qui vernaculè *Rape* vocatur, differt NAPUS SYLVESTRIS noſtratibus *Navette* : oleum è ſeminibus expreſſum, *Huile de Navette*; oleum è ſeminibus BRASSICÆ ARVENSIS *Huile de Colſat* nominatur. NAPUS SYLVESTRIS autumno ſeritur in arvis, vere floret. Ejus ſemina *Theriacam* ingrediuntur.

BURSA PASTORIS, *LE TABOURET.* PL. 185.

Burſa paſtoris, major, folio ſinuato. P. 108. T. 216.
Thlaſpi Burſa paſtoris. LIN. SP. 903.

Herba in uſu.

BUXUS, *LE BUIS.* PL. 186.

Buxus arboreſcens. P. 471. T. 578. LIN. SP. 1395.
Lignum in uſu.

CACAO, *LE CACAO.* PL. 63.

Amygdalis ſimilis guatimalenſis. P. 442.
Cacao Americæ, ſeu Avellana mexicana. J. B. 1. 291.
Arbor cacavifera americana. PLUK. 268.
Cacao. CLUS. EXOT. 55.
Theobroma Cacao. LIN. SP. 1100.

THEOBROMÆ arboris fructus CACAO dicuntur : eligantur recentes, integri, pingues & ſapidi; rejiciantur mucidi, carioſi aut quoquò modo corrupti. In Americâ meridionali & Antillis ſpontè *Theobroma* creſcit.

COFFEA, *LE CAFÉ.* PL. 70.

Bon, vel Ban. PROSP. ALP. 36.

Jaſminum

Jasminum arabicum, Lauri folio, cujus semen apud nos Café *dicitur.* Act. Scient. 1713. *pag.* 291.

Coffea arabica. Lin. Sp. 245.

Fructus seu baccæ Coffeæ semina bina, sibi invicem parte planâ cohærentia, & folliculo membranaceo tecta, continent. Variæ nobis afferuntur Coffeæ species, quæ ratione qualitatis differunt; optimæ habentur ex Oriente. Arbor Coffeæ sponte crescit in Oriente, præsertim in Arabiâ & Persiâ; in Americam translata, magnâ in quantitate colitur.

CALAMINTHA ARVENSIS, *Le Pouliot Thym.* Pl. 190.

Calamintha arvensis verticillata. P. 229.
Mentha arvensis verticillata hirsuta. J. B. 3. 217. T. 189.
Mentha arvensis. Lin. Sp. 806.

Herba in usu.

CALAMINTHA MONTANA, *Le Calament de montagne.* Pl. 189.

Calamintha magno flore. P. 229. T. 194.
Calamintha montana præstantior. Lob. Icon. 512.
Melissa grandiflora. Lin. Sp. 827.

Herba in usu.

CALAMINTHA PULEGII ODORE, *Calament a odeur de Pouliot.* Pl. 188.

Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta. P. 228. T. 194.
Calamintha flore minore, odore Pulegii. J. B. 3. 229.
Melissa Nepeta. Lin. Sp. 828.

Herba in usu.

CALAMINTHA VULGARIS, *Le Calament ordinaire.* Pl. 187.

Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ. P. 228. T. 194.
Calamintha montana vulgaris. Lob. Icon. 513.
Melissa Calamintha. Lin. Sp. 827.

Herba in usu. Hæc ultima species ingreditur *Theriacam.*

CALAMUS AROMATICUS, *Le Roseau aromatique.* Pl. 40.

Calamus aromaticus verus. Officinarum.

Calamus aromaticus Syriacus. P. 17.
Calamus odoratus Libani. LOB. ICON. 54.
Arundo Syriaca aromatica foliis ex adverso sitis. MORIS. 3. 221.

Eſt caulis plantæ arundinaceæ inſtar calami aut tubi cavi tenuis, calami ſcriptorii craſſitie, geniculatus, foris pallidè flaveſcens, intùs candidus, medullâ fungoſâ levi, repletus; ſapore acris, ſuaviter amaricans, odore fragrans: probatur fulvus, denſè geniculatus, odoratus. Cùm rarò ad nos afferatur, ACORUS VERUS ejus eſt ſuccedaneus.

CALCITRAPA, *LA CHAUSSE-TRAPE.* PL. 191.

Carduus ſtellatus foliis Papaveris erratici. P. 387.
Carduus ſtellatus ſive Calcitrapa. J. B. 3. 89. T. 440.
Centaurea Calcitrapa. LIN. SP. 1297.

Radix & herba in uſu.

CALENDULA HORTENSIS, *LE SOUCI DE JARDIN.* PL. 192.

Caltha vulgaris. P. 275. T. 498.
Calendula. DOD. 254.
Calendula officinarum. LIN. SP. 1304.

Flores in uſu.

CALENDULA SYLVESTRIS, *LE SOUCI SAUVAGE.*

Caltha arvenſis. P. 276. T. 499.
Calendula arvenſis. TABER. ICON. 335. LIN. SP. 1304.

Hortenſis & ſylveſtris culturâ tantùm differunt. Sola Caltha flore ſimplici venit in uſum.

CAMPHORA, *LE CAMPHRE.* PL. 84.

Camphora officinarum. P. 500.
Arbor camphorifera japonica. BREYN. PROD. 2. *pag.* 16. *icon.* 16.
Laurus camphorifera. KÆMP. AMEN. EXOT. 770.
Laurus Camphora. LIN. SP. 528.

CAMPHORA eſt ſubſtantia volatilis, candicans, pellucida inſtar glaciei; ſaporis acris, aromatici; odoris fragrantis, gravis, penetrantiſſimi. Eligatur ſine maculis, quæ deflagrando tota conſumitur, & in ipſâ aquâ ardet. Prima extractio ſeu potiùs diſtillatio CAMPHORÆ in Japoniâ fit, dein in Europâ ulteriùs purificatur, tandem ad nos venit in panes coacta, figuræ ſæpè orbicularis.

CAMPHORATA, *La Camphrée*. Pl. 193.

Camphorata hirsuta. P. 486. Act. Scient. 1705. *pag.* 313.
Camphorata Monspeliaca. Lob. Icon. 403.
Camphorosma monspeliaca. Lin. Sp. 178.

Herba in usu.

CANELLA ALBA, *La Canelle blanche*.

Costus corticosus. Cortex Winteranus spurius. Officinarum.
Cassia cinnamomea, *seu Cinnamomum sylvestre Barbadensium*. Pluk. Alm. 89. *t.* 161. *fol.* 7.
Winterania Canella. Lin. Sp. 636.

Est cortex in oblongos tubos convolutus, tàm foris, quàm intus albicans; sapore aromaticus, acris; odore gratus. Ad nos advehitur ex insulâ Jamaïcâ & aliis Americæ regionibus.

CANNABIS, *Le Chanvre*. Pl. 194.

Cannabis sativa. P. 320. T. 535. Lin. Sp. 1457.

Semina in usu.

CAPPARIS, *Le Caprier*. Pl. 195.

Capparis spinosa, *fructu minore*, *folio rotundo*. P. 480. T. 261.
Capparis spinosa. Lin. Sp. 720.

Cortex & fructus in usu.

CAPRIFOLIUM, *Le Chevre-feuille*. Pl. 196.

Periclymenum non perfoliatum Germanicum. P. 302.
Caprifolium Germanicum. T. 608. Dod. 411.
Lonicera Periclymenum. Lin. Sp. 247.

Folia & flores in usu.

CAPSICUM, *Le Poivre d'Inde*, *ou de Guinée*. Pl. 459.

Capsicum siliquis longis propendentibus. T. 152.
Piper Indicum vulgatissimum. P. 102.
Capsicum annuum. Lin. Sp. 270.

Fructus in usu.

CARANNA GUMMI, *La Gomme caragne*.

Caranna Monardi. P. 503. Clus. Exot. 298.

CARANNA eſt reſina dura & tenax : recens Picis inſtar ductilis, inveterata fragilis ac dura eſt ; coloris ex viridi nigricantis, ſaporis amari, ingrati ; odoris fragrantis præſertìm dùm accenditur. Ex novâ Hiſpaniâ, in fruſtis cylindraceis, foliis junceis involutis, advehitur.

CARDAMINE, *Le Cresson des Prés.*

Naſturtium pratenſe magno flore. P. 104.
Cardamine pratenſis magno flore purpuraſcente. T. 224.
Flos Cuculi. DOD. 592.
Cardamine pratenſis. LIN. SP. 915.

Folia & ſemina in uſu.

CARDAMOMUM MAJUS, *La Maniguette.* BARREL. ICON. 571.

Cardamomum majus. MATH. 27.
Grana paradiſi officinarum. P. 413.
Mellegetta ſeu Cardamomum piperatum. CORD. IN DIOSC. *lib.* 1. *pag.* 2.
Amomum. Grana paradiſi. LIN. SP. 2.

Sunt grana triquetra, parva, foris ſpadicei coloris, intùs albi, ſaporis acris ut Piper : ex Oriente advehuntur. A quibuſdam AMOMUM pro CARDAMOMO MAJORE venditur.

CARDAMOMUM MEDIUM, *Le Cardamomum moyen.* BARREL. ICON. 571.

Cardamomum majus officinarum. P. 413.

CARDAMOMUM MINUS, *Le petit Cardamomum.* PL. 553. BARREL. ICON. 571. *Obſ.* 1396.

Cardamomum ſimpliciter in officinis dictum. P. 414.
Cardamomi cum ſiliquis ſive thecis longis & brevibus. J. B. 2. 205.
Elettari ſecundum. RHEED. MAL. 11. *p.* 9.
Amomum Cardamomum. LIN. SP. 2.

CARDAMOMUM MEDIUM ET MINUS ſunt ſiliquæ triquetræ, pallidæ, grana anguloſa fuſca continentes. Sint recentes, oleoſæ, ſuave olentes, aromaticæ, ſapore gratæ, ac breviores vel minores. Varia ſiliquarum longitudo ejuſdem plantæ varietas creditur. In Indiis creſcit.

CARDIACA, L'*Agripaume.* PL. 197.

Agripalma. Officinarum.
Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum Theophraſti. P. 230.
Cardiaca. T. 186.
Leonurus Cardiaca. LIN. SP. 817.

Tota planta in usu.

CARDUUS BENEDICTUS, *Le Chardon benit*. Pl. 198.

Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus. P. 378. T. 450.
Carduus benedictus. Dod. 737.
Centaurea benedicta. Lin. Sp. 1296.

Folia & semina in usu.

CARDUUS MARIÆ, *Le Chardon Marie*. Pl. 200.

Carduus albis maculis notatus, vulgaris. P. 381. T. 440.
Carduus marianus, sive lacteis maculis notatus. J. B. 3. 52.
Carduus marianus. Lin. Sp. 1153.

Radix & semina in usu.

CARDUUS HÆMORRHOIDALIS, *Le Chardon Hémorrhoidal*.

Carduus vinearum repens, Sonchi folio, floribus albis, caule tuberoso, qui Hemorrhoïdalis Parisiensium. H. R. P.
Circium arvense, Sonchi folio, radice repente caule tuberoso. T. 448.
Serratula arvensis. Lin. Sp. 1149.

Tubercula seu nodi in caule reperti, aliquandò sunt in usu. Hæc tubercula à puncturâ insecti (*Musca cardui*. Lin. Syst. Nat. *tom.* 1. 998. Reaum. Insect. *t.* 3. *p.* 45. *f.* 12. - 14.) & è succo nutritio ex læsis fibris exsudante, proveniunt.

CARLINA, SEU CHAMELEON ALBUS, *La Carline, le Caméléon blanc*. Pl. 7.

Carlina acaulos magno flore albo. P. 380. T. 500.
Carlina caulifera & acaulis. Bot. Monsp. 292.
Carduus Xerantemos, flore albo ampliore, acaulis. Moris. 3. 162.
Carlina acaulis. Lin. Sp. 1160.

Radix in usu. Est saporis & odoris aromatici grati. In Germaniæ montibus apricis reperitur.

CARLINA IXIA, *Le Caméléon blanc de Dioscoride*. Pl. 8.

Carlina acaulis gummifera. P. 380.
Cnicus Carlinæ folio, acaulos, gummifer, aculeatus, flore purpureo. T. Cor. 33.
Atractilis gummifera. Lin. Sp. 1161.

Oritur in Cretâ & Italiâ. Hæc Carlinæ species rarò nunc est in usu.

CARPOBALSAMUM, *Le fruit du Baumier de Judée.*

Sunt grana, seu baccæ oblongæ, pediculo donatæ brevi; cortice rugoso, fusco, quatuor costis distincto; odore & sapore aromatico grato. In arenosis sterilibusque locis juxtà Mecham & Medinam sponte crescunt *Amyris Opobalsami* frutices. Parum vel nihil balsami ex his producitur, semina tamen vel fructus ferunt copiosos; ut has frutices balsamo prægnantes reddant, in pingue solum transferunt & diligenter colunt Arabiæ Ægyptique incolæ. *Vide* BALSAMUM JUDAICUM.

CARTHAMUS, *Le Saffran batard, la graine de Péroquet.* Pl. 75.

Cnicus sativus, sive Carthamus officinarum. P. 378.
Carthamus officinarum flore croceo. T. 457.
Carthamus tinctorius. Lin. Sp. 1162.

Semina & flores in usu.

CARVI, *Le Carui.* Pl. 202.

Cuminum pratense Carvi officinarum. P. 158.
Carvi Cæsalpini. T. 306.
Carum Carvi. Lin. Sp. 378.

Semina in usu.

CARYOPHYLLATA, *La Benoite.* Pl. 201.

Caryophyllata vulgaris. P. 321. T. 294. Dod. 137.
Geum urbanum. Lin. Sp. 716.

Radix in usu.

CARYOPHYLLUS AROMATICUS, *Le Girofle.* Pl. 59.

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo. P. 410.
Caryophyllus aromaticus Indiæ orientalis, fructu clavato monopyreno. Pluk. Alm. 88. *t.* 155. *fol.* 1.
Caryophyllus aromaticus. Lin. Sp. 735.

Caryophylli, *les cloux de Girofle*, sunt fructus immaturi, vel potiùs calyces florum, arboris *Caryophylli aromatici*, eligendi sunt oleosi, saporis fervidi, & odoris suavis.

Caryophylli majores, *les Girofles mères*, seu Anthophylli, sunt *Caryophylli aromatici* arboris, fructus maturi; Caryophyllis aromaticis crassiores, ac tumidiores, odoris & saporis penè ejusdem. Ex his fructibus sponte arbor propagatur in insulis Moluccis & Amboïnæ: quare Anthophylli *Caryophyllorum mater dicuntur.*

CARYOPHYLLUS RUBER, L'ŒILLET ROUGE. PL. 203.

Tunica. Officinarum.
Caryophyllus maximus ruber. P. 207. T. 329.
Dianthus Caryophyllus coronarius. LIN. SP. 587.

Flores in uſu.

CASCARILLA, *LA CASCARILLE, ou CHACRIL.* PL. 36.

Cortex Eleuterii. Cortex peruvianus aromaticus, ſeu griſeus. Officinarum.
Ricinoïdes Elæagni folio. CATEB. 2. *pag.* 46. *t.* 46. PLUM. *ſpec.* 20. *icon.* 240. *pag.* 1.
Croton Caſcarilla. LIN. SP. 1424.

Cortices CASCARILLÆ, foris coloris ſunt griſei, intus ferruginei; ſaporis acris & amari; odoris, præſertim ſi accendantur, fragrantis quaſi Moſchi: cortices eligantur odorati & reſinoſi. Arbor creſcit in Floridâ & in Peru.

CASSIA, *LA CASSE*, PL. 53.

Caſſia fiſtula alexandrina. P. 403. T. 619.
Caſſia nigra. DOD. 787.
Caſſia fiſtula. LIN. SP. 540.

Eſt ſiliqua longa, cylindracea, corticoſa, nigricans, in loculamenta diviſa; pulpam dulcem nigricantem, cum ſeminibus fulvis, depreſſis, includens. Optima cenſetur Alexandrina, ſive Orientalis: eligatur recens & medullâ gravis. Dantur & ſiliquæ Americanæ quæ craſſiores & breviores ſunt; at pulpam amariuſculam continent.

CASSIA LIGNEA, *LA CASSE LIGNEUSE.*

Arbor canelliforma indica cortice acerrimo, viſcido ſeu mucilaginoſo; quæ Caſſia lignea officinarum vocatur. BREYN. PROD. 2.
Cinnamomum ſeu Canella malabarica, ſeu javanenſis. P. 409.
Laurus Caſſia. LIN. SP. 528.

CASSIA LIGNEA eſt cortex lignoſus inſtar Cinnamomi; odore tamen & ſapore plerumque debiliore, & guſtu mucilaginoſo. Quo magis ad Cinnamomum accedit, eò melior habetur.

CASSIA CARYOPHYLLATA, *LA CANELLE GIROFLÉE.*

Caryophyllus aromaticus fructu rotundo, Garyophyllon Plinii. P. 411. JONST. DENDR. 176.
Caryophyllus folio & fructu rotundo. BREYN. PROD. 2. 26.
Myrtus Caryophyllata. LIN. SP. 675.

CASSIA CARYOPHYLLATA est cortex tenuis, è rufo ferrugineus, in modum tubuli convolutus, sapore & odore caryophyllaceo: eligatur recens, odoratus & sapidus. Arbor in Cubæ, Jamaicæ sylvis & aliis Indiæ regionibus nascitur.

CASTANEA SATIVA, *LE MARRONNIER*. PL. 204.

Castanea sativa. P. 418. T. 584.
Fagus Castanea. LIN. SP. 1416.

Fructus in usu.

CASTANEA EQUINA, *LE MARRONNIER D'INDE*.

Castanea equina folio multifido. J. B. 1. 128. DOD. 814.
Hippocastanum vulgare. T. 612.
Æsculus Hippocastanum. LIN. SP. 488.

Fructus in usu.

CATECHU, *LE CACHOU*. PL. 110.

Palma cujus fructus sessilis Fausel dicitur. P. 510.
Areca Palmæ foliis. J. B. 1. 389.
Areca Catechu. LIN. SP. 1659.

CATECHU, vulgò TERRA JAPONICA, ad vegetabile regnum pertinet. Est succus condensatus è variis vegetabilibus expressus. Basim, succus fructuum *Arecæ* qui *Fausel* dicuntur, constituit. Eligendus resinoso-gummosus, durus purpureo-nigricans, facilè, in aquâ tepidâ solubilis; saporis astringentis, subamari, postmodùm dulcioris & grati, odoris expers. Advehitur ex Indiâ orientali, Pegu, Malabariâ, Bengalâ, &c.

CENTAURIUM MAJUS, *LA GRANDE CENTAURÉE*. PL. 205.

Rhapontica quæ hodie Centaurea major. TRAG. 138.
Centaurium majus, folio in plures lacinias diviso. P. 117. T. 449.
Centaurea Centaurium. LIN. SP. 1287.

Radix in usu.

CENTAURIUM MINUS, *LA PETITE CENTAURÉE*. PL. 206.

Centaurium minus. P. 278. T. 122. DOD. 336.
Gentiana Centaurium. LIN. SP. 332.

Summitates florentes in usu.

CEPA, L'*OIGNON*. PL. 207.

Cepa vulgaris floribus & tunicis candidis vel purpurascentibus. P. 71. T. 382.

Cepe

Cepe sive Cepa rotunda, alba vel rubra. J. B. 2. 547.
Allium Cepa. LIN. SP. 431.

Bulbi in usu.

CERASUS, *LE CERISIER, LES CERISES ROUGES ORDINAIRES.* PL. 210.

Cerasus sativa, fructu rotundo, rubro & acido. P. 449. T. 625.
Prunus Cerasus. LIN. SP. 679.

Fructus in usu.

CERASUS SYLVESTRIS, *LE MÉRISIER, LES CERISES NOIRES.* PL. 211.

Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci nigro colore inficiente. P. 450. T. 626.
Cerasus sylvestris fructu nigro. J. B. 1. 220.
Cerasa nigra. TABER. ICON. 986.
Prunus avium. LIN. SP. 680.

Fructus in usu.

CETARACH, *LE CÉTÉRAC.* PL. 212.

Ceterach officinarum. P. 354.
Asplenium sive Ceterach. T. 544.
Asplenium Ceterach. LIN. SP. 1538.

Herba in usu.

CEVADILLA, SEU SEBADILLUM, *LA CÉVADILLE.*

Hordeum Causticum. P. 23.
Cevadilla officinarum. MONARDI. 343.
Cevadilla Hispanorum. RAJ. HIST. 1246.

Capsulæ seminales CEVADILLÆ sunt oblongæ, gibbosæ, quasi corniculatæ, triloculares; colore nigricante; saporis fervidi, amari, ingrati ut Staphisagria; odoris nullius. CEVADILLA masticata salivam ciet, fauces afficit, & nauseam excitat. È Mexico advehuntur.

CHÆROPHYLLUM, *LE CERFEUILLE.* PL. 213.

Chærophyllum sativum. P. 152. T. 314.
Cerefolium. MATH. 526.
Scandix Cerefolium. LIN. SP. 368.

Tota planta in usu.

CHAMÆDRYS, *La Germandrée.* Pl. 214.

Chamædrys minor repens. P. 248. T. 205. Dod. 43.
Teucrium Chamædrys. Lin. Sp. 790.

Folia & flores in uſu.

CHAMÆMELUM ROMANUM. *La Camomille romaine.* Pl. 215.

Chamomilla romana. Officinarum.
Chamæmelum nobile, ſive Leucanthemum odoratius. P. 135. T. 494.
Anthemis nobilis. Lin. Sp. 1260.

Folia & ſummitates florentes ſunt in uſu.

CHAMÆMELUM VULGARE, *La Camomille des champs.*

Chamæmelum vulgaris, Leucanthemum Dioſcoridis. P. 135. T. 494.
Matricaria Chamomilla. Lin. Sp. 1256.

Hæ duæ ſpecies indiſcriminatìm ſumuntur. Folia & flores ſunt in uſu.

CHAMÆMELUM FETIDUM, *La Camomille fétide.* Pl. 216.

Chamæmelum fetidum. P. 135. T. 494.
Chamæmelum fetidum, ſive Cotula fetida. J. B. 3. 120.
Anthemis Cotula. Lin. Sp. 1261.

Tota planta in uſu.

CHAMÆPITYS, L'*Ivette.* Pl. 217.

Iva arthritica. Officinarum.
Chamæpitys lutea vulgaris ſive folio trifido. P. 249. T. 208.
Teucrium Chamæpitys. Lin. Sp. 787.

Tota planta in uſu.

CHAMÆPITYS MOSCHATA, L'*Ivette musquée.* Pl. 218.

Iva moſchata. Officinarum.
Chamæpitys moſchata, foliis ſerratis, an prima Dioſcoridis? P. 249. T. 208.
Teucrium Iva. Lin. Sp. 787.

Tota planta in uſu.

CHELIDONIUM MAJUS, *La grande Éclaire*. Pl. 219.

Hirundinaria major. Officinarum.
Chelidonium majus vulgaris. P. 144. T. 231. Dod. 48.
Chelidonium majus. Lin. Sp. 723.

Folia & radices in uſu.

CHELIDONIUM MINUS, *La petite Éclaire*. Pl. 220.

Chelidonia rotundifolia minor. P. 309.
Ranunculus vernus, rotundifolius minor. T. 286.
Ranunculus Ficaria. Lin. Sp. 774.

Tota planta & tubercula radicis in uſu.

CHINA, *La Squine*. Pl. 9.

China radix. P. 296.
Smilax minus ſpinoſa, fructu rubicundo, radice virtuoſa, Kina dicta. Kæmpf. Amœn. Exot. 781.
Smilax China. Lin. Sp. 1459.

Chinæ radices ſunt foris fuſcæ, intùs coloris ex albo ruſeſcentis: eligantur recentes, ponderoſæ, reſinoſæ, non carioſæ. In Chinâ & Japoniâ inter Filices & Vepres, in incultis locis luxuriat.

CICERA RUBRA, *Les Pois chiches rouges*. Pl. 221.
Cicer rubrum. Officinarum.
Cicer ſativum, flore ex purpurâ rubeſcente, ſemine rubro. P. 347. T. 389.
Cicer arietinum. Dod. 525. Lin. Sp. 1040.

Semina, Cicera rubra dicta, ſunt in uſu.

CICHORIUM, *La Chicorée sauvage*. Pl. 222.

Cichorium ſylveſtre, ſive officinarum. P. 125. T. 479.
Seris picris. Dioscoridis.
Cichorium intybus. Lin. Sp. 1142.

Tota planta ſine caule in uſu.

CICUTA, *La Cigue*. Pl. 233.

Cicuta major. P. 160. T. 306.
Cicuta major vulgaris. Park. 933.
Conium maculatum. Lin. Sp. 349.

Radices & herba in uſu.

CINARA, L'*ARTICHAUT*. PL. 225.

Cinara hortensis foliis non aculeatis. P. 383. T. 442.
Scolymus non aculeatus. TABER. ICON. 695.
Cinara Scolymus. LIN. SP. 1159.
Radices & capita squammosa in usu.

CINNAMOMUM, SEU CANELLA, *LA CANELLE*. PL. 35.

Cinnamomum seu Canella zeilanica. P. 408.
Laurus Cinnamomum. LIN. SP. 528.

CINNAMOMUM est cortex tenuis, ab exteriore pelliculâ albâ purgatus, canaliculatus, coloris ex flavo rubentis; saporis acris, subdulcis; odoris grati fragrantissimi. Eligendum est Cinnamomum longum, sapidum ac fragrans. In Ceylan colitur.

CITREUM MALUM, *LE CITRONIER, LE CITRON*. PL. 227.

Malus Medica. P. 435.
Citreum vulgare. T. 621.
Citrus Medica. LIN. SP. 1100.
Omnes partes fructûs in usu.

CITRULLUS, *LA CITROUILLE*. PL. 228.

Anguria Citrullus dicta. P. 312. T. 106. DOD. 664.
Cucurbita Citrullus. LIN. SP. 1435.
Fructus & semina in usu.

CLEMATITIS, L'*HERBE AUX GUEUX, LA VIORNE*. PL. 625.

Clematitis sylvestris latifolia. P. 300. T. 293.
Vitalba. DOD. 404.
Clematitis Vitalba. LIN. SP. 766.
Folia & cortex secundus in usu.

COCCULUS, *LA COQUE DU LEVANT*.

Cocculæ officinarum. P. 5111.
Solanum racemosum indicum arborescens, Cocculos Indos ferens. RAJ. DENDR. 115.
Menispermum Cocculus. LIN. SP. 1468.

COCCULUS est fructus fusco & rugoso cortice tectus, baccarum Lauri magnitudine, rotundior tamen. Ex Oriente affertur.

COCHLEARIA, L'*Herbe aux cuillers.* Pl. 229.

Cochlearia folio ſubrotundo. P. 110. T. 215.
Cochlearia officinalis. Lin. Sp. 903.

Tota planta in uſu.

COLCHICUM, *Le Colchique.* Pl. 230.

Colchicum commune. P. 67. T. 348.
Colchicum autumnale. Lin. Sp. 485.

Radix in uſu.

COLOCYNTHIS, *La Coloquinte.* Pl. 52.

Colocynthis fructu rotundo major & minor. P. 313. T. 107.
Cucumis Colocynthis. Lin. Sp. 1435.

Colocynthidis fructus eſt Pomi mediocris magnitudinis, in ſubſtantiâ fungoſâ, ſemina albicantia & plana includit. Eligatur alba, levis, amara, & à cortice exteriori mundata. È Syriâ & ex aliis orientalibus Regionibus aſportatur.

COLOPHONIA, *La Colophone, Le Bray sec.*

Colophonia officinarum. P. 504.

Eſt reſina ſicca Abietina, lento igne ad conſiſtentiam friabilem cocta. Fit etiam ex reſiduo Olei Terebinthinæ.

COLUTEA VESICARIA, *Le Baguenaudier, ou faux Séné.*

Colutea veſicaria. P. 396. T. 649. Dod. 784.
Senna Mauritanorum. Ruellii. 194.
Colutea arboreſcens. Lin. Sp. 1045.

Folia in uſu.

CONYZA MAJOR, *La Conise, La chasse Puce.*

Conyza major vulgaris. P. 265. T. 454.
Conyza major. Math. 870.
Conyza ſquarroſa. Lin. Sp. 1205.

Tota planta in uſu.

CONSOLIDA MAJOR, *La grande Consoude.* Pl. 231.

Symphytum Conſolida major. P. 259. T. 138.

Symphytum officinale. LIN. SP. 195.

Radices, folia & flores in uſu.

CONTRAYERVA, *Le Contrayerva.* PL. 10.

Cyperus longus odoratus peruvianus. P. 14.
Contrayerva Hiſpanorum, ſive Drakena. CLUS. EXOT. 83.
Dorſtenia Sphondylii folio, Dentariæ radice. PLUM. GEN. 29. *Icon.* 119.
Dorſtenia Contrayerva. LIN. SP. 176.

CONTRAYERVÆ radices ſunt nodoſæ & fibroſæ, coloris extùs rufi, intùs pallidi. Optimæ cenſentur recentes, ponderoſæ, ſaporis ſubaſtringentis, aromatici, præditæ. *Dorſtenia*, in novâ Hiſpaniâ, Mexico, Peru, Tabago, & inſulâ Sancti Vincentii naſcitur.

COPAL GUMMI, *La Gomme copal.*

Rhus obſoniorum ſimilis americana non ſerrata....... gummi candidum fundens. PLUK. ALM. 318. *t.* 56. *f.* 1.
Rhus Virginianum Lentiſci foliis. RAJ. HIST. 1799.
Rhus Copallinum. LIN. SP. 380.

GUMMI COPAL eſt reſina fragilis, difficilis ſolutionis, diaphana, ex albo flaveſcens, dùm prunis injicitur odorata. Sponte ex arboribus defluit, & non raró ab imbribus ad ripas fluminum abripitur: quod forsàn anſam dedit hanc *Succinum vegetabile* appellandi. Arbor creſcit in Americâ ſeptentrionali. Americani, omnes ferè reſinas tranſlucidas ſub nomine *Copal*, indigitare ſolent.

CORALLINA, *La Coralline.* PL. 39.

Ex Mediterraneo Mari colligitur, rupibus, conchis, ſub aquâ adhæret. Saporis & odoris eſt ingrati, ſubſalſi, piſculenti. Præfertur integra, albicans, viridiuſcula, griſea, nec ſabulo nec conchis commixta.

CORALLIUM ALBUM, *Le Corail blanc.*

CORALLUM ſeu CORALLIUM ALBUM, RUBRO rarius eſt, & ſolo colore ab eo diſcrepat; ejus loco *MADREPORA* plerumquè venditur.

CORALLIUM RUBRUM, *Le Corail rouge.* PL. 39.

CORALLUM RUBRUM eligitur pulchrè rubens & à ſordibus liberum. Variis in locis præprimis in Mediterraneo Mari, ad littora Provinciæ,

Cataloniæ, & Siciliæ oras, in fundo Maris & in rupium cavernis reperitur.

NOTA. CORALLINA, CORALLIUM ALBUM & RUBRUM ex obſervationibus clariſſ. *DE JUSSIEU* (*Act. Acad. Regiæ Scient. Par. anni.* 1742.) POLYPORUM ſpecies ſunt, ſive vaginarum contextus, & receptacula Inſecti cujuſdam marini. Ad Regnum Animale has ſubſtantias pertinere conſtat, cùm omnem animalem calcem, animalium eſſe productum veriſſimum ſit. *Vide MADREPORA & ISIS NOBILIS* in Regno Animali.

CORIANDRUM, *LA CORIANDRE.* PL. 232.

Coriandrum majus. P. 158. T. 316.
Coriandrum ſativum. LIN. SP. 367.

Semina in uſu.

CORNUS, *LE CORNOUILLER.* PL. 233.

Cornus hortenſis mas. P. 447. T. 641.
Cornus mas. LIN. SP. 171.

Fructus in uſu.

CORONA IMPERIALIS, *LA COURONNE IMPÉRIALE.*

Lilium ſive Corona imperialis. P. 79.
Corona imperialis. T. 372. DOD. 201.
Fritillaria Imperialis. LIN. SP. 435.

Bulbus in uſu.

CORONOPUS, *LA CORNE DE CERF.*

Coronopus hortenſis. P. 190. T. 128.
Herba ſtellata, ſeu Cornu cervinum. DOD. 109.
Plantago Coronopus. LIN. SP. 166.

Herba in uſu.

CORTEX WINTERANUS, *L'ÉCORCE DE WINTER.* PL. 35.

Laurifolia Magellanica, cortice acri. P. 461.
Periclymenum rectum, foliis laurinis, cortice acri aromatico. SLOAN. PHIL. TRANS. N.° 284.

WINTERANUS cortex eſt craſſus, canaliculatus; foris, integumento

cinereo, fungoso, inæquali, fisso, ac multis rimis hiante, obductus; intùs solidus, densus, pallidus; saporis acris, aromatici; odoris fragrantissimi. È Jamaïcâ, Barbadâ & Terrâ Magellanicâ asportatur.

COSTUS ARABICUS, *Le Costus arabique.* Pl. 11.

Costus arabicus Dioscoridis. P. 36.
Costus indicus, Violæ martiæ odore. Mus. Zeyl. 58.
Chiansou Sinensium, Tsjana-Kua. Rheed. Malab. 2. *t.* 8.
Costus arabicus. Lin. Sp. 2.

Costi arabici radices sunt solidæ, crassæ, oblongæ, interdùm per medium sectæ; buxei extùs, intùs albicantis coloris; odoris ad Iridem florentinam accedentis. Costus, ex Arabiâ & Syriâ olim advectus, Arabicus & Syriacus dicebatur: jam in Malabariæ, Brasiliæ, & Surinamæ nemoribus crescit.

CREPITUS LUPI, *La Vesse de Loup.* Pl. 279.

Fungus rotundus orbicularis. P. 374.
Fungus pulverulentus, dictus Crepitus Lupi. J. B. 3. 848.
Lycoperdon vulgare. T. 563.
Lycoperdon Bovista. Lin. Sp. 1653.

Est fungus levis, non raró pugni magnitudine; cortice tenui, cinereo vestitus. Semen in hoc fungo contentum pulvis est tenuissimus vix conspicuus, dùm maturuit, instar fumi in auras avolans.

CRITHMUM, *La Baccille, ou Perce-Pierre.*

Crithmum, sive Fœniculum maritimum minus. P. 288. T. 317.
Fœniculum marinum seu Empetrum aut Calcifraga. Lob. Icon. 392.
Crithmum maritimum. Lin. Sp. 354.

Herba in usu.

CROCUS, *Le Safran.* Pl. 46.

Crocus sativus. P. 65. T. 350.
Crocus autumnalis sativus. Moris. 2. 335. *f.* 4. *t.* 2. *f.* 1.
Crocus sativus officinalis. Lin. Sp. 50.

Pistillorum Stigmata florum Croci sativi autumnali tempore florentis sunt in usu. Crocus censetur optimus qui neque nimis pinguis neque nimis marcidus est: color sit purpureus, ad aureum inclinans, exiguâ quantitate magnam aquæ copiam tingens; sapor amariusculus, & odor fragrans. Colitur in multis regionibus, præfertur Vastiniensis, *le Safran du Gatinois.*

CRUCIATA,

CRUCIATA, *La Croisette.* Pl. 235.

Cruciata hirsuta. P. 335. T. 115.
Valantia Cruciata. Lin. Sp. 1491.

Tota planta in usu.

CUBEBÆ, *Les Cubèbes, Le Poivre a queue.* Pl. 51.

Cubebæ. J. B. 2. 190.
Arbor baccifera brasiliensis, fructu Piper resipiente. Raj. Hist. 1593.
Cubebæ vulgares officinarum. Geof. Mat. Med. *t.* 2. 376.

Cubebæ sunt grana, exiguo donata petiolo, rugosa, intùs quodammodo cava & parvum nucleum continentia; Piperis magnitudine, coloris fusci, saporis acris, aromatici, subamari. Eligantur majores, recentes, ponderosæ & oleosæ. È Javâ insulâ advehuntur.

CUCUMER, *Le Concombre.* Pl. 236.

Cucumis sativus vulgaris, maturo fructu subluteo. P. 310. T. 104.
Cucumis vulgaris. Dod. 662.
Cucumis sativus. Lin. Sp. 1437.

Semina in usu.

CUCUMER SYLVESTRIS, *Le Concombre sauvage.* Pl. 237

Cucumis sylvestris, Asininus dictus. P. 314. T. 104.
Momordica Elaterium. Lin. Sp. 1434.

Tota planta in usu.

CUCURBITA, *La Courge, ou Calebasse.* Pl. 238.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. P. 313. T. 107.
Cucurbita longior. Dod. 669.
Cucurbita lagenaria. Lin. Sp. 1434.

Semina in usu.

CUMINUM, *Le Cumin.* Pl. 239.

Cuminum semine longiore. P. 146.
Fœniculum orientale, Cuminum dictum. T. 312.
Cuminum Cyminum. Lin. Sp. 365.

Semina in usu.

CUPRESSUS, *Le Cyprès*. Pl. 240.

Cupressus. P. 488.
Cupressus metâ in fastigium convolutâ, quæ femina Plinii. T. 587.
Cupressus semper virens. Lin. Sp. 1422.

Nuces, seu *Coni* sunt in usu.

CURCUMA, *Le Safran des Indes*. Pl. 12.

Curcuma, sive Terra Merita officinarum radice crocea. J. B. 2. 746.
Curcuma radice longa. Hort. Lug. Bat. 209.
Curcuma longa. Lin. Sp. 3.

Radices Curcumæ eligantur recentes, ponderosæ, intùs flavæ, non cariosæ, saporis aromatici. Ex Indiâ orientali advehuntur.

CUSCUTA, *La goutte de Lin*. Pl. 241.

Cuscuta major. P. 219. T. 652.
Cassutha. Dod. 554.
Cuscuta Europæa. Lin. Sp. 180.

Est planta parasitica, sine radicibus conspicuis, sine foliis, Linum, Urticam, variasque quas fugit plantas arcto nexu amplectens.

CUSCUTA EPITHYMUM, *L'Épithym*.

Epithymum, sive Cuscuta minor. P. 219. T. 652.
Cuscuta Epithymum. Lin. Sp. 180.

Hæc Cuscutæ species Epithymum vocatur quia Thymo adhæret. Præfertur Italica & Cretica.

CYANUS, *Le Bleuet*. Pl. 242.

Cyanus segetum, flore cæruleo. P. 273. T. 446.
Cyanus flos. Dod. 251.
Centaurea Cyanus. Lin. Sp. 1289.

Flores in usu.

CYCLAMEN, *Le Pain de Pourceau*. Pl. 243.

Cyclamen orbiculato folio, infernè purpurascente. P. 308. T. 154.
Panis porcinus & Arthanita, Rapum terræ. Lob. Icon. 604.
Cyclamen Europæum. Lin. Sp. 207.

Radix in usu.

CYDONIUM, ſeu COTONEA MALUS, *Le Coignassier*; Pl. 234.

Mala Cotonea majora. P. 434.
Cydonia fructu oblongo leviori. T. 632.
Pyrus Cydonia. Lin. Sp. 687.

Fructus & ſemina in uſu.

CYMBALARIA, *La Cymbalaire.*

Cymbalaria. P. 306.
Linaria hederaceo folio glabro, ſeu Cymbalaria vulgaris. T. 169.
Antirrhinum Cymbalaria. Lin. Sp. 851.

Tota planta in uſu.

CYNOGLOSSUM, *La Cynoglosse.* Pl. 244.

Cynogloſſum majus vulgare. P. 257. T. 139.
Cynogloſſum. Dod. 54.
Cynogloſſum officinale. Lin. Sp. 192.

Folia & radices in uſu.

CYNORRHODOS, *Le Rosier sauvage, L'Églantier.* Pl. 496.

Cynorrhodos, ſeu Cynosbatos. Officinarum.
Roſa ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. P. 483. T. 638.
Roſa canina. Lin. Sp. 704.

Radix, flores & fructus in uſu. *Vide* Cynips, in Regno Animali.

CYPERUS LONGUS, *Le Souchet long.* Pl. 13.

Cyperus odoratus radice longâ, ſive Cyperus officinarum. P. 14. T. 527.
Cyperus longus. Lin. Sp. 67.

Radix in uſu.

CYPERUS ROTUNDUS, *Le Souchet rond.* Pl. 13.

Cyperus rotundus, orientalis major. P. 13.
Cyperus rotundus. Lin. Sp. 67.

Cyperi rotundi radices eligendæ ſunt odoratæ, graves, non carioſæ. In Ægypto orientaliumque regionum lacubus ac paluſtribus locis creſcit.

DAUCUS, *La Carotte.* Pl. 246.

Daucus ſativus radice luteâ & alba. T. 307.
Daucus Carota. Lin. Sp. 348.

Radix in uſu.

DAUCUS CRETICUS, *Le Daucus de Crête.* Pl. 245.

Daucus foliis Fœniculi tenuiſſimis. P. 150.
Daucus creticus officinarum. Taber. Icon. 75.
Myrrhis annua, ſemine ſtriato, villoſo, incano. Moris. Umb. 67. T. 315.
Athamanta cretenſis. Lin. Sp. 352.

Dauci cretici ſemina ſunt oblonga, incana, ſtriata, ſuperiore parte acutiora; ſaporis acris, aromatici, grati.

DAUCUS SYLVESTRIS, *La Carotte sauvage.*

Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris Dioſcoridis, vel Daucus officinarum. P. 151.
Daucus vulgaris. Clus. cxcviij. T. 307.
Daucus Carota. Lin. Sp. 348.

Semina in uſu. In medio umbellæ, purpureus plerumque reperitur floſculus, qui, Coccinellæ inſtar, purpureo colore inficere aptus eſt. *Avicula in nido* vulgò dicitur.

DENS LEONIS, *Le Pissenlit.* Pl. 247.

Dens Leonis latiore folio. P. 126. T. 468.
Dens Leonis. Dod. 636.
Leontodon Taraxacum. Lin. Sp. 1122.

Folia & radices in uſu.

DICTAMNUS ALBUS, *La Fraxinelle, ou Dictame Blanc.* Pl. 14.

Dictamnus albus vulgò, ſeu Fraxinella. P. 222.
Fraxinella. Clus. 99. T. 430.
Dictamus albus. Lin. Sp. 548.

Dictamni albi radices ſint albicantes, ab interiori parte lignoſâ liberæ, non carioſæ. Naſcitur in Galliæ, Italiæ, & Germaniæ locis montoſis.

DICTAMNUS CRETICUS, *Le Dictame de Crête.* Pl. 43.

Dictamnus creticus. P. 222.
Dictamnus cretica, seu vera. J. B. 3. 253.
Origanum creticum latifolium tomentosum, seu Dictamnus creticus. T. 199.
Origanum Dictamnus. Lin. Sp. 823.

Eligenda sunt folia tomentosa, recentia, integra & odorata.

DIGITALIS, *La Digitale.* Pl. 248.

Digitalis purpurea, folio aspero. P. 243.
Digitalis purpurea. Dod. 169. T. 165. Lin. Sp. 866.

Folia in usu.

DIPSACUS, *Le Chardon a Foulon.* Pl. 249.

Dipsacus sativus, (aut sylvestris.) P. 385. T. 466.
Carduus fullonum (& Labrum Veneris.) Lob. Icon. 17, 18.
Dipsacus fullonum. Lin. Sp. 140.

Radix in usu.

DORONICUM ARNICA, *Le Doronic d'Allemagne.* Pl. 15.

Doronicum Plantaginis folio alterum. P. 185. T. 487.
Doronicum Germanicum foliis semper ex adverso nascentibus villosis. J. B. 3. 19.
Alisma. Math. 934.
Arnica montana. Lin. Sp. 1245.

In pratis & locis humidioribus & in montanis tum Germanicis tum Alpinis nascitur. Radix in usu.

DORONICUM ROMANUM, *Le Doronic Romain.* Pl. 15.

Doronicum radice Scorpii. P. 184. T. 487.
Doronicum latifolium. Clus. *xvj.*
Doronicum Pardalianches. Lin. Sp. 1247.

Eligantur radices albicantes, saporis subdulcis, aromatici, acris. Nascitur in montibus Helvetiæ, Tirolis & Austriæ.

DRACUNCULUS ESCULENTUS, L'*Estragon.* Pl. 252.

Dracunculus hortensis. P. 98.
Abrotanum Linifolio acriori & odorato. T. 459.

Artemisia Dracunculus. LIN. SP. 1189.

Tota Planta in usu.

DRACUNCULUS MAJOR, *LA SERPENTAIRE.* PL. 250.

Dracunculus polyphyllus. P. 195. T. 160.
Dracontium. DOD. 329.
Arum Dracunculus. LIN. SP. 1367.

Folia & radices in usu.

DULCAMARA, *LA DOUCE-AMERE.* PL. 253.

Solanum scandens, seu Dulcamara. P. 167. T. 149.
Solanum Dulcamara. LIN. SP. 264.

Tota planta in usu.

EBULUS, L'*IEBLE.* PL. 254.

Sambucus humilis, sive Ebulus. P. 456. T. 606.
Ebulus, sive Sambucus herbacea. J. B. I. 546.
Sambucus Ebulus. LIN. SP. 385.

Radix, secundæ cortices, folia & fructus in usu.

ECHIUM, *LA VIPÉRINE.*

Echium vulgare. P. 254. T. 135. LIN. SP. 200.
Buglossum sylvestre. LOB. ICON. 579.

Tota planta in usu.

ELATINE, *LA VELVOTE, LA VÉRONIQUE FÉMELLE.* PL. 255.

Elatine folio subrotundo. P. 252.
Linaria segetum Nummulariæ folio villoso. T. 169.
Veronica femina Fuchsii, sive Elatine. DOD. 42.
Antirrhinum spurium. LIN. SP. 851.

Tota planta in usu.

ELEMI GUMMI, *LA GOMME ÉLÉMI.*

Iccariba. MARCG. BRAS. 98.
Cornus racemosa trifolia, & quinquefolia. PLUM. GEN. *Icon.* 100.
Amyris Elemifera. LIN. SYST. NAT. 266.

GUMMI ELEMI est resina semi diaphana, pinguis, ex flavo albicante

ad viridem colorem inclinans, in maſſam coacta, foliis arundinaceis aliquando involuta, odoris non ingrati. Eligenda odorata, pura & pinguis. Ex Americâ, præſertìm novâ Hiſpaniâ & Carolinâ advehitur.

ENDIVIA, L'*ENDIVE*. PL. 256.

Intybus ſativa latifolia, ſive Endivia vulgaris. P. 125.
Cichorium latifolium, ſive Endivia vulgaris. T. 479.
Cichorium Endivia. LIN. SP. 1142.

Folia & ſemina in uſu.

ENULA CAMPANA, L'*AUNÈE*. PL. 257.

Helenium vulgare. P. 276.
Aſter omnium maximus, Helenium dictus. T. 483.
Inula Helenium. LIN. SP. 1236.

Radix in uſu.

EQUISETUM, *LA PRÊLE, ou QUEUE DE CHEVAL*. PL. 258.

Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. P. 16. T. 533.
Hippuris minor. DOD. 73.
Equiſetum arvenſe. LIN. SP. 1516.

Tota planta in uſu.

ERUCA SATIVA, *LA ROQUETTE DES JARDINS*. PL. 259.

Eruca latifolia, alba, ſativa, Dioſcoridis. P. 98. T. 227.
Sinapi alterum genus. FUCHS. 539.
Braſſica Eruca. LIN. SP. 932.

Folia & ſemina in uſu.

ERUCA SYLVESTRIS, *LA ROQUETTE SAUVAGE*. PL. 260.

Sinapi Erucæ folio. P. 99.
Eruca tenuifolia, perennis flore luteo. J. B. 2. 861. T. 227.
Eruca ſylveſtris major, vulgaris fetens. MORIS. 2. 230. *ſ.* 3. *t.* 6. *f.* 3.
An? Siſymbrium tenuifolium. LIN. SP. 917.

ERUCA SYLVESTRIS, ſapore fervidior, acrior, odoreque ſingulari donata, ſativæ præfertur.

ERYNGIUM, *LE CHARDON ROLAND*. PL. 261.

Eryngium vulgare. P. 386. T. 327. J. B. 3. 85.

Eryngium campestre. DOD. 730. LIN. SP. 337.
Radices in usu.

ERYNGIUM MARINUM, *Le Panicaut de mer.* PL. 262.

Eryngium maritimum. P. 386. T. 327. LIN. SP. 337.
Radices in usu.

ERYSIMUM, *Le Vélard, ou La Tortelle.* PL. 263.

Erysimum vulgare. P. 100. T. 228.
Erysimum officinarum. LIN. SP. 922.
Tota planta in usu.

ESULA MAJOR, *La grande Ésule.* PL. 265.

Tithymalus foliis Pini, fortè Dioscoridis Pithyusa. P. 292. T. 86.
Tithymalus Pinea. LOB. ICON. 357.
Euphorbia Esula. LIN. SP. 660.
Radicis cortex in usu.

ESULA MINOR, *La petite Ésule.* PL. 264.

Tithymalus Cyparissias. P. 291. T. 86.
Esula officinarum. CÆSALP. 374.
Euphorbia Cyparissias. LIN. SP. 661.

Hæ duæ species ESULÆ indiscriminatìm sumuntur.

EUPATORIUM CANNABINUM, L'*Eupatoire.* PL. 266.

Eupatorium Cannabinum. P. 320. T. 456. LIN. SP. 1173.
Vulgare Eupatorium. DOD. 28.
Tota planta in usu.

EUPHORBIUM, L'*Euphorbe.* PL. 100.

Euphorbium. P. 387.
Ephorbium cerei effigie, caulibus crassioribus spinis validioribus armatum. COMM. HORT. AMST. *tom.* 1. *pag.* 21.
Euphorbia officinarum. LIN. SP. 647.

EUPHORBIUM est substantia gummosa, in guttis sive granis pallescentibus, saporis acerrimi, urentis ac nauseosi. Eligatur albicans, & in granis majoribus. Ex Indiæ orientalis regionibus advehitur. *Non sine sternutatione molestâ contunditur, nisi naribus obturatis.*

EUPHRASIA,

EUPHRASIA, L'*EUPHRAISE*, PL. 267.

Euphrasia officinalis. P. 233. T. 174. LIN. SP. 841.

Folia & flores in usu.

FABA, *LA FEVE DE MARAIS*, *ou GROSSE FEVE*. PL. 268.

Faba flore candido, lituris nigris conspicuo. P. 338. T. 391.
Faba major recentiorum. LOB. ICON. 57.
Vicia Faba. LIN. SP. 1039.

Fructûs & ejus farina in usu.

FABA SANCTI IGNATII, *LA FEVE DE ST. IGNACE*. PL. 74.

Faba indica, sive Faba febrifuga. Officinarum.
Cucurbitifera Malabathri foliis scandens, Catalongay & Cantara dicta. PLUK. *Mantissâ.* G. CAMELLI. PHIL. TRANS. *N.*° 250. *p.* 88.

FABÆ INDICÆ, *Igasur* dictæ, sunt nuclei subrotundi, inæquales, nucis Avellanæ magnitudinis, durissimi, corneæ quasi substantiæ nucis Vomicæ instar; saporis valdè amari, coloris glauci. Reperiuntur in pulpâ fructûs Melonem simulantis. È Philippinis insulis advehuntur.

FAGOPYRUM, *LE BLED NOIR*, *ou SARRASIN*. PL. 269.

Erysimum Theophrasti, folio Hederaceo. P. 27.
Frumentum Sarracenicum. MATH. 394.
Fagopyrum vulgare erectum. T. 511.
Polygonum Fagopyrum. LIN. SP. 522.

Semina in usu.

FICUS, *LE FIGUIER*. PL. 50.

Ficus communis. P. 457.
Ficus sativa. T. 662.
Ficus Carica. LIN. SP. 1513.

Vocabulum FICUS in officinis, fructum recentem denotat; CARICA verò, ficum *passam* vel exsiccatam. CARICÆ eligantur recentes & pingues; è calidioribus regionibus afferuntur.

FILIPENDULA, *LA FILIPENDULE*. PL. 270.

Filipendula vulgaris, an Molon Plinii? P. 163. T. 293.
Spiræa Filipendula. LIN. SP. 702.

Radices & folia in usu.

FILIX FEMINA, *La Fougere commune, ou femelle.* Pl. 272.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis, non dentatis. P. 357. T. 536.
Filix femina. Dod. 462. Fuchs. 596.
Pteris Aquilina. Lin. Sp. 1533.

Radix & folia in usu.

FILIX MAS, *La Fougere male.* Pl. 271.

Filix non ramosa dentata. P. 358. T. 536.
Filix vulgò Mas dicta, sive non ramosa. J. B. 3. 737.
Polypodium Filix mas. Lin. Sp. 1551.

In usum vocari solent radices illius speciei quæ *Filix femina* dicitur.

FILIX FLORIDA, L'*Osmonde.* Pl. 273.

Filix ramosa, non dentata, florida. P. 357.
Filix palustris. Dod. 463.
Osmunda vulgaris & palustris. T. 547.
Osmunda Regalis. Lin. Sp. 1521.

Radices, fructus & summitates in usu.

FŒNICULUM, *Le Fenouil.* Pl. 274.

Fœniculum vulgare germanicum. P. 147. Dod. 297. T. 311.
Anethum Fœniculum. Lin. Sp. 377.

Radix, folia & semina in usu.

FŒNICULUM DULCE, *Le Fenouil doux.*

Fœniculum dulce. P. 147.
Fœniculum dulce, majore & albo semine. T. 311.
Anethum Fœniculum. Lin. Sp. 377.

Varietas est præcedentis. Semen ex Italiâ advehitur; eligendum recens & aromaticum.

FŒNUM GRÆCUM, *Le Fenugrec.* Pl. 175.

Fœnum græcum sativum. P. 348. Dod. 536. T. 409.
Trigonella Fœnum-Græcum. Lin. Sp. 1095.

Semina in usu.

FOLIUM INDUM, seu MALABATHRUM, *Feuille indienne.* Pl. 42.

Cinnamomum, seu Canella Malabarica, seu Javanensis. P. 409.

Malabathrum, & *folium Indum officinarum.* J. B. 1. 430.
Canella ſylveſtris Malabarica. RAJ. HIST. 1562.
Laurus Caſſia. LIN. SP. 528.

Veterum MALABATHRUM planè incognitum eſt; recentiorum verò, ſunt folia CANELLÆ MALABARIÆ (*Katou-Karva.* RHEED. MALAB.) oblonga, acuminata, denſa & glabra, à pediculo ad apicem tribus nervis excurrentibus donata. Eligenda recentia, viridiuſcula & odorata.

FRAGARIA, *LE FRAISIER.* PL. 276.
Fragaria vulgaris. P. 326. T. 295.
Fragaria veſca. LIN. SP. 708.
Radices, folia & fructus in uſu.

FRANGULA, *LA BOURGENE, ou AULNE NOIR.*
Alnus nigra baccifera. P. 428.
Frangula. DOD. 784. T. 612.
Rhamnus Frangula. LIN. SP. 280.
Cortex in uſu.

FRAXINUS, *LE FRÊNE.* PL. 277.
Fraxinus excelſior. P. 416. T. 577. LIN. SP. 1509.

Cortex, lignum & ſemina in uſu. Semen, *Lingua avis* ſeu *Ornithoglossum*, in officinis dicitur.

FULIGO, *LA SUIE DE CHEMINÉE.*

Eligatur FULIGO ſplendens & è ligno combuſto coloribus metallicis non infecto, producta.

FUMARIA, *LE FUMETERRE.* PL. 278.

Fumaria officinarum, Dioſcoridis. P. 143. T. 422. LIN. SP. 984.

Tota planta floreſcens in uſus.

GALANGA MAJOR, *LE GRAND GALANGA.*
Galanga major. P. 35.
Wanbon. KÆMPF. AMŒN. EXOT. 901.
Kæmpferia Galanga. LIN. SP. 3.

GALANGÆ MAJORIS radices ſunt nodoſæ, geniculatæ, ruſeſcentes foris, intùs pallidæ, odoratæ, ſaporis aromatici fervidi. Eligantur ponderoſæ, non carioſæ. In regno Siam colitur.

GALANGA MINOR, *Le petit Galanga.*

Galanga minor officinarum. P. 35.
Maranta. PLUM. GEN. 36.
Maranta Galanga. LIN. SP. 3.

GALANGÆ MINORIS radices, cum radicibus *Galangæ majoris* ſatis conveniunt, at minores ſunt. Eligantur ponderoſæ, non fibroſæ, odoratæ, non carioſæ. Hæc planta in Chinâ ſponte naſcitur.

GALBANUM. *Le Galbanum.* PL. 101.

Galbanum. P. 494.
Oreoſelinum africanum Galbaniferum, frutefcens, Aniſi folio. T. 319.
Ferula africana Galbanifera, folio & facie Liguſtici. HERM. PARAD. 163.
Bubon Galbanum. LIN. SP. 364.

GALBANUM eſt ſuccus gummoſo-reſinoſus, in grumos condenſatus, coloris flaveſcentis, ſubfuſci, ſaporis amaricantis, acris, odoris gravis. GALBANUM in granis optimum cenſetur. Ex orientalibus regionibus Arabiâ & Syriâ advehitur.

GALEGA, *Le Galéga.* PL. 280.

Ruta capraria. Officinarum.
Galega vulgaris. P. 352. T. 398.
Galega officinalis. LIN. SP. 1062.

Tota planta in uſu.

GALLIUM ALBUM, *Le Caillelait blanc.* PL. 285.

Gallium album vulgare. T. 115.
Galium Mollugo. LIN. SP. 155.

Summitates florentes in uſu.

GALLIUM LUTEUM, *Le Caillelait jaune.* PL. 284.

Gallium Luteum. P. 335. T. 115.
Galium verum. LIN. SP. 155.

Summitates florentes in uſu.

GENISTA VULGARIS, *Le Genêt commun.* PL. 286.

Geniſta anguloſa & ſcoparia. P. 395.

Cytiso-Genista, scoparia, vulgaris flore luteo. T. 649.
Spartium scoparium. LIN. SP. 996.

Tota planta in usu.

GENISTA HISPANICA, *LE GENÊT D'ESPAGNE.* PL. 286.

Spartium arborescens, seminibus Lenti similibus. P. 396.
Genista Juncea. T. 643.
Spartium Junceum. LIN. SP. 995.

Tota planta in usu.

GENTIANA, *LA GENTIANE.* PL. 16.

Gentiana major lutea. P. 187. T. 80. DOD. 342.
Gentiana lutea. LIN. SP. 329.

GENTIANÆ radices eligantur recentes, ponderosæ, crassæ, foris fuscæ, intùs ex flavo rufescentes, saporis intense amari. In Galliæ, Helvetiæ, &c. montibus nascitur.

GERANIUM COLUMBINUM, *LE PIED DE PIGEON.* PL. 287.

Geranium folio Malvæ rotundo. P. 318. T. 268.
Pes Columbinus. DOD. 61.
Geranium rotundifolium. LIN. SP. 957.

Folia in usu.

GERANIUM ROBERTIANUM, *L'HERBE A ROBERT.* PL. 288.

Geranium Robertianum primum. P. 319. T. 268.
Rupertiana. CÆSALP. 359.
Geranium Robertianum. DOD. 62. LIN. SP. 955.

Folia in usu.

GERANIUM SANGUINEUM. *LE BEC DE GRUE SANGUIN.* PL. 289.

Geranium sangineum, maximo flore. P. 318. T. 267.
Geranium septimum hæmatodes. CLUS. cij.
Geranium sanguineum. LIN. SP. 958.

Folia in usu.

GINS-ENG, *LE GENSENG.* PL. 27.

Aureliana canadensis Iroquæis garentogen, *Sinensibus* Gins-Eng. LAF. 51.

Araliastrum foliis ternis quinque partitis, Ginseng, *seu* Ninsin *officinarum*. TREW. *t.* 6.

Panax quinquefolium. LIN. SP. 1512.

Nascitur in Canadâ. *Vide NIN-ZIN.*

GLASTUM, *LE PASTEL.*

Isatis sativa, *vel latifolia*. P. 113. T. 211. DOD. 79.
Isatis, *sive Glastum*. J. B. 2. 909.
Isatis tinctoria. LIN. SP. 936.

Herba in usu.

GLYCYRRHIZA, *LA RÉGLISSE*. PL. 17.

Glycyrrhiza siliquosa, *vel Germanica*. P. 352. T. 389.
Glycyrrhiza vulgaris. DOD. 341.
Liquiritia. BRUNF.
Glycyrrhiza glabra. LIN. SP. 1046.

GLYCYRRHIZÆ radices eligendæ recentes, non cariosæ, flavescentes, sapore dulces.

SUCCUS LIQUIRITIÆ decoctione è radicibus extrahitur, & ignis calore inspissatur. Præsertìm ex Hispaniâ in laterculos aut rotulas Sole siccatas adfertur : eligatur purus qui totus in aquâ solvitur.

GNAPHALIUM, PES CATI, *LE PIED DE CHAT*. PL. 290.

Hispidula & Æluropus. Officinarum.
Gnaphalium montanum, *flore rotundiore*. P. 263.
Elychrysum montanum, *flore rotundiore & longiore*. T. 453.
Gnaphalium dioïcum mas. LIN. SP. 1199.

Flores in usu.

GRAMEN CANINUM, *LE CHIENDENT*, (*Gramen Loliaceum.*) PL. 291.

Gramen caninum arvense, *sive Granum Dioscoridis*. P. 1.
Gramen Loliaceum radice repente, *sive Gramen officinarum*. T. 516.
Triticum repens. LIN. SP. 128.

Radices in usu.

GRAMEN DACTYLON, *LE CHIENDENT PIED DE POULE*. PL. 292.

Gramen Dactylon folio arundinaceo majus : aculeatum fortè Plinii. P. 7.

Gramen Dactylon, radice repente, ſive officinarum. T. 520.
Gramen legitimum. CLUS. *ccxvij.*
Panicum Dactylon. LIN. SP. 85.

Hæc ſola ſpecies, in calidioribus regionibus, venit in uſum.

GRATIOLA, L'*HERBE A PAUVRE HOMME.* PL. 293.

Gratiola Centauroides. P. 279.
Digitalis minima Gratiola dicta. MORIS. 2. 579. *ſ.* 5. *t.* 8. *f.* 7. T. 165.
Gratia Dei. CÆSALP. 265.
Gratiola officinarum. LIN. SP. 24.

Radix & folia in uſu.

GROSSULARIA NIGRA, *LE GROSEILLIER NOIR*, *LE CASSIS.* PL. 295.

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro. P. 455. T. 640.
Ribes nigrum vulgò dictum, folio olente. J. B. 2. 98.
Ribes nigrum. LIN. SP. 291.

Folia & fructus ſunt in uſu.

GROSSULARIA RIBES, *LE GROSEILLIER ROUGE.* PL. 294.

Groſſularia multiplici acino, ſive non ſpinoſa, hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. P. 455. T. 639.
Ribeſium fructu rubro. DOD. 749.
Ribes rubrum. LIN. SP. 290.

Fructus ſunt in uſu.

GROSSULARIA SPINOSA, *LE GROSEILLIER BLANC ÉPINEUX.* P. 294.

Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris. P. 455. T. 639.
Ribes Uva criſpa. LIN. SP. 292.

Fructus in uſu.

GUAJACUM, *LE GAYAC*, PL. 38.

Guajacum magnâ matrice. P. 448.
Guajacum flore cæruleo, fructu ſubrotundo. PLUM. GEN. 39.
Guajacum officinale. LIN. SP. 546.

GUAJACUM eſt lignum ſolidum, denſum, aquâ ponderoſius, ni-

gricans intùs, foris buxeum; odoris dum comburitur refinofo-fuavis; faporis aromatici, miti cum acrimoniâ palatum ac fauces pungens: eligatur alburno mundatum. Arbor in Hifpaniolâ, Jamaicâ & variis Americæ regionibus crefcit.

Cortices eligendi duriufculi, tenues, lignofi, cinerei, maculati, interiùs pallidi, lamellatim congefti, faporis amaricantis, aromatici.

Lignum sanctum (*Guajacum fanctum.* Lin. Sp. 547.) & *Guajacum officinarum* funt arbores inter fe fpecie diverfæ. Præfertur *Guajacum.*

Guajacum gummi, ex utrâque arbore exfudat, eft lachryma refinofa, arida, dura; coloris viridefcentis, fufci; faporis acris; odoris ferè nullius. Eligendum in minoribus fruftis, corticibus *Guajaci* adhærentibus.

GUMMI GUTTA, *La Gomme gutte*, (*Carcapulli.*) Pl. 105.

Succus laxativus ex flavo rufefcens. P. 497.
Carcapulli. Park. 1635.
Coddam-Pulli. Rheed. Mal. 1. *t.* 24.
Cambogia Gutta. Lin. Sp. 728.

Gummi gutta eft fuccus gummofo-refinofus, flavus, è fauciato arboris trunco manans. Vel in cylindros efformatus, vel in baccilis cerei inftar contortis, ad nos ex Indiis mittitur.

HEDERA ARBOREA, *Le Lierre.* Pl. 85.

Hedera arborea, P. 305. T. 613.
Hedera helix. Lin. Sp. 292.

Hedera arborea paffim ad arbores nafcitur, nunc fcandens & fertilis, nunc repens & fterilis.

Lacryma feu Gummi hederæ eft arida refplendefcens, faporis acris & fubaftringentis, coloris ut plurimùm fufci, ferè nigri. È calidioribus regionibus advehitur.

HEDERA TERRESTRIS, *Le Lierre Terrestre.* Pl. 296.

Hedera terreftris vulgaris. P. 306.
Calamintha humilior, folio rotundiore. T. 194.
Glechoma Hederacea. Lin. Sp. 807.

Herba in ufu.

HELIANTHEMUM,

HELIANTHEMUM, L'*Herbe d'or.* Pl. 297.

Chamæciſtus vulgaris flore luteo. P. 465.
Helianthemum vulgare flore luteo. J. B. 2. 15. T. 248.
Flos Solis. Dod. 193.
Ciſtus Helianthemum. Lin. Sp. 744.

Radix & folia in uſu.

HELIANTHEMUM TUBEROSUM, *Les Topinambours.* Pl. 298.

Helianthemum tuberoſum indicum. P. 277.
Corona Solis parvo flore, tuberoſâ radice. T. 489.
Helianthus tuberoſus. Lin. Sp. 1277.

Radix eſt in uſu.

HELIOTROPIUM, L'*Herbe aux Verrues.* Pl. 299.

Heliotropium majus Dioſcoridis. P. 253. T. 139.
Heliotropium, officinis, Verrucaria ſcorpioïdes. Adv. Lob. 100.
Heliotropium Europæum. Lin. Sp. 187.

Herba eſt in uſu.

HELLEBORUS ALBUS, L'*Hellébore blanc.* Pl. 18.

Helleborus albus flore ſubviridi. P. 186.
Veratrum flore ſubviridi. T. 273.
Veratrum album. Lin. Sp. 1479.

Radix in uſu.

HELLEBORUS NIGER, L'*Hellébore noir.* Pl. 19 & 20.

I. Helleborus niger flore roſeo. P. 186.
Veratrum nigrum. Dod. 385.
Helleborus niger, anguſtioribus foliis. T. 271.
Helleborus niger. Lin. Sp. 783.

Radix in uſu.

II. Helleborus niger hortenſis, flore viridi. P. 185. T. 272.
Helleborum nigrum alterum. Camer. Epist. 941.
Helleborus viridis. Lin. Sp. 784.

Hæ duæ Hellebori nigri ſpecies indiſcriminatim adhibentur.

HEPATICA FONTANA, L'*Hépatique d'eau.* Pl. 300.

Lichen petræus latifolius, ſeu Hepatica fontana. P. 362.

Lichen. DOD. 473. FUCHS. 179.
Marchantia major. MICHEL. GEN. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Marchantia polymorpha. LIN. SP. 1603.

In umbrosis, humidis & petrosis locis, in puteis & circa fontes nascitur. Herba est in usu.

HEPATICA NOBILIS, L'*HÉPATIQUE DES FLEURISTES.* PL. 301.

Trifolium Hepaticum flore simplici. P. 330.
Trifolium magnum, sive aureum, quod Hepatica nobilis. TRAG. 519.
Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici cæruleo. T. 286.
Anemone Hepatica. LIN. SP. 758.

Herba in usu.

HERBA PARIS, *LE RAISIN DE RENARD.* PL. 302.

Solanum quadrifolium bacciferum. P. 167.
Herba Paris. DOD. 444. T. 233. J. B. 3. 613.
Paris quadrifolia. LIN. SP. 526.

Herba in usu.

HERMODACTYLUS, L'*HERMODACTE.*

Iris tuberosa, folio anguloso. P. 40.
Hermodactylus verus. MATH. 1109.
Hermodactylus folio quadrangulo. T. COR. 50.
Iris tuberosa. LIN. SP. 58.

HERMODACTYLI sunt radices *Iridis tuberosæ*: eligantur integri, ponderosi, non cariosi, solidi, oblongi, rotundi, lati & quasi compressi, cordis figuram referentes, intùs albi, saporis subdulcis, odoris nullius. Ex Syriâ, Smirnâ & Alepo advehuntur.

MATHIOLUS acerrimè reprehendit eos qui radices *Colchici* pro *Hermodactylis* venditant. » Accepi, inquit, hanc plantam à *D. AUGERIO DE BUSBEKE* Flandro, qui illam Constantinopoli secum attulit, ubi continuo septennio apud *SOLIMANUM* Turcarum Imperatorem, *FERDINANDI* Cæsaris oratorem egit ».

HERNIARIA, *LA TURQUETTE.* PL. 303.

Herniaria glabra, (& hirsuta.) J. B. 3. 378. T. 507. LIN. SP. 317.
Empetrum. TRAG. 527.

Herniaria. DOD. 114.
Herba Turca. LOB. ICON. 421.

Herba in uſu.

HORDEUM, L'*ORGE ou SCOURGEON*. PL. 304.

I. Soucrion. Noſtratibus.
Hordeum Polyſtichum hybernum. P. 22. T. 513.
Hordeum Polyſtichum, hybernum majus. TABER. ICON. 274.
Hordeum vulgare. LIN. SP. 125.

II. Pamel. Vernacule.
Hordeum Diſtichon, quod ſpica binos ordines habeat Plinio. P. 23. T. 513.
Hordeum Diſtichon, æſtivum, trimeſtre minus. TABER. ICON. 274.
Hordeum Diſtichon. LIN. SP. 125.

Præfertur prior ſpecies. Ex his paratur *Hordeum mundum* & *Perlatum*.

HORMINUM, L'*ORVALE, LA TOUTE-BONNE*. PL. 305.

Horminum Sclarea dictum. P. 238.
Orvala. DOD. 292.
Sclarea. TABER. ICON. 373. T. 179.
Salvia Sclarea. LIN. SP. 38.

Herba in uſu.

HORMINUM SATIVUM, L'*HORMIN*.

Horminum ſativum. P. 238. MATH. 887. DOD. 294.
Horminum comâ purpuro-violaceâ. J. B. 3. 309. T. 178.
Horminum ſativum, genuinum Dioſcoridis. PARK. 56.
Salvia Horminum. LIN. SP. 34.

Præfertur prima HORMINI ſpecies. Herba eſt in uſu.

HYOSCIAMUS ALBUS, *LA JUSQUIAME BLANCHE*. PL. 307.

Hyoſciamus major albus. P. 169. T. 118.
Hyoſciamus albus. J. B. 3. 627. DOD. 451. LIN. SP. 257.

Folia, flores & ſemina in uſu.

HYOSCIAMUS NIGER, *LA JUSQUIAME NOIRE, ou HANNEBANE*. PL. 306.

Hyoſciamus vulgaris vel niger. P. 169. T. 118.
Hyoſciamus niger. DOD. 450. RAJ. HIST. 711. LIN. SP. 257.

Uſus ut prior. Caveab uſu interno.

HYPERICUM, *Le Mille-pertuis*. Pl. 308.

Hypericum vulgare. P. 279. T. 254.
Hypericum perforatum. Lin. Sp. 1105.

Folia, flores & ſemina in uſu.

HYPOCISTIS, L'*Hypociste*. Pl. 109.

Hypociſtis. P. 465.
Hypociſtis Cretica flore purpureo. T. Cor. 46.
Azarum Hypociſtis. Lin. Sp. 633.

Succus Hypocistidis eſt niger, auſtero-acidus: eligatur non aduſtus. È Galliâ Narbonenſi, Provinciâ, & Cretâ aſportatur. Planta paraſitica eſt & ad Ciſti Monſpelienſis, & Ladaniferi baſim creſcit.

HYSSOPUS, L'*Hysope*, Pl. 309.

Hyſſopus officinarum cærulea, ſeu ſpicata. P. 217. T. 200.
Hyſſopus vulgaris. Dod. 287.
Hyſſopus officinalis. Lin. Sp. 796.

Herba & flores in uſu.

JACOBÆA, *La Jacobée*. Pl. 311.

Jacobæa vulgaris laciniata. P. 131. T. 485.
Senecio Jacobæâ. Lin. Sp. 1219.

Herba in uſu.

JALAPPA, *Le Jalap*. Pl. 20.

Bryonia Mechiocana nigricans. P. 298.
Convolvulus americanus, Jalapium dictus. Raj. Hist. 724.
Convolvulus Jalapa. Lin. Mant. 43.

NOTA. Hæc planta eſt vera *Jalappa officinarum* teſte *Millero* qui hujus radices ab *Houstono* accepit & Pharmacopolis Londinenſibus vendidit.

Jalappæ radices ſunt oblongæ, orbiculatìm inciſæ: eligantur nigricantes, reſinoſæ, ponderoſæ, non carioſæ, quæ candelæ admotæ mox accenduntur. È Mexico advehuntur.

ILEX ACULEATA, *Le Chêne verd du Kermès*. Pl. 117.

Ilex aculeata cocciglandifera. P. 425. T. 583.

Quercus coccifera. LIN. SP. 1413.

È puncturâ & depositione ovorum *Cocci* in foliis Ilicis, nascuntur Insecta, in officinis GRANA KERMES dicta. *Vide* COCCUS in Regno Animali.

IMPERATORIA, *L'IMPÉRATOIRE.* PL. 22.

Imperatoria major. P. 156. T. 317.
Imperatoria ostruthium. LIN. SP. 371.

Radix in usu.

IPECACUANHA, *L'IPÉCACUANHA.*

Ipecacuanha. PISON. 231.

Tres vulgò recensentur IPECACUANHÆ species; *cineritia* seu vulgaris, *fusca* sive *nigra*, & *candida*. Ex his, præsertim cineritia & fusca in usum vocantur. Eligantur radices à fibris mundatæ, asperæ, multis annulis donatæ, tenaces, compactæ, resinosæ, cum nervo exiguo radicis meditullium occupante. IPECACUANHA cineritia ex Peru, fusca ex Brasiliâ advehitur.

IRIS FLORENTINA, *L'IRIS DE FLORENCE.* PL. 23.

Iris alba Florentina. P. 31. T. 358.
Iris Florentina. LIN. SP. 55.

Radices IRIDIS FLORENTINÆ eligantur albæ, longiores, crassæ non cariosæ, odore Violas martias æmulantes. Ex Italiâ, Rhodo insulâ, Cypro & Dalmatiâ advehuntur.

IRIS NOSTRAS, *LE GLAYEUL, ou LA FLAMME.* PL. 23.

Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris. P. 30. T. 358.
Iris purpurea sive vulgaris. PARK. PAR. 181.
Iris Germanica. LIN. SP. 55.

Radix & flores in usu.

JUGLANS, *LE NOYER.* PL. 312.

Nux Juglans, sive Regia vulgaris. P. 417. T. 581.
Juglans Regia. LIN. SP. 1415.

Nuces in usu.

JUJUBÆ, *LES JUJUBES.* PL. 48.

Jujubæ majores oblongæ. P. 446.

Zizyphus. DOD. 807. T. 627.
Rhamnus Zizyphus. LIN. SP. 282.

JUJUBÆ ſunt fructus olivaris magnitudinis, coloris rubri, ſaporis dulcis & mucilaginoſi, continentes oſſiculum unicum: eligantur recentes & ſucculentæ. Ex Italiâ & Provinciâ aſportantur.

JUNCUS ODORATUS, *LE JONC ODORANT.* PL. 41.

Juncus odoratus, aromaticus. P. 11.
Schœnanthus, ſive Juncus odoratus. J. B. 2. 515.
Andropogon Schœnanthus. LIN. SP. 1481.

Eligendus culmus cum floribus ſeu ſpicis: ſaporis eſt acris, amaricantis ſed ſuavis, odoris fragrantis. Ex Arabiâ & Indiâ advehitur.

JUNIPERUS, *LE GENIÈVRE.*

Juniperus vulgaris fruticoſa. P. 488. T. 588.
Juniperus. LOB. ICON. 222.
Juniperus communis. LIN. SP. 1470.

LIGNUM JUNIPERI odoratum eſt & *Cedrus noſtras* dicitur. BACCÆ exiguæ, virides, menſe junio enaſcentes, altero demùm anno cæruleo tinguntur colore, matureſcunt autumno. Eligantur maturæ, nigræ, rotundæ & reſinoſæ.

JUNIPERUS MAJOR, *LE CADE.* PL. 88.

Juniperus major, baccâ rufeſcente. P. 489. T. 589.
Juniperus major Monſpelienſium. LOB. ICON. 223.
Juniperus Oxycedrus. LIN. SP. 1470.

GUMMI JUNIPERINUM, SANDARACHA aut VERNIX SICCA dictum, eſt reſina Maſtiches inſtar pellucida, guttas tamen majores & longiores formans, friabilis, ſaporis reſinoſi, odoris dùm accenditur ſuavis. Ex Africâ advehitur, quamvis *Juniperus major* in Galliâ Narbonenſi & Hiſpaniâ familiaris ſit.

KALI, *LA SOUDE ORDINAIRE.* (*Soda cochleato ſemine.*) PL. 559.

Kali majus cochleato ſemine. P. 289. T. 247.
Kali. DOD. 81.
Salſoſa Soda. LIN. SP. 323.

In littoribus maris naſcitur. Planta in uſu.

KALI HISPANICUM, *LA SOUDE D'ALICANTE.*

Kali minus alterum. P. 289.

Kali hispanicum, supinum, annuum, Sedi foliis brevioribus. ACT. SCIENT. 1715.
Salsosa sativa. LIN. SP. 323.

È KALI HISPANICO combusto & incinerato SODA paratur. Eligatur cæruleo-cinerea, sicca, tinniens, porosa, odoris paludosi madefacta expers. Ex Alonio Valentiæ portu advehitur. Cum sale Sodæ & Oleo parantur SAPONES varii, nempe Sapo albus, *le Savon blanc*, Sapo niger *le Savon noir ordinaire*, &c.

KEIRI, *LE GIROFLIER JAUNE*, *Nostratibus MURÉ*. PL. 313.

Leucoium luteum vulgare. P. 202. T. 221.
Leucoium luteum, vulgo Cheiri, flore simplici. J. B. 2. 872.
Cheiranthus Cheiri. LIN. SP. 924.

Folia, flores & semina in usu.

KINA-KINA, *LE QUINQUINA.* PL. 36.

Arbor febrifuga Peruviana. RAJ. HIST. 1796.
Kinkina. ACT. SCIENT. 1738.
Cinchona officinalis. LIN. SP. 244.

CORTEX PERUVIANUS seu KINA-KINA, eligatur è fusco rufescens, amarus, sine molestiâ astringens, non nimis crassus; sulcis transversis profundioribus, longitudinalibus verò superficiariis, musco cinereo quandoque obductis donatus. È junioribus arboribus in Peruvianis montibus detrahitur.

LABDANUM, *LE LABDANUM.* PL. 86.

Cistus Ledon cretense. P. 467.
Cistus Labdanifera cretica flore purpureo. T. COR. 19.
Cistus creticus. LIN. SP. 738.

LABDANUM seu LADANUM est substantia resinosa, nigricans, terrâ permixta, in spiras cereorum instar contorta, saporis amari, super prunas suavem odorem spargens. Eligendum resinosum pingue, inflammabile & odoratum. In Candiâ, Cypro & Græciâ copiosus est Cisti Ladaniferi proventus.

LACCA GUMMI, *LA GOMME LAQUE.*

I. Lacca officinarum. P. 499. *Jujuba indica.* P. 446.
Ber indica fructu Jujubino. J. B. 1. 44.
Rhamnus Jujuba. LIN. SP. 282.

II. Ricinus aromaticus spicatus, folio Circææ, spinis ad imum duplicatis armato, Laccam in granis fundens. PLUK. ALM. 320.
Croton Lacciferum. LIN. SP. 1426.

Tres in officinis reperiuntur Laccæ species, in ramulis seu *bacillis*, in *granis* & in *tabulis*.

LACCA IN BACILLIS, *Laque en bâtons*, ita dicitur quia parvis arboris ramulis adhæret. Substantiâ suâ resinosâ, fuscâ, superficie inæquali quasi granulatâ baculos circumcludit. Saporis est subastringentis, parùm resinosi, odoris dùm accenditur grati.

LACCA IN GRANIS, *Laque en grains*, grana sunt pellucida, rubicunda, dura & friabilia; odoris & saporis præcedentis.

LACCA IN TABULIS, *Laque en masse*, è Laccâ in granis liquatâ, à fecibus purgatâ & in massas fusâ, conficitur; pellucida est ac rubra. Advehitur Lacca è regnis Pegu & Martabani in Indiâ orientali. Usui Medico Lacca in *bacillis* venit; *in granis* ad vernicis, in *tabulis* ad sigillatoriæ Laccæ confectionem expetitur.

LACTUCA, *LA LAITUE*, PL. 314 & 315.

Lactuca sativa, (*capitata*, & *non capitata.*) P. 122. T. 473. LIN. SP. 1118.

Herba & semina in usu.

LACTUCA SYLVESTRIS, *LA LAITUE SAUVAGE.* PL. 316.

Lactuca sylvestris costa spinosa. P. 123. T. 473.
Lactuca Scariola. LIN. SP. 1119.

Herba in usu.

LAMIUM ALBUM, L'*ORTIE BLANCHE.* PL. 317.

Lamium album non fetens folio oblongo. P. 231.
Lamium vulgare album, sive Archangelica, flore albo. T. 183.
Lamium album. LIN. SP. 809.

Folia & flores in usu.

LAMIUM FETIDUM, L'*ORTIE PUANTE.* PL. 319.

Lamium purpureum fetidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis. P. 230. T. 183.
Urtica iners altera. DOD. 153.

Lamium

Lamium purpureum. LIN. SP. 809.

Herba in uſu.

LAPATHUM, *LA PATIENCE, ou PARELLE.* PL. 324 & 326.

Lapathum folio acuto plano. P. 115. T. 504.
Lapathum ſylveſtre, ſive Oxylapathum. DOD. 648.
Rumex acutus. LIN. SP. 478.

Variat foliis acutis aut criſpis. Folia & radices in uſu.

LAPATHUM AQUATICUM, *LA PATIENCE D'EAU, ou PARELLE DES MARAIS.* PL. 327.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. P. 116. T. 504.
Britannica antiquorum vera. MUNT. PHYT. 202. & BRIT. *t.* 1.
Rumex aquaticus. LIN. SP. 479.

LAPATHI caulis in locis ſiccis, juxtà radicem, rubicundior eſt, & radix flavior; at vix à ſequenti, niſi culturâ, differt. Folia & radices ſunt in uſu.

LAPATHUM MAJUS, *LA RHUBARBE DES MOINES.* PL. 29.

Lapathum hortenſe latifolium. P. 115. T. 504.
Lapathum majus, ſive Rhabarbarum Monachorum. J. B. 2. 985.
Rumex Patientia. LIN. SP. 476.

Radix in uſu.

LAVANDULA MAJOR, *LA GRANDE LAVANDE, L'ASPIC.* PL. 330.

Lavandula latifolia. P. 216. T. 198.
Lavandula Spica. LIN. SP. 800.
Comæ florentes in uſu.

LAVANDULA MINOR, *LA LAVANDE ORDINAIRE.* PL. 331.

Lavandula anguſtifolia. P. 216. T. 198.
Lavandula Spica. LIN. SP. 800.

Folia & flores in uſu. Varietas eſt præcedentis.

LAURUS, *LE LAURIER.* PL. 334.

Laurus vulgaris. P. 460. T. 597.

Laurus nobilis. LIN. SP. 529.

Folia & baccæ in uſu.

LENS, *LA LENTILLE.* PL. 335.

Lens vulgaris (& major.) P. 346. T. 390.
Ervum Lens. LIN. SP. 1039.

Semina in uſu.

LENTICULA, *LA LENTILLE D'EAU.* PL. 336.

Lenticula paluſtris vulgaris. P. 362. T. HERB. IV.
Lemna minor. LIN. SP. 1376.

Herba in uſu.

LEPIDIUM, *LA PASSE-RAGE.* PL. 337.

Lepidium latifolium. P. 97. T. 216. LIN. SP. 899.

Folia & radix in uſu.

LEVISTICUM, *LA LIVÊCHE.* PL. 339.

Liguſticum vulgare. P. 157.
Angelica montana, perennis, Paludapii folio. T. 313.
Liguſticum Leviſticum. LIN. SP. 359.

Tota planta in uſu.

LICHEN CINEREUS, *L'HÉPATIQUE TERRESTRE CENDRÉE.*

Lichen terreſtris cinereus. RAJ. HIST. 117.
Lichenoïdes digitatum cinereum Lactucæ foliis ſinuoſis. DILL. 200.
Lichen pulmonarius ſaxatilis digitatus. VAILL. 116. *t.* 21. *f.* 16.
Lichen caninus. LIN. SP. 1616.

Mediam hæc planta, Fungum inter & Muſcum, obtinere videtur ſubſtantiam: mollis, quaſi ſpongioſa, & lanugine obducta, humi jacet in ſylvis umbroſis juxtà lapides & in radicibus aut truncis arborum. Folia exſiccata colore gaudent *cinereo* ſuperius obſcuriori; inferius verò dilutiori. Omnibus vegetat in regionibus; imò & ex Americâ, (teſte *MEAD Exam. de Venen. tentam.* 3.) ſæpè cum Peruviano Cortice advecta reperta eſt.

LICHEN ARBOREUS, *LA PULMONAIRE DE CHÊNE.* PL. 340.

Muſcus Pulmonarius. P. 361.
Lichen arboreus ſive Pulmonaria arborea. J. B. 3. 759. T. 549.

Lichen Pulmonarius. LIN. SP. 1612.

Planta in uſu.

LIGNUM ALOES, *LE BOIS D'ALOÈS.*

Agallochum officinarum. P. 393.
Arbor excæcans. RUMP. 2. *p.* 237. *t.* 79. 80.
Excæcaria Agallocha. LIN. SP. 1451.

Raró *Agallochum verum* ad nos tranſvehitur ; hujus defectu *Agallocho ſpurio* ex arbore Excœcante collecto, circà Amboïnam in fruſtis variæ magnitudinis parato, utimur. Eligatur ſolidum, denſum, aquis ſubſidens, reſinoſum, nigro-purpureum, amarum, ad ignem admotum aut duriùs perfricatum odore fragranti.

LIGNUM NEPHRITICUM, *LE BOIS NÉPHRÉTIQUE.*

Lignum peregrinum aquam cæruleam reddens. P. 416.
Acacia quadrifolia, ſiliquis cincinnatis. PLUM. ICON. 4.
Mimoſa Unguis-Cati. LIN. SP. 1499.

LIGNUM NEPHRITICUM eſt fuſcum, ſolidum, durum, & grave ; ſaporis acris, amaricantis. In uſum venit pars interior ſive meditullium fuſcum ; alba rejicitur. È Mexico advehitur.

LIGNUM RHODIUM. *LE BOIS DE ROSES.*

Cytiſus incanus, ſiliquis falcatis. P. 389.
Cytiſus Maranthæ. LOB. ICON. 2. 46.
Medicago arborea. LIN. SP. 1096.

LIGNUM RHODIUM eſt radix lignoſa, dura, contorta, nodoſa, reſinoſa ; odoris fragrantis, roſei ſaporis, ſubamari. Ex inſulis Canarienſibus & Rhodo advehitur.

LIGNUM QUASSI, *LE BOIS AMER DE SURINAM.*

Legnum Coiſſi. FERMIN. *tom.* 1. *pag.* 212.
Lignum amarum Quaſſi. CLERC. *tom.* 1. *pag.* 426.
Quſſia amara. LIN. SP. 553 & 1679.

Eſt radix vel lignum leve & inodorum ſicut Betula, amaroris intenſi, non ingrati, cujus cortex ad Simaroubam accedit.

LIGUSTICUM, *LE SÉSÉLI.* PL. 341.

Liguſticum, quod Seſeli officinarum. P. 162. T. 323.
Siler montanum. DOD. 310.

Laserpitium Siler. LIN. SP. 357.

Folia, flores & semina sunt in usu.

LILIUM ALBUM, *Le Lis Blanc.* PL. 343.

Lilium album vulgare. J. B. 2. 685. T. 369.
Lilium candidum. LIN. SP. 433.

Bulbi & flores in usu.

LILIUM CONVALLIUM, *Le Muguet.* PL. 344.

Lilium convallium album. P. 304. T. 77.
Convallaria majalis. LIN. SP. 451.

Flores in usu.

LIMONES, *Les Limons.* PL. 227.

Malus Limonia acida. P. 436.
Limon vulgaris. T. 621.
Citrus medica Limon. LIN. SP. 1100.

Fructus in usu.

LINARIA, *La Linaire.* PL. 345.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. P. 212. T. 170.
Antirrhinum Linaria. LIN. SP. 858.

Herba in usu.

LINGUA CERVINA, *La Scolopendre.* PL. 346.

Lingua cervina officinarum. P. 353. T. 544.
Scolopendria vulgaris. TRAG. 549.
Asplenium Scolopendrium. LIN. SP. 1537.

Folia in usu.

LINUM, *Le Lin.* PL. 347.

Linum sativum. P. 214. T. 339.
Linum usitatissimum. LIN. SP. 397.

Semina in usu.

LIQUIDAMBAR, *Le Liquidambar.* PL. 77.

Liquidambar. P. 502.
Liquidambar arbor, seu Styraciflua Aceris folio. PLUK. ALM. 224. *t.* 42. *f.* 6.
Liquidambar Styraciflua. LIN. SP. 1418.

Liquidambar est resina è flavo fusca, saporis acris, aromatici; odoris suavis. Præfertur liquidæ consistentiæ Balsami Peruviani nigri instar; Arbor in Virginiâ, novâ Hispaniâ & aliis occidentalibus regionibus crescit. Styrax liquida ex eâdem arbore educitur: est resina tenax, consistentiæ melleæ, è fusco grisea, odoris ut plurimùm gravis.

LITHOSPERMUM, *Le Grémil*, *L'Herbe aux Perles*. Pl. 349.

Lithospermum majus erectum. P. 258. T. 137.
Lithospermum, *sive Milium Solis*. J. B. 3. 590.
Lithospermum officinale. Lin. Sp. 189.

Semina in usu.

LOBELIA. *La Cardinale bleue*. (*Flos Cardinalis.*) Phytant. N.° 512.

Rapuntium americanum flore dilute cæruleo. T. 163.
Rapunculus galeatus virginianus flore violaceo majore. Moris. 2. *p*. 466. *f*. 5. *t*. 5. *f*. 55.
Lobelia siphilitica. Lin. Sp. 1320.

Lobelia à *Lobelio* Medico Insulano nomen accepit. Tota planta in usu.

LUJULA, L'*Alleluia*. Pl. 353.

Oxytriphyllum & Panis Cuculi. Officinarum.
Trifolium Acetosum vulgare. P. 330.
Oxys flore albo. T. 88.
Oxalis Acetosella. Lin. Sp. 620.

Herba in usu.

LUPINUS, *Le Lupin*. Pl. 354.

Lupinus sativus flore albo. P. 347. T. 392.
Lupinus albus. Lin. Sp. 1015.

Semina in usu.

LUPULUS, *Le Houblon*. Pl. 355.

Lupulus mas & femina. P. 298. T. 535.
Vitis septentrionalium. Lob. Icon. 629.
Humulus Lupulus. Lin. Sp. 1457.

Flores, folia, radices & teneri asparagi in usu.

LYCOPERSICON, *La Pomme d'amour*.

Solanum Pomiferum fructu rotundo striato molli albo. P. 167.

Aurea mala. Dod. 458.
Lycoperſicon fructu albo. T. 150.
Solanum Lycoperſicon. Lin. Sp. 265.

Fructus in uſu.

MAJORANA, *La Marjolaine.* Pl. 356.

Sampſucus, ſeu Amaracus. Officinarum.
Majorana vulgaris. P. 224. T. 199.
Origanum Majorana. Lin. Sp. 825.

Folia & comæ florentes in uſu.

MALVA, *La Mauve.* Pl. 357.

Malva vulgaris flore majore folio ſinuato. J. B. 2. 949. T. 95.
Malva ſylveſtris major. Taber. Icon. 768.
Malva ſylveſtris. Lin. Sp. 969.

Radices, folia, flores & ſemina in uſu.

MANDRAGORA, *La Mandragore.* Pl. 363.

Mandragora fructu rotundo. P. 169. T. 76.
Mandragora mas. J. B. 3. 617.
Atropa Mandragora. Lin. Sp. 259.

Folia & radicum cortices in uſu.

MANNA CALABRINA, *La Manne de Calabre.* Pl. 97.

Succus è Fraxino exudans & concretus, ſive Manna officinarum. P. 497.

È diverſis arboribus in variis regionibus Manna colligitur; ſed præfertur quæ è Fraxinis & Ulmis in Calabriâ, Siciliâ & Agro romano, ſponte vel è vulneratâ arbore exſudat. Ratione conſiſtentiæ duplex eſt: alia in *lacrymis*, *bacillis* aut *granulis*; alba eſt, parum rubeſcens, ſicca, levis, ſapore dulci nec injucundo. *Manna pinguis*, in grumis ſeu fruſtis craſſioribus affertur. Eligenda recens à ſordibus libera; rejicienda pinguior, mellea, ſordida & adulterata.

MARRUBIUM ALBUM, *Le Marrube blanc.* Pl. 364.

Marrubium album vulgare. P. 230. T. 192.
Praſſium album. Taber. Icon. 539.

Marrubium vulgare. LIN. SP. 816.

Herba in ufu.

MARRUBIUM NIGRUM, *LE MARRUBE NOIR.* PL. 365.

Marrubium nigrum fetidum. P. 230. FUCHS. 154.
Ballote. MATH. 825. T. 185.
Ballota nigra. LIN. SP. 814.

Herba in ufu.

MARUM, *LE MARUM.* PL. 366.

Chamædrys maritima incana frutefcens, foliis lanceolatis. T. 205.
Marum Cortufi. J. B. 3. 242.
Teucrium Marum. LIN. SP. 788.

Folia & comæ florentes in ufu.

MASTICHE, *LE MASTIC.* PL. 87.

Lentifcus vulgaris. P. 399. T. 580.
Lentifcus chia ex quâ fluit Maftiche. T. ITER. *tom.* 1. 285.
Piftacia Lentifcus. LIN. SP. 1455.

MASTICHE refina eligatur in granis majoribus, alba, pellucida, friabilis, ductilis, odoris grati. In infulâ Chio naturaliter producta colligitur; rarius in Hifpaniâ, Galliâ Narbonenfi, &c.

MATRICARIA, *LA MATRICAIRE.* PL. 368.

Matricaria vulgaris, five fativa. P. 133. T. 493.
Matricaria Parthenium. LIN. SP. 1255.

Flores & comæ florentes in ufu.

MECHOACANNA, *LE MÉCHOACAN.*

Convolvulus americanus, Mechoacan *dictus.* RAJ. HIST. 723. T. 84.
Jetucu, five Mechoacanna. PISON. 253.

MECHOACANNA eft radix infipida ferè & inodora. Eligenda alba ponderofa, non cariofa. Ex Americæ regione ejufdem nominis advehitur.

MELILOTUS, *LE MÉLILOT.* PL. 370.

Melilotus officinarum Germaniæ. P. 331. T. 407.

Trifolium Melilotus officinarum. LIN. SP. 1078.

Tota planta florida in uſu.

MELILOTUS ODORA, *LE BAUMIER, ou LOTIER ODORANT.* PL. 352.

Lotus hortenſis odora. P. 331.
Melilotus major odorata violacea. T. 407. MORIS. 2. 161. *ſ.* 2. *t.* 16. *f.* 10.
Trifolium Melilotus cærulea. LIN. SP. 1077.

Folia, flores & ſemina in uſu.

MELISSA, *LA MÉLISSE, ou CITRONELLE.* PL. 371.

Meliſſa hortenſis. P. 229. T. 193.
Meliſſa officinalis. LIN. SP. 827.

Tota planta florida in uſu.

MELO, *LE MELON.* PL. 373.

Melo vulgaris. P. 310. T. 104.
Cucumis Melo. LIN. SP. 1436.

Semina in uſu.

MENTHA, *LA MENTHE CRÉPUE DES JARDINS.* PL. 377.

Mentha criſpa verticillata. P. 227. T. 189.
Mentha ſativa. LIN. SP. 805.

Tota planta florida in uſu.

MENTHA AQUATICA, *LA MENTHE AQUATIQUE.* PL. 379.

Mentha rotundifolia paluſtris, ſive aquatica major. P. 227. T. 189.
Siſymbrium. DOD. 97.
Mentha aquatica. LIN. 805.

Tota planta florida in uſu.

MENTHA PULEGIUM, *LE POULIOT.* PL. 381.

Pulegium latifolium. P. 222.
Mentha aquatica ſive Pulegium vulgare. T. 189.
Mentha Pulegium. LIN. SP. 807.

Tota planta florida in uſu.

MENTHA

MENTHA PIPERITA, *LA MENTHE POIVRÉE.*

Mentha Piperis ſapore; officinarum. DAL. 160.
Mentha ſpicis brevioribus & habitioribus, foliis Menthæ fuſcæ, ſapore fervido Piperis. RAJ. SYNOP. 3. *p.* 134. *t.* 10. *f.* 2.
Mentha piperita. LIN. SP. 805.

In Angliâ creſcit. Tota planta florida in uſu.

MENYANTHES, *LE TREFLE D'EAU.* PL. 375.

Trifolium fibrinum. Officinarum.
Menyanthes paluſtre latifolium & triphyllum. T. 117.
Menyanthes trifoliata. LIN. SP. 208.

Folia in uſu.

MERCURIALIS, *LA MERCURIALE.* PL. 382.

Mercurialis mas & femina. P. 121. T. 534.
Mercurialis annua. LIN. SP. 1465.

Tota planta in uſu.

MESPILUS, *LE NEFFLIER.* PL. 383.

Meſpilus Germanica folio Laurino, non ſerrato, ſive Meſpilus ſylveſtris. P. 453. T. 641.
Meſpilus Germanica. LIN. SP. 684.

Fructus & folia in uſu.

MEUM, *LE MEUM.* PL. 24.

Meum foliis Anethi. P. 148. T. 312.
Radix urſina. J. B. 3. 11.
Athamanta Meum. LIN. SP. 353.

Radices MEI ſunt oblongæ, digito craſſæ, foris fuſcæ, intùs albicantes, aromaticæ: eligantur recentes. Hæc planta in montoſis locis Galliæ, Italiæ & Germaniæ creſcit.

MILLEFOLIUM, *LA MILLE-FEUILLE.* PL. 388.

Millefolium vulgare album. P. 140. T. 496.
Stratiotes. LUGD. 766.
Achillea Millefolium. LIN. SP. 1267.

Tota planta in uſu.

L

MOMORDICA, *La Pomme de merveille*. Pl. 389.

Balſamina rotundifolia repens, ſive mas. P. 306.
Momordica vulgaris. T. 103.
Momordica Balſamina. Lin. Sp. 1433.

Fructus in uſu.

MORUS, *Le Meurier*. Pl. 390.

Morus fructu nigro. P. 459. T. 589.
Morus nigra. Lin. Sp. 1398.

Radix, cortex & fructus in uſu.

MUSCUS CLAVATUS, *Le pied de Loup*. Pl. 393.

Muſcus terreſtris clavatus. P. 360.
Lycopodium. Taber. Icon. 814. Dod. 472.
Muſcus vulgaris ſquamoſus repens clavatus. T. 553.
Lycopodium clavatum. Lin. Sp. 1564.

Semen ejus, *Sulphur vegetabile* dicitur.

MUSCUS VULGARIS, *La Mousse commune*. Pl. 393.

Muſcus ſquamoſus major, ſive vulgaris. T. 553.
Muſcus vulgatiſſimus. P. 360.
Hypnum triquetrum. Lin. Sp. 1589.

Herba in uſu.

MYROBALANI, *Les Myrobolans*. Pl. 51.

Myrobalani I, II, III, IV, V, priores. P. 445.

Myrobalaniferæ arbores ad pruniferas referuntur, & in multis Indiæ orientalis regionibus reperiuntur. Quinque in officinis habentur Myrobalanorum ſpecies: nempe.

Myrobalani Belliricæ, *les Mirobolans Bellirics*. Sunt fructus oblongi, non numquam anguloſi, includentes oſſiculum durum ſub putamine carnoſo & rubente, ſaporis ſubacris & aſtringentis.

Myrobalani Chebulæ, *les Mirobolans Chébules*. Sunt fructus oblongi, in quinque coſtas elevati, rugoſi, cæterarumque ſpecierum omnium maximi, includentes ſub putamine carnoſo, ſubfuſco, oſſiculum oblongum cavernoſum, ſaporis ſubacris.

MYROBALANI CITRINÆ, *les Mirobolans Citrins.* Sunt fructus subrotundi, pentagoni, rugosi, *Chebulis* minores, coloris citrini; includentes sub putamine carnoso officulum angulosum.

MYROBALANI EMBLICÆ, *les Mirobolans Emblics.* Sunt fructus rotundi, nigri, sexangulares, includentes sub pericarpio carnoso, in sex partes per maturitatem dehiscente, officulum turgidum, hexagonum, saporis acerrimi.

MYROBALANI INDÆ, *les Mirobolans Indiens.* Sunt fructus longi superficie angulari, rugosi, duri foris & extùs nigri, saporis subacidi, acerbi & astringentis.

Eligantur MYROBALANI omnes, carnosiores, crassiores, & ponderosiores.

MYRRHA, *LA MYRRHE.*

Myrrha troglodítica. Officinarum.
Myrrha. P. 501.

MYRRHA est gummi-resina arida, fusca, amara, aromatica, fragrans, friabilis, levis. Eligatur pura. Ex arbore non satis descriptâ colligitur; affertur ex Æthiopiâ, Arabiâ, & Ægypto.

MYRRHIS ODORATA, *LE CERFEUIL MUSQUÉ.*

Myrrhis major, seu Cicutaria odorata. P. 160. T. 315.
Cerefolium hispanicum. TABER. ICON. 93.
Scandix odorata. LIN. SP. 368.

Tota planta in usu.

MYRTHUS, *LE MYRTHE.* PL. 396.

Myrthus communis, italica. P. 468. T. 640. LIN. SP. 673.
Folia, flores & baccæ in usu.

MYRTHUS BRABANTICA, *LE PIMENT ROYAL.* PL. 397.

Rhus myrthifolia belgica. P. 414.
Gale frutex odoratus septentrionalium. J. B. 1. 225.
Myrica Gale. LIN. SP. 1453.
Tota planta & præcipue comæ floridæ sunt in usu.

NAPUS, *LE NAVET.* PL. 399.

Napus sativa, radice alba. P. 95. T. 229.

Brassica Napus. LIN. SP. 931.

Radix & semina sunt in usu. Seritur in arvis æstate, Buniadis varietas est.

NARDUS CELTICA, *LE NARD CELTIQUE.* PL. 25.

Spica celtica. Officinarum.
Nardus celtica Dioscoridis. P. 165.
Nardus gallica. LUGD. 923.
Valeriana celtica. T. 131. LIN. SP. 46.

SPICÆ CELTICÆ sunt radices cum foliis. Eligantur recentes, odoris aromatici, suaves, radiculis numerosis cohærentes, plenæ, non fragiles. In Alpibus Helvetiæ & Valesiæ nascuntur.

NARDUS INDICA, *LE NARD INDIEN.*

Spica Nardi, & Spica Indica. Officinarum.
Calamus odoratus Mathioli. P. 17.
Andropogon Nardus. LIN. SP. 1482.

SPICÆ NARDI sunt radices oblongæ, fungosæ, digiti crassitiei & longitudinis, nervosis filamentis convolutæ, spicæ figuram referentes, coloris è fusco rufescentis, saporis aromatici. Eligendæ recentes, comâ longâ donatæ, Cyperum redolentes. Ex Indiâ orientali advehuntur.

NASTURTIUM AQUATICUM, *LE CRESSON D'EAU.* PL. 403.

Nasturtium aquaticum supinum. P. 104. DOD. 592.
Sisymbrium aquaticum. T. 226.
Sisymbrium Nasturtium. LIN. SP. 916.

Tota planta in usu.

NASTURTIUM HORTENSE, *LE CRESSON ALENOIS.* PL. 401.

Nasturtium hortense vulgatum. P. 103. T. 213. DOD. 771.
Lepidium sativum. LIN. SP. 899.

Folia & semina in usu.

NASTURTIUM INDICUM, *LA CAPUCINE.* PL. 404.

Nasturtium indicum majus & minus. P. 306.
Cardamindum majus & minus. T. 430.
Tropæolum minus. LIN. SP. 490.

Folia & flores sunt in usu. Europæis innotuit circa annum 1580.

NASTURTIUM VERRUCARIUM, *LE CRESSON SAUVAGE*. PL. 402.

Ambrosia campestris repens. P. 138.
Nasturtium sylvestre, capsulis cristatis. T. 214.
Coronopus Ruellii, sive Nasturtium verrucosum. J. B. 2. 919.
Cochlearia Coronopus. LIN. SP. 904.

Herba in usu.

NEPETA, L'*HERBE AU CHAT*. PL. 405.

Mentha Cataria vulgaris major. P. 228.
Cataria major vulgaris. T. 202.
Nepeta Cataria. LIN. SP. 796.

Tota planta in usu.

NICOTIANA, *LE TABAC*. PL. 407.

Nicotiana major latifolia. P. 169. T. 117.
Petum latifolium. CLUS. HIST. 309.
Nicotiana Tabacum. LIN. SP. 258.

Folia in usu. Europæis innotuit circa annum 1560.

NIGELLA, *LA NIELLE*. PL. 410.

Nigella arvensis cornuta. P. 145. T. 258.
Melanthium sylvestre. DOD. 303.
Nigella arvensis. LIN. SP. 753.

Semina in usu.

NINZIN, *LE NINZIN*. PL. 27.

Sisarum montanum coræense, radice non tuberosa. KÆMPF. AMŒNIT. 817. *t*. 818.
Sium Ninsi. LIN. SP. 361.

GINS-ENG & NINZIN sunt radices plantarum genere & specie diversarum; viribus tamen aut figurâ ferè similes. Eligendæ oblongæ vix digiti minimi crassitie, bifidæ, flavescentes, non cariosæ, duræ, sabamaricantes & aromaticæ. Nascitur NINZIN in Tartariâ Chinâ & regno Siam.

NUMMULARIA, *LA NUMMULAIRE*. PL. 415.

Nummularia major lutea. P. 309.

Lysimachia humifusa folio rotundiore flore luteo. T. 141.
Centimorbia. J. B. 3. 370.
Lysimachia Nummularia. LIN. SP. 211.

Tota planta in usu.

NUX MOSCHATA, *LA NOIX MUSCADE.* PL. 71.

Nux Moschata fructu rotundo. P. 407.
Bongo-pala. PISON. MANT. 173.

NUCES MOSCHATÆ rotundæ præferuntur; oblongæ enim sylvestres esse creduntur. Eligendæ ponderosæ & pingues, seu quæ acu calido punctæ oleum emittunt. In insulâ Bandâ nascuntur.

MACIS non est *flos*, sed *involucrum*, putamini duro nucis Moschatæ, instar reticuli circumductum. Eligendum recens, integrum, pingue, oleosum, odore suavi, sapore sub acri, colore ex aureo rufescenti.

NUX VOMICA, *LA NOIX VOMIQUE.* PL. 72.

Nux Vomica officinarum. P. 511. RAJ. HIST. 1814.
Caniram. RHEED. MALAB. 1. *p.* 67. *t.* 37.
Strychnos Nux Vomica. LIN. SP. 271.

NUCES VOMICÆ sunt semina orbiculata, compressa, parum lanuginosa, cineracea, amara, duritie corneâ. È Malabariâ advehuntur.

NYMPHÆA ALBA, *LE NÉNUPHAR BLANC.* PL. 416.

Nymphæa alba major. P. 193. T. 260.
Nymphæa alba. LIN. SP. 729.

Radices & flores in usu.

OCYMUM, *LE BASILIC.* PL. 418.

Ocymum Caryophyllatum majus. P. 226. T. 203.
Ocymum Basilicum. LIN. SP. 833.

Folia flores & semina in usu.

OLEA, L'*OLIVIER.* PL. 421.

Olea sativa. P. 472.
Olea europæa. LIN. SP. 11.

È fructu maturo OLEÆ fit OLEUM COMMUNE sive OLIVARUM; l'*Huile d'Olive.* Colitur Olea in calidis regionibus Galliæ, Hispaniæ, &c.

OLIBANUM, L'*Oliban*, *ou* ENCENS MALE.

Olibanum, *sive Thus masculum. Officinarum.*

OLIBANUM est resina è flavo pallescens, duriuscula, semidiaphana, odore ad ignem fragranti. Genuinum ad albedinem magis accedit, friabile est, purum, & in guttas concretum. Arboris è quâ colligitur, non extat accurata descriptio.

OPHIOGLOSSUM, LA LANGUE DE SERPENT. PL. 425.

Ophioglossum vulgatum. P. 354. T. 548. LIN. SP. 1518.

Herba in usu.

OPOPANAX, L'*Opoponax*.

Panax Costinum. P. 156.
Panax Heracleum. MORIS. 3. 315. *s.* 9. *t.* 17. *f.* 2.
Pastinaca sylvestris altissima. T. 319.
Pastinaca Opopanax. LIN. SP. 376.

OPOPANAX est gummi in granulis, rufi, albi, & flavi coloris, in glebas compactum, saporis amari, ingrati; odoris gravis. Si in aquâ facilè solvatur & lactescat, sincerum habetur. È vulneratâ circa radicem plantâ æstivo tempore exsudat atque sponte in Oriente concrescit.

OPUNTIA COCHINILLIFERA, LA RAQUETTE QUI PORTE LA COCHENILLE.

Ficus indica major, *levis seu spinosa vermiculos proferens.* PLUK. ALM. 146. *t.* 281. *f.* 383.
Opuntia maxima.... SLOAN. 194. *Hist.* 2. *p.* 152. *t.* 8 *f.* 1. 2.
Cactus cochinillifer. LIN. SP. 670.

OPUNTIA COCHINILLIFERA crescit in Jamaicâ & Americâ calidiore. *Vide* COCCUS OPUNTIÆ in Regno Animali.

ORIGANUM, L'*Origan*. PL. 430.

Origanum sylvestre, *Cunila bibula Plinii.* P. 223. T. 198.
Origanum vulgare. LIN. SP. 824.

Tota planta in usu.

ORIZA, LE RIZ. PL. 433.

Oriza. P. 24. T. 514.
Oryza sativa. LIN. SP. 475.

Semina in usu.

OROBUS, L'*Orobe*. Pl. 432.

Orobus siliquis articulatis, semine majore. P. 346.
Ervum verum. T. 398.
Ervum Ervilia. Lin. Sp. 1040.

Semina in usu.

PÆONIA MAS, *La Pivoine male.* Pl. 435.

Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. P. 323. T. 273.
Pæonia officinalis mas. Lin. Sp. 747.

Radix, & semina in usu.

PÆONIA FEMINA, *La Pivoine femelle.* Sp. 435.

Pæonia femina flore pleno rubro majore. P. 324. T. 274.
Pæonia officinalis femina. Lin. Sp. 747.

Flores in usu.

PALMA MAJOR, *Le Palmier dattier.* Pl. 47.

Palma major. P. 506.
Palma Dactylifera major vulgaris. Jonst. Den. 138. Sloan. Jam. 174.
Phœnix Dactylifera. Lin. Sp. 1658.

Dactyli sunt fructus oblongi rotundi, includentes sub dulci carne nucleum durum, oblongum, per longitudinem sulcatum. Eligendi sunt recentes magni, carnosi, vinosi, & saporis mellei. È Syriâ, Ægypto aliisque calidis orientalibus regionibus advehuntur.

PALMA OLEOSA, *Le Palmier de Guinée.*

Arbor exotica fructu Dactylis simili. P. 508.

Oleum palmeum è fructibus *Palmæ Oleosæ* conficitur. Eligendum recens, crassum, non rancidum, consistentiæ Butyri, aurantii coloris, & odoris suavis. *Palma Oleosa* in Guineâ sponte crescit.

PAPAVER ALBUM, *Le Pavot blanc.* Pl. 106.

Papaver hortense semine albo sativum. P. 170. T. 237.
Papaver somniferum. Lin. Sp. 726.

Folia, capita & semina sunt in usu.

Opium est substantia è Papavere albo collecta, ponderosa, densa, inflammabilis, facile solubilis, partim resinosa, partim gummosa, nigricans, odore

odore soporifera, gravis & sapore amara. Opium è regione *Thebaïcâ*, Ægypto confini collectum, optimum censetur. Opium minus purum MECONIUM vulgò nuncupatur.

PAPAVER NIGRUM, *LE PAVOT NOIR.* PL. 440.

Papaver hortense semine nigro. P. 170. T. 237.

Est varietas præcedentis, afferente *LINNÆO.*

PAPAVER RUBRUM, *LE PAVOT ROUGE, LE COQUELICOT.* PL. 439.

Papaver erraticum majus. P. 171. T. 238.
Papaver Rhœas. LIN. SP. 726.

Flores seu petala in usu.

PAREIRA-BRAVA, seu BUTUA, *LE PAREIRA-BRAVA.*

Convolvulus brasilianus, flore octopetalo monococcos. RAJ. HIST. 1331.
Caapeba. PISON. 261.
Cissampelos Pareira. LIN. SP. 1473.

PAREIRÆ-BRAVÆ radices juniores seu minores, foris coloris sunt è cinereo-nigricantis; annosæ sunt majores planè & nigrescunt; intùs colorem referunt è fusco luteum. Eligendæ amaro-dulces, crassiores, non cariosæ: ex Americâ afferuntur.

PARIETARIA, *LA PARIÉTAIRE.* PL. 441.

Helxine. MATH. 1113.
Parietaria officinarum. P. 121. T. 509. LIN. SP. 1492.

Tota planta in usu.

PASSULÆ MAJORES, *LES RAISINS DE DAMAS.* PL. 50.

Uvæ passæ majores, seu Passulæ Damascenæ. Officinarum.
Vitis Damascena. T. 613.
Vitis vinifera. P. 299. LIN. SP. 293.

PASSULÆ MAJORES sunt Uvæ maturæ exsiccatæ. Eligantur pingues & recentes. In Italiâ & Hispaniâ parantur; præferuntur tamen quæ ex Syriâ advehuntur.

PASSULÆ MINORES, *LES RAISINS DE CORINTHE.* PL. 50.

Uvæ passæ minores, vel Passulæ Corinthiacæ. P. 299.

M

Vitis Corinthiaca seu Apyrina. T. 613. LIN. SP. 293.

PASSULÆ MINORES parantur ut majores & ex insulis Ægei maris advehuntur. Eligantur recentes.

PENTAPHYLLUM, *La Quinte-feuille.* PL. 481.

Quinquefolium majus repens. P. 325. T. 297.
Pentaphyllum, sive Quinquefolium vulgare, repens. J. B. 2. 397.
Potentilla reptans. LIN. SP. 714.
Radix & folia in usu.

PERSICARIA MITIS. *La Persicaire douce.* PL. 446.

Persicaria mitis maculosa. P. 101. T. 509.
Polygonum Persicaria. LIN. SP. 518.
Folia in usu.

PERSICARIA URENS, *La Persicaire acre.* PL. 447.

Persicaria urens, seu Hydropiper. P. 101. T. 509.
Polygonum Hydropiper. LIN. SP. 517.
Folia in usu.

PERSICA MALUS, *Le Pêcher.* PL. 362.

Persica molli carne, & vulgaris, viridis & alba. P. 440. T. 624.
Amygdalus Persica. LIN. SP. 676.

Flores, fructus, amygdalæ &. gummi in usu.

PERVINCA, *La Pervenche.* PL. 448.

Clematis Daphnoïdes, major (& minor.) P. 301.
Pervinca vulgaris latifolia, (& angustifolia.) T. 120.
Vinca major (& minor.) LIN. SP. 304.
Folia in usu.

PETASITES, *Le Pétasite.* PL. 449.

Petasites major & vulgaris. P. 197. T. 451.
Tussilago Petasites. LIN. SP. 1215.
Radix in usu.

PETROSELINUM, *Le Persil.* PL. 450.

Apium hortense, seu Petroselinum vulgò. P. 153. T. 305.

Apium Petroſelinum. LIN. SP. 379.

Radix, folia & ſemina in uſu.

PETROSELINUM MACEDONICUM, *LE PERSIL DE MACÉDOINE.* PL. 451.

Apium Macedonicum. P. 154. T. 305.
Petroſelinum Macedonicum. LOB. ICON. 708.
Bubon Macedonicum. LIN. SP. 364.

Semina in uſu. Eligantur recentia, nitida, odoris & ſaporis grati, aromatici.

PHYTOLACCA, *LA MORELLE DES INDES.* PL. 455.

Phytolacca americana majori fructu. T. 299.
Solanum magnum virginianum rubrum. PARK. 347.
Phytolacca decandra. LIN. SP. 631.

Radices, folia & fructus in uſu.

PIMENTUM, PIPER AROMATICUM, *LE POIVRE DE LA JAMAIQUE.* PL. 58.

Piper jamaïcenſe, quibuſdam. DAL. 423.
Myrtus arborea aromatica, foliis Laurinis. SLOAN. JAM. 161. *hiſt.* 2. *p.* 76. *t.* 191. *f.* 1.
Caryophyllus aromaticus americanus Lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari. PLUK. ALM. 88. *t.* 155. *f.* 4.
Myrtus Pimenta. LIN. SP. 676.

PIMENTA ſunt fructus immaturi, orbiculares, cortice fuſco, rugoſo, umbilicato, odore & ſapore aromatico ad Caryophyllos accedentes. falſò AMOMUM nuncupantur.

PILOSELLA, *LA PILOSELLE, L'OREILLE DE SOURIS.* PL. 456.

Piloſella major repens hirſuta. P. 262.
Piloſella auricula Muris. TABER. ICON. 196.
Dens Leonis qui Piloſella officinarum. T. 469.
Hieracium Piloſella. LIN. SP. 1125.

Folia & flores in uſu.

PIMPINELLA, *LA PIMPRENELLE.* PL. 457.

Pimpinella Sanguiſorba minor hirſuta lævis. P. 160. T. 157.
Poterium Sanguiſorba. LIN. SP. 1411.

Folia in uſu.

PIMPINELLA ALBA, *La Pimprenelle blanche*, *La boucage*. Pl. 522.

Pimpinella Saxifraga major, umbellâ candidâ. P. 159.
Tragoselinum majus, umbellâ candidâ. T. 309.
Pimpinella Saxifraga major. Lin. Sp. 378.

Radix in usu.

PINUS, *Le Pin*. Pl. 65.

Pinus sativa. P. 491. T. 585.
Pinus Pinea. Lin. Sp. 1419.

Nuclei Pinei, *les Pignons doux*, sunt fructus oblongi, candidi, subdulces, in officulis crassis, duris, in strobilum squamatim dispositis, inclusi. Eligantur recentes.

PINUS SYLVESTRIS, *Le Pin sauvage*. Pl. 81.

Pinus sylvestris vulgaris genevensis. J. B. 1. 253. T. 586.
Pinus sylvestris. P. 491. Lin. Sp. 1418.

È vulnerato cortice manat resina, alia liquidior Terebenthina communis vocata; alia siccior, Resina pinea seu Pix alba dicta, *la Poix blanche ou de Bourgogne*, *Poix-résine*. Ex accensâ arbore paratur Pix nigra, Pix sutoria, Pix navalis (*le Goudron*,) &c. Hæc ultima species è septentrionalibus regionibus affertur.

PIPER, *Le Poivre noir*. Pl. 56.

Piper rotundum nigrum. P. 411.
Malago-Codi. Rheed. Mal. 7. *pag.* 23. *t.* 12.
Piper nigrum. Lin. Sp. 40.

Eligenda grana Piperis majora, saporis fervidi, non pulvere nec aliis quisquiliis inquinata. Colitur in Malabariâ, javâ & multis Indiæ orientalis regionibus.

Piper album, *le Poivre blanc*, est Piper priùs descriptum; sed maceratum & cortice mundatum.

PIPER LONGUM, *Le Poivre long*. Pl. 57.

Macropiper. Officinarum.
Piper longum orientale. P. 412.

Cattu-Tirpali. RHEED. MAL. 7. *pag.* 27. *t.* 14.
Piper longum. LIN. SP. 41.

PIPER LONGUM eſt fructus oblongus, teres, nigricans, figuræ julorum Coryli; ſaporis fervidi, amaricantis. Ex Malabariâ, Javâ advehitur.

PISTACIA, *LE PISTACHIER.* PL. 64.

Piſtacia peregrina, fructu racemoſo, ſeu Terebinthus Indica. P. 401.
Terebinthus Indica Theophraſti, Piſtacia Dioſcoridis. T. 580.
Piſtacia vera. LIN. SP. 1454.

PISTACIÆ ſunt fructus ſeu *nuces* oblongæ, anguloſæ, Avellanæ magnitudinis; ſub putamine tenui, rufo, nucleum vireſcentem, gratum, dulcem, includentes. Eligantur recentes, ponderoſæ, non rancidæ. Ex Arabiâ, Perſiâ, Syriâ & Indiâ afferuntur.

PLANTAGO, *LE PLANTAIN.* PL. 461.

I. Plantago latifolia ſinuata. P. 189. T. 126.
Plantago major. LIN. SP. 163.

II. Plantago latifolia incana. P. 189. T. 126.
Plantago media. LIN. SP. 163.

III. Plantago anguſtifolia major. P. 189. T. 127.
Plantago Lanceolata. LIN. SP. 164.

Adhibentur indiſcriminatim. Tota planta in uſu.

POLIUM MONTANUM, *LE POLIUM.* PL. 462.

Polium montanum luteum. P. 220. T. 206.
Teucrium Polium. LIN. SP. 792.

Folia & comæ florentes in uſu.

POLYGALA, L'*HERBE A LAIT.* PL. 463.

Polygala vulgaris. P. 215. T. 174. LIN. SP. 986.
Flos Ambarvalis. DOD. 253.
Polygala. ACT. SCIENT. 1739. *pag.* 135.

Tota planta in uſu.

POLYGONATUM, *LE SCEAU DE SALOMON.* PL. 464.

Polygonatum latifolium vulgare. P. 303. T. 78.

Polygonatum, vulgò Sigillum Salomonis. J. B. 3. 529.
Convallaria Polygonatum. LIN. SP. 451.

Radix in usu.

POLYGONUM, *LA RENOUÉE, LA TRAINASSE.* PL. 465.

Polygonum latifolium. P. 281. T. 510.
Polygonum, sive Centinodia. J. B. 3. 374.
Polygonum aviculare. LIN. SP. 519.

Herba in usu.

POLYPODIUM, *LE POLYPODE.* PL. 466.

Polypodium vulgare. P. 359. T. 540. LIN. SP. 1544.

Radices POLYPODII eligantur recentes, dulces, intus ex albo flavescentes & in arboris locis altioribus natæ.

POMA RENETIA, *LES POMMES DE REINETTE.*

Malus Prasomila. P. 433.
Malus sativa, fructu subrotundo, è viridi pallescente, acido-dulci. T. 634.
Pyrus Malus Prasomila. LIN. SP. 686.

POMA CURTIPENDULA, *LES COURT-PENDUS, ou CAPENDUS.*

Malus Curtipendula dicta. J. B. 1. 21.
Malus sativa pediculo fermè carente. T. 634.
Pyrus Malus Cestiana. LIN. SP. 686.

POPULUS, *LE PEUPLIER.* PL. 467.

Populus nigra. P. 429. T. 592. DOD. 836. LIN. SP. 1464.

Gemmæ in usu.

PORRUM, *LE POIREAU.* PL. 468.

Porrum commune capitatum. P. 72. T. 382.
Allium Porrum. LIN. SP. 423.

Pars inferior & alba plantæ prope radicem est in usu.

PORTULACA, *LE POURPIER.* PL. 469.

Portulaca latifolia sativa. P. 288. T. 236.

Portulaca oleracea. LIN. SP. 638.

Herba & ſemina ſunt in uſu.

PRIMULA-VERIS, *LA PRIMEVERE.* PL. 470.

Herba paralyſis. Officinarum.
Primula veris odorata, flore luteo ſimplici. T. 124.
Primula veris officinalis. LIN. SP. 204.

Folia & flores in uſu.

PRUNUS, *LE PRUNIER.* PL. 471.

Prunus fructu magno, dulci, atro-cæruleo. T. 622.
Prunus domeſtica Damaſcena. LIN. SP. 680.

Fructus & gummi in uſu.

PSYLLIUM, L'*HERBE AUX PUCES.* PL. 473.

Pſyllium majus erectum. P. 191. T. 128.
Pulicaris herba. LUGD. 1172.
Plantago Pſyllium. LIN. SP. 167.

Semina in uſu.

PTARMICA, L'*HERBE A ÉTERNUER*, (*Dracunculus.*) PL. 251.

Dracunculus pratenſis ſerrato folio. P. 98.
Ptarmica vulgaris folio longo ſerrato flore albo. T. 496.
Achillea Ptarmica. LIN. SP. 1266.

Radix & folia in uſu.

PULMONARIA, *LA PULMONAIRE.* PL. 475.

Symphitum maculoſum, ſive Pulmonaria latifolia. P. 259.
Pulmonaria Italorum, ad Buglosſum accedens. T. 136.
Pulmonaria officinalis. LIN. SP. 194.

Tota planta in uſu.

PULSATILLA, *LA COQUELOURDE.* PL. 477.

Pulſatilla folio craſſiore, & majore flore. P. 177. T. 284.
Herba venti. TRAG. 413.

Anemone Pulsatilla. Lin. Sp. 759.

Radix folia & flores in uſu.

PUNICA, *Le Grenadier.* Pl. 361.

I. *Malus Punica ſativa.* P. 438.
Punica, quæ Malum Granatum fert. T. 636.
Punica Granatum. Lin. Sp. 676.

II. *Balauſtia flore pleno majore.* P. 438.
Balauſtium. Taber. Icon. 1033.
Punica flore pleno majore. T. 636.

Prioris arboris mali cortex Malicorium dicitur. Flores verò poſterioris Balaustiæ nuncupantur. Eligantur recentes. È regionibus calidioribus advehuntur.

PYRETHRUM, *La Pyretre.* Pl. 325.

Pyrethrum flore Bellidis. P. 148.
Pyrethrum officinarum, Salivaris. Lob. Icon. 774.
Anthemis Pyrethrum. Lin. Sp. 1262.

Utimur radicibus. Eligantur inſtar Piperis acres, teretes, majores & recentes. È calidioribus regionibus afferuntur.

PYROLA, *La Pyrole.* Pl. 478.

Pyrola rotundifolia major. P. 191. T. 256. Dod. 138.
Pyrola, à Pyri folio. Lob. Icon. 294.
Pyrola rotundifolia. Lin. Sp. 567.

Folia in uſu.

PYRUS, *Le Poirier.* Pl. 479.

Pyrus ſylveſtris. P. 439. T. 632.
Pyrus communis Pyraſter. Lin. Sp. 686.

Fructus in uſu.

QUERCUS, *Le Chêne.* Pl. 480.

Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo eſt. P. 419. T. 582.
Quercus Robur. Lin. Sp. 1414.

Lignum, cortices, folia & fructus in uſu.

RANUNCULUS

RANUNCULUS BULBOSUS, *La Renoncule bulbeuse*. Pl. 482.

Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda. P. 179. T. 289.
Ranunculus bulbosus. Lob. Icon. 667. Lin. Sp. 778.

Radix in usu.

RAPA, seu RAPUM, *La vraie Rave*. Pl. 486.

Rape, ou Navet. Vernaculè.
Rapa sativa rotunda. P. 89. T. 228.
Orbiculatum, seu turbinatum Rapum majus. Lob. Icon. 197.
Brassica Rapa. Lin. Sp. 931.

Radix & semina in usu. Apud nos a Buniade & a Napo sativo Rapa non differt, nisi culturâ, loco & sationis tempore.

RAPHANUS, *Le Raifort, La Rave des Parisiens*. Pl. 487.

I. Radis. Vernaculè.
Raphanus minor oblongus. P. 96. T. 229.
Radicula sativa minor. Dod. 676.

II. Rémola. Vernaculè.
Raphanus major orbicularis vel rotundus. P. 96. T. 229.
Raphanus, sive radicula sativa. Dod. 676.
Raphanus niger. P. 96. T. 229. Lob. Icon. 202.
Raphanus sativus. Lin. Sp. 935.

Radice majori, vel minori, dulciori aut acriori, albâ vel nigrâ variat. Folia & radix in usu.

RAPHANUS RUSTICANUS, *Le Raifort sauvage*. Pl. 488.

Raphanus rusticanus. P. 96.
Cochlearia folio cubitali. T. 215.
Cochlearia Armoracia. Lin. Sp. 904.

Radix in usu.

RHABARBARUM, *La Rhubarbe*. Pl. 28.

Rhabarbarum folio oblongo crispo undulato flabellis sparsis, seu Rhabarbarum verum officinarum. Geof. Mat. Med. 2. 125.

Rheum undulatum. LIN. SP. 531.

RHABARBARUM eſt radix flava, amara, ſub-aſtringens, odorata, nucis Moſchatæ venas confracta imitans. Eligatur compacta, inter manducandum nec lenta nec glutinoſa, & levi infuſione aquam croceo colore citò tingens. Patriam agnoſcit Chinam & Siberiam.

RHAPONTICUM, *LE RHAPONTIC.* PL. 324.

Rhaponticum folio Lapathi majoris glabro. P. 117.
Rhabarbarum forte Dioſcoridis & antiquorum. T. 89.
Rheum Rhaponticum. LIN. SP. 531.

RHAPONTICUM eſt radix Rhabarbarum æmulans; ſed oblongior, levior, minus amara, odorata & inter mandendum lenta ac glutinoſa. In Thraciâ, Scythiâ & Monte aureo reperitur.

RHAMNUS CATHARTICUS, *LE NERPRUN.* PL. 492.

Spina cervina. Officinarum.
Rhamnus catharticus. P. 478. T. 593. LIN. SP. 279.

Baccæ in uſu.

RICINOIDES, *LES PIGNONS D'INDE.* PL. 67.

Ricinus americanus major, ſemine nigro. P. 432.
Ricinoïdes americana, Goſſipii folio. T. 656.
Jatropha Curcas. LIN. SP. 1429.

RICINOIDES eſt fructus oblongus, ovalis, Fabæ minoris magnitudine, unâ parte convexâ, alterâ depreſſâ; ſub pelliculâ corticoſâ, duriuſculâ, nigrâ, nucleum candidum includens: eligatur recens. Planta creſcit in Americâ Calidiore.

RICINUS, *LE RICIN.* PL. 66.

Ricinus vulgaris. P. 432. T. 532.
Ricinus, Gallis Palma Chriſti. LOB. HIST. 392.
Ricinus communis. LIN. SP. 1430.

Semina in uſu.

ROSA DAMASCENA, *LES ROSES MUSCATES, ou DE DAMAS,* PL. 495.

Roſa Moſchata ſimplici flore. P. 482. T. 637.

Rosa Moschata alba. TABER. ICON. 1086.

Flores in usu.

ROSA PALLIDA, *LA ROSE PALE.* PL. 494.

Rosa rubra pallidior. P. 481. T. 637.
Rosa holoserica. LOB. ICON. 2. 207.

Flores in usu.

ROSA RUBRA, *LA ROSE ROUGE, ou DE PROVINS*, (*Rosa Provincialis.*) PL. 495.

Rosa rubra multiplex. P. 481. T. 637.
Rosa Provincialis major. TABER. ICON. 1084.
Rosa Gallica. LIN. SP. 704.

Flores in usu.

ROSMARINUS, *LE ROMARIN.* PL. 497.

Anthos. Officinarum.
Rosmarinus hortensis angustiore folio. P. 217. T. 195.
Rosmarinus officinalis. LIN. SP. 33.

In usu sunt folia & flores qui ANTHOS in officinis nuncupantur.

ROS SOLIS, *LE ROSSOLIS.* PL. 498.

Ros Solis folio rotundo. P. 357. T. 245.
Drosera rotundifolia. LIN. SP. 402.

Tota planta in usu.

RUBIA TINCTORUM, *LA GARANCE.* PL. 500.

Rubia Tinctorum sativa. P. 333. T. 114.
Rubia tinctorum. LIN. SP. 158.

Radix in usu.

RUBUS, *LA RONCE.* PL. 501.

Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro. P. 479. T. 614.
Rubus fruticosus. LIN. SP. 707.

Folia, fructus vernaculè *Mures sauvages*, & cymæ florentes in usu.

RUBUS IDÆUS, *Le Framboisier*. Pl. 502.

Rubus Idæus spinosus. P. 479. T. 614.
Rubus Idæus. Lin. Sp. 706.

Fructus vulgò Frambœsia, *la Framboise*, folia & cimæ florentes in usu.

RUSCUS, *Le Petit Houx*, *Le Houx-Frélon*. Pl. 504.

Ruscus, sive Bruscus. Officinarum.
Ruscus Myrtifolius aculeatus. T. 79.
Ruscus aculeatus. Lin. Sp. 1474.

Radix folia & fructus in usu.

RUTA, *La Rue*. Pl. 505.

Ruta hortensis latifolia. P. 336. T. 257.
Ruta graveolens. Lin. Sp. 548.

Folia, semina & summitates florentes in usu.

SABINA, *La Sabine*. Pl. 506.

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis. P. 487.
Juniperus Sabina. Lin. Sp. 1472.

Folia & summitates in usu.

SAGAPENUM, *La Gomme Séraphique.*

Sagapenum. P. 494. Raj. Hist. I. 1844.

Sagapenum est gummi-resina seu lacryma è sauciatâ Ferulâ Sagapeniferâ fluens. Optimum censetur translucidum, in granis, acre, foris flavum vel rufum, intùs dilutioris coloris, odore ad Porrum accedens. In Mediâ, Persiâ, &c, nascitur.

SAGU, *Le Sagou*.

Palmam referens arbor farinifera. P. 508.
Palma indica, caudice in annulos protuberante distincto. Raj. Hist. 1360.
Tessio. Kæmpf. Amœn. 897.
Cycas circinalis. Lin. Sp. 1658.

SAGU ſunt granula pallida, è farinâ aut medullâ arboris in Indiâ parata. In lacte vel juſculo, ebullitione diluuntur.

SALAB, *Le Salop.*

Orchis Morio femina. P. 82.
Orchis Morio femina procerior majori flore. T. HERB. vj.
Orchis Morio. LIN. SP. 1333.

SALAB vel SALEP eſt radix oblonga, alba, pellucida, paulum compreſſa, non nihil corrugata, ſapore gummi Tragacanthi, odoris nullius. È Turciâ aſportatur exſiccata. Hæc Orchidis ſpecies in paluſtribus pariſienſibus *de Bonelle* & *de Saint-Clair* & in noſtratibus etiam reperitur.

SALICARIA, *La Salicaire.* PL. 507.

Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. T. 253.
Lyſimachia ſpicata purpurea. P. 246.
Lythrum Salicaria. LIN. SP. 640.

Herba in uſu.

SALIX, *Le Saule.* PL. 508.

Salix vulgaris alba arboreſcens. P. 473. T. 590.
Salix Alba. LIN. SP. 1449.

Cortices & folia in uſu.

SALSAPARILLA, *La Salsepareille.* PL. 29.

Smilax aſpera peruviana, ſive Salſaparilla. P. 296.
Smilax Sarſaparilla. LIN. SP. 1459.

SALSAPARILLA ſunt radices Calami ſcriptorii craſſitiei, cum tenui nervo in meditullio, facilè fiſſiles, coloris foris obſcurioris, intùs albicantis: rejice carioſas & pulverulentas. Ex Americâ advehuntur.

SALVIA MAJOR, *La grande Sauge.* PL. 510.

Salvia major, an ſphacelus Theophraſti? P. 237. T. 180.
Salvia officinalis. LIN. SP. 34.

SALVIA MINOR, *La petite Sauge.* P. 511.

Salvia minor, aurita & non aurita. P. 237. T. 181.

Eadem eſt ac prior. Folia & flores in uſu.

SAMBUCUS, *Le Sureau.* Pl. 512.

Sambucus fructu in umbellâ nigro. P. 456. T. 606.
Sambucus nigra. Lin. Sp. 385.

Baccæ ejus quæ Grana actes dicuntur, flores, folia & cortices ſecundi in uſu.

SANGUIS DRACONIS, *Le Sang-Dragon.* (*Draco-arbor*). Pl. 92.

Pterocarpus Sanguis Draconis officinarum. Crantz. Inst. *tom.* 2. *pag.* 77.
Draco arbor indica ſiliquoſa, Populi folio. Comm. Hort. Amst. *tom.* 1. *p.* 213. *t.* 109.
Pterocarpus Draco. Lin. Sp. 1662.

Sanguis Draconis eſt ſuccus reſinoſus, concretus, friabilis. Eligendus clarus pellucidus & eleganter ruber. Extillat optimus Sanguis Draconis ex arbore *Pterocarpo Dracone*, in Indiis.

SANICULA, *La Sanicle.* Pl. 514.

Sanicula officinarum. P. 319. T. 326.
Diapenſia. Camer. Epist. 763.
Sanicula europæa. Lin. Sp. 339.

Folia & flores in uſu.

SANTALUM, *Le Santal.*

Santalum album. P. 392. Lin. Sp. 497.
Santalum verum. Breyn. Icon. 94. *t.* 5. *f.* 1.

Santalum album eſt lignum durum, ſolidum, pallidum, odoris & ſaporis grati, ſub-amari, aromatici. Ex Indiâ orientali affertur.

Santalum Album & Citrinum ex unâ & eâdem arbore producitur. Pars corticalis Santalum album dicitur; medullaris verò Citrinum, affirmante *Garcia.* (Dale. Pharmacol. 355). Citrinum albo ponderoſius, fragrantius atque pretioſius eſt.

SANTALUM RUBRUM, *Le Santal rouge.*

Santalum rubrum. P. 393. Raj. Hist. 1805.

Santalum rubrum eſt lignum à cortice externo liberatum, rubrum, ponderoſum, fibroſum, denſum, ſaporis aſtringentis. Ex Indiâ affertur.

SAPONARIA, *LA SAVONIERE.* PL. 516.

Saponaria major levis. P. 206.
Lychnis sylvestris quæ Saponaria vulgò. T. 336.
Saponaria officinalis. LIN. SP. 584.
Folia in usu.

SARCOCOLLA. *LA SARCOCOLLE.*

Tithymali myrsinitis specie arbuscula æthiopica...... Lacrymam fundens. PLUK. *Mantissâ.* 183. *t.* 44.
Penæa Sarcocolla. LIN. SP. 162.

SARCOCOLLÆ granula sunt gummosa, parva, friabilia, amaricantia, inodora. Eligatur SARCOCOLLA recens, pallida, (vetustate enim rufescit,) ponderosa & glutinosa. Ex Æthiopiâ affertur.

SASSAFRAS, *LE SASSAFRAS.* PL. 38.

Sassafras arbor ex Florida ficulneo folio. P. 431.
Laurus Sassafras. LIN SP. 531.

SASSAFRAS est radix levis, acris, odore ad Fœniculum accedens. Eligatur odorata, tecta cortice fulvo foris, intùs ferrugineo. Ex Americâ advehitur.

SATUREIA, *LA SARIETTE.* PL. 517.

Satureia sativa. T. 197.
Satureia hortensis. LIN. SP. 795.
Herba in usu.

SATIRYUM, *LE SATYRIUM.* PL. 427.

Cynosorchis militaris major. P. 81.
Orchis militaris major. T. 432.
Orchis militaris. LIN. SP. 1333.
Radices in usu.

SAXIFRAGA ALBA, *LA SAXIFRAGE BLANCHE.* PL. 519.

Saxifraga rotundifolia alba. P. 309. T. 252.
Saxifraga granulata. LIN. SP. 576.
Radix in usu.

SAXIFRAGA ANTIQUORUM, *LA SAXIFRAGE ORDINIARE, LA CASSE-PIERRE.*

Saxifraga antiquorum, quibusdam. J. B. 3. 338.

Caryophyllus Saxifragus. P. 211.
Lychnis minor Saxifraga. T. 338.
Silene Saxifraga. LIN. SP. 602.

Semina in uſu.

SCABIOSA, *LA SCABIEUSE.* PL. 524.

Scabioſa pratenſis hirſuta, quæ officinarum. P. 269. T. 464.
Scabioſa arvenſis. LIN. SP. 143.

Herba in uſu.

SCAMMONIUM, *LA SCAMMONÉE.* PL. 104.

Convolvulus ſyriacus, ſive Scammonia ſyriaca. T. 83. MORIS. 2. 12. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 5.
Convolvulus Scammonia. LIN. SP. 218.

SCAMMONIUM eſt reſina nigreſcens, friabilis, odoris ingrati, è radice plantæ educta & concreta. SCAMMONIUM eligatur leve, nitidum ſplendidum, madefactum lacteſcens, & linguam non vehementer vellicens. *Alepenſe* Præſtantius eſt *Smyrnenſi.*

SCILLA, *LA SCILLE BLANCHE, ou ROUGE.* PL. 527.

Scilla vulgaris radice rubrâ, (& albâ). P. 73.
Ornithogalum maritimum, ſeu Scilla radice rubrâ, (& albâ). T. 381.
Scilla maritima. LIN. SP. 442.

SCILÆ radix eſt bulboſa: eligatur recens. Naſcitur in locis maritimis arenoſis Hiſpaniæ: Siciliæ, & Syriæ.

SCORDIUM, *LE SCORDIUM.* PL. 530.

Scordium. P. 247.
Chamædrys paluſtris caneſcens, ſeu Scordium officinarum. T. 205.
Teucrium Scordium. LIN. SP. 790.

Folia & flores in uſu.

SCORZONERA, *LA SCORSONERE.* PL. 532.

Scorzonera latifolia ſinuata. P. 275. T. 476.
Scorzonera Hiſpanica. LIN. SP. 1112.

Radix in uſu.

SCROPHULARIA SYLVESTRIS, *LA SCROPHULAIRE DES BOIS.* PL. 533.

Scrophularia nodoſa fetida. P. 235. T. 166.

Scrophularia

Scrophularia nodosa. LIN. SP. 863.

Radix & folia in usu.

SCROPHULARIA AQUATICA, *LA SCROPHULAIRE AQUATIQUE.* PL. 534.

Scrophularia aquatica major. P. 235. T. 166.
Betonica aquatica. DOD. 50.
Scrophularia aquatica. LIN. SP. 864.

Radix & folia in usu.

SEBESTEN, *LES SÉBESTES.* PL. 49.

Sebestena domestica. P. 446.
Cordia Myxa. LIN. SP. 273.

SEBESTEN seu SEBESTINÆ sunt fructus Prunis ferè similes, minores tamen, nigricantes & sub pulpâ carnosâ, dulci, mucilaginosâ, nucleum includentes. Eligantur recentes. Arbor in Syriâ, Ægypto & Malabariâ crescit.

SECALE, *LE SEGLE.* PL. 535.

Secale hibernum, vel majus. P. 23. T. 513.
Roga. DOD. 499.
Secale cereale hybernum. LIN. SP. 124.

Farina & furfur in usu.

SEDUM ACRE, *LA VERMICULAIRE.* PL. 538.

Sempervivum minus vermiculatum acre. P. 283.
Sedum parvum acre, flore luteo. T. 263.
Illecebra seu Sempervivum tertium. DOD. 129.
Sedum acre. LIN. SP. 619.

Herba in usu.

SEDUM MAJUS, *LA GRANDE JOUBARBE.* PL. 536.

Sedum majus vulgare. P. 283. T. 262.
Sempervivum tectorum. LIN. SP. 664.

Folia in usu.

SEDUM MINUS, *LA PETITE JOUBARBE, LA TRIQUE-MADAME.* PL. 537.

Sedum minus teretifolium album. P. 283. T. 262.

Sedum album. LIN. SP. 619.

Herba in ufu.

SEMEN CONTRA, *La Semence contre les Vers.*

Semen contra, Semenzina, femen Sanctum, Sementina. Officinarum.
Abfinthium Santonicum judaïcum. P. 139.
Artemifia judaïca. LIN. MANT. 111.

Eligantur femina oblonga, ex viridi flavefcentia, cum pulvere aut quifquiliis non mixta; odoris Zedoariæ; faporis acris, amari. Planta in Judæâ, Arabiâ & Numidiâ crefcit.

SENECA, *Le Sénéka.* PL. 30.

Polygala caule Simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis alternis integerrimis, racemo terminali erecto GRON. VIRG. 1. *p.* 80.
Polygala Senega. LIN. SP. 990.

SENECA eft radix *Polygalæ virginianæ*, digiti minimi craffitiei, variè contorta, in plures ramos divaricata, extùs fubluteа, intùs alba, faporis acris, amaricantis & non nihil aromatici. Eligatur recens, integra.

SENECIO, *Le Seneçon.* PL. 540.

Senecio minor vulgaris. P. 131. T. 456.
Erigeron. LOB. ICON. 225.
Senecio vulgaris. LIN. SP. 1216.

Herba in ufu.

SENNA, *Le Séné.* PL. 42.

Folia orientalia. Officinarum.
Senna alexandrina, five foliis acutis. P. 397.
Caffia Senna. LIN. SP. 539.

FOLIA SENNÆ funt pallido-flavo-viridefcentia, amaricantia, naufeofa. Eligantur acuta, recentia, integra, ex Alexandriâ allata; Italica enim funt latiora, obtufiora & vilioris pretii. SENNÆ FOLLICULI feu *filiquæ* veniunt quoque in ufum: funt capfulæ feminales, fulcatæ, recurvæ, femilunares, compreffæ, continentes femina nigricantia: eligantur recentes, integræ, & à ftipitibus liberatæ.

SERPENTARIA VIRGINIANA, *La Serpentaire de Virginie.* PL. 30.

Serpentaria virginiana, feu Viperina. Officinarum.

Aristolochia Pistolochia caule nodoso seu Serpentaria virginiana. RAJ. HIST. 394.

Aristolochia Serpentaria. LIN. SP. 1363.

Radices SERPENTARIÆ, sunt fibrosæ, tenues, nigrescentes, aromaticæ, odore Valerianam æmulantes. Plerumquè totam plantam cum radice fasciatim accipimus. Eligantur recentes.

SERPYLLUM, *LE SERPOLET.* PL. 541.

Serpyllum vulgare majus. P. 220. T. 197.

Thymus Serpyllum. LIN. SP. 825.

Folia & summitates florentes in usu.

SESAMUM, *LE SÉSAME, LA JUGEOLINE.*

Sesamum veterum. P. 27.

Digitalis orientalis, Sesamum dicta. T. 165.

Sesamum orientale. LIN. SP. 883.

Semina SESAMI eligantur recentia, albicantia, oleosa, dulcia. In Ægypto, Siciliâ & Italiâ colitur.

SESELI MASSILIENSE, *LE SÉSÉLI DE MARSEILLE.*

Seseli massiliense, Fœniculi folio. P. 161.

Fœniculum tortuosum. T. 311.

Seseli tortuosum. LIN. SP. 373.

Semen SESELI est oblongum, depressum, viridiusculo-pallidum, odore gratum, acre, aromaticum, ex Galliâ narbonensi & Provinciâ allatum. Eligatur recens.

SIDERITIS, *LA CRAPAUDINE.* PL. 544.

Sideritis hirsuta procumbens. P. 233. T. 191.

Sideritis hirsuta. LIN. SP. 803.

Herba in usu.

SIGILLUM BEATÆ MARIÆ, *LE SCEAU DE NOTRE-DAME, LA RACINE VIERGE.* (*Bryonia nigra racemosa*). PL. 182.

Bryonia lævis, sive nigra racemosa. P. 297.

Tamnus racemosa flore minore, luteo-pallescente. T. 103.

Vitis sylvestris. DOD. 401.

Tamus communis. LIN. SP. 1458.

Radix in usu.

SIMAROUBA, *Le Simarouba.*

Simarouba. Reg. Scient. 1729 & 32.
Terebinthus americana polyphylla. Com. Hort. Amst. 1. *p.* 149. *t.* 77.
An? Bursera gummifera. Lin. Sp. 471.

Simarouba est cortex multis fibris constans, pallidus, amarore non ingratus, parum astringens, resinosus, aquam ebullitione lacteo colore inficiens. Europæis innotuit anno 1713.

SINAPI, *La Moutarde.* Pl. 546 & 547.

I. *Sinapi Rapi folio.* P. 99. T. 227.
Sinapis nigra. Lin. Sp. 933.
II. *Sinapi Apii folio.* P. 99.
Sinapi album, siliquâ hirsutâ, semine albo & rufo. T. 227.
Sinapis alba. Lin. Sp. 933.

Alba & nigra sumuntur indiscriminatim. Semina in usu.

SOLANUM, *La Morelle.* Pl. 561.

Solanum officinarum acinis nigricantibus. P. 166. T. 148.
Solanum nigrum vulgatum. Lin. Sp. 266.

Folia, summitates florentes & baccæ in usu.

SOLANUM TUBEROSUM, *La Pomme de terre.* Pl. 562.

Solanum tuberosum esculentum. P. 167. *Prodr.* 89. T. 149.
Solanum tuberosum. Lin. Sp. 265.

Solanum tuberosum in Peru indigenum; in Europâ, ubi nunc colitur, innotuit circa annum 1590.

SOLDANELLA, *La Soldanelle, Le Chou marin.* Pl. 563.

Soldanella maritima minor. P. 295.
Brassica marina sive Soldanella. J. B. 2. 166.
Convolvulus maritimus nostras rotundifolius. T. 83.
Convolvulus Soldanella. Lin. Sp. 226.

Tota planta in usu.

SONCHUS LÆVIS ET ASPER, *Le Laitron doux et Épineux.* Pl. 564. & 565.

Sonchus lævis, laciniatus, latifolius, (& asper laciniatus & non laciniatus). P. 123. & 124. T. 474.

Sonchus oleraceus lævis, (*& asper*). LIN. SP. 1116.

Sonchus lævis, asper, laciniatus & non laciniatus indiscriminatim sumuntur. Folia in usu.

SOPHIA CHIRURGORUM. *LE THALITRON.* PL. 553.

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. P. 105.
Sophia Chirurgorum. LOB. ICON. 738.
Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio. T. 226.
Sisymbrium Sophia. LIN. SP. 920

Semina in usu.

SORBUS, *LE SORBIER ou CORMIER.* PL. 556.

Sorbus sativa. P. 415. T. 633.
Sorbus domestica. LIN. SP. 684.

Fructus in usu.

SPERGULA, L'*ESPARCELLE.*

Alsine Spergula dicta. P. 251. T. 243.
Spergula. J. B. 3. 722. DOD. 537.
Spergula arvensis. LIN. SP. 630.

Herba in usu.

SPHONDYLIUM, *LA BERCE.* PL. 568.

Sphondylium vulgare hirsutum. P. 157. T. 320.
Sphondylium. DOD. 307.
Heracleum sphondylium. LIN. SP. 358.

Folia in usu.

SPINA ALBA, L'*ÉPINE BLANCHE.* PL. 384.

Mespilus Apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha. P. 454. T. 642.
Oxyacantha vulgaris sive Spinus albus. J. B. 1. 49.
Cratægus Oxyacantha. LIN. SP. 683.

Fructus in usu.

STAPHISAGRIA, L'*HERBE AUX POUX.* PL. 570.

Staphisagria. P. 324. DOD. 366.
Delphinium Platani folio Staphisagria dictum. T. 428.
Delphinium Staphisagria. LIN. SP. 750.

Staphisagriæ ſemina ſunt triangularia, aſpera, nigro-griſea, acria, nauſeoſa. Eligantur recentia. È calidioribus regionibus Galliæ, Hiſpaniæ & Italiæ advehuntur.

STŒCHAS ARABICA, *Le Stéchas arabique.* Pl. 45.

Stœchas purpurea. P. 216. T. 216.
Spica florida, Stœchas arabica vulgò dicta. J. B. 3. 277.
Lavandula Stœchas. Lin. Sp. 800.

Stœchados spicæ eligantur integræ, multis floribus munitæ, odoratæ, recentes. Ex Galliâ & Italiâ afferuntur.

STRAMONIUM, *La Pomme épineuse.* Pl. 572.

Stramonium fructu rotundo ſpinoſo flore albo ſimplici. T. 118.
Datura Stramonium. Lin. Sp. 255.

Stramonium creſcit in Americâ: nunc vulgare eſt in Europâ. Folia in uſu.

STYRAX CALAMITA, *Le Storax calamite.* Pl. 93.

Styrax folio Mali Cotonei. P. 452. T. 598.
Styrax officinale. Lin. Sp. 635.

Styrax Calamita eſt reſina pinguis, rufeſcens, multis granulis albicantibus mixta & odoris ſuavis. Rejicitur nigra & furfurea.

Styrax in granis naturalis, rariſſima. Hodie in maſſâ multis quiſquiliis & raſuris ligneis inquinatâ affertur. Olim in calamis ſeu cannis advehebatur, undè nomen Calamitæ. Styrax arbor in ſolis regionibus orientalibus, Syriâ, Pamphiliâ, Ciciliâ, reſinam fundit.

SUMACH, *Le Sumach.* Pl. 493.

Rhus virginianum. P. 521. T. 611.
Rhus Typhinum. Lin. Sp. 380.

Fructus & ſemina in uſu.

TACAMAHACA, *La Gomme Tacamaque.* Pl. 94.

Tacamahaca arbor Populo ſimilis reſinoſa altera. P. 430.
Tacamahaca foliis crenatis. Pluk. Alm. 360.
Populus Balſamifera. Lin. Sp. 1464.

Tacamahaca eſt reſina arida, flaveſcens vel rufa, in glebas compacta, ſaporis reſinoſi aromatici, odoris ſuavis. Eligenda pura, ſuaveolens & fragrans. Duplex reperitur; quæ ſponte fluit, & in corticibus Cucurbitarum aſſervatur, *Tacamaque en coque* dicitur; altera in la-

chrymis & glebis variæ magnitudinis advehitur. Arbor in novâ Hiſpaniâ & inſulâ Madagaſcar creſcit.

TAMARINDUS, *Le Tamarinier*, *Les Tamarins*. Pl. 54.

Siliqua arabica, quæ Tamarindus. P. 403.
Tamarindus indica. Lin. Sp. 48.

Tamarindi ſunt fructus obtriti, in maſſam coacti, rarò integri, nigro-rufeſcentes, acidi, multis villis intertexti, ſemina dura, angulosa continentes. Eligantur recentes, pingues. Arbor in utrâque Indiâ, Ægypto, & Arabiâ naſcitur.

TAMARISCUS, *Le Tamaris*. Pl. 577.

Tamariſcus narbonenſis. Lob. Icon. 218. T. 661.
Tamarix gallica. Lin. Sp. 386.

Radicis cortex præfertur.

TANACETUM, *La Tanesie*. Pl. 578.

Tanacetum vulgare luteum. P. 132. T. 461.
Athanaſia. Lugd. 955.
Tanacetum vulgare. Lin. Sp. 1184.

Summitates florentes & folia in uſu.

TEREBINTHINA CHIA, *La Térébenthine de Chio*. Pl. 78.

Terebinthus vulgaris. P. 400. T. 579.
Piſtacia Terebinthus. Lin. Sp. 1455.

Terebinthina chia eſt reſinoſa ſubſtantia, pellucida, Terebinthinâ vulgari ſeu Venetâ ſpiſſior, è candido & flavo cæruleſcens, amaricans, ſuaveolens, temporis lapſu ſolideſcens ac flaveſcens magis, tandem fit ſolida. Eligatur pura. Ex Chio & Cypro inſulis advehitur.

THEA, *Le Thé*. Pl. 44.

Chaa. P. 147.
The Sinenſium. Bryen. Cent. 111. *t.* 112. *Ic.* 17. *t.* 3.
Thea Bohea, (*& viridis*). Lin. Sp. 735.

Folia Theæ colliguntur & exſiccantur in regno Japonico & Chinâ.

THLASPI, *Le Thlaspi*. Pl. 584.

Thlaſpi vulgatius. T. 212. J. B. 2. 921.
Thlaſpi campeſtre. Lin. Sp. 902.

Semina in uſu.

THYMELÆA, *Le Garou.* Pl. 586.

Thymelæa foliis Lini. P. 463. T. 594.
Daphne gnidium. Lin. Sp. 511.

Thymelæa crescit in Hispaniâ, Italiâ & Galliâ narbonensi. Radices afferuntur; quibus succedaneæ sunt radices Thymelææ Mezerei. Ligni cortex hodiè ad usum externum adhibetur.

THIMELÆA MEZEREUM, *Le bois genti, Le Mézéréon.* Pl. 333.

Laureola folio diciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina. P. 462.
Daphnoïdes, Camer. Epist. 937.
Thymelæa Lauri folio deciduo sive Laureola femina. T. 595.
Daphne Mezereum. Lin. Sp. 509.

Fructus & semina utriusque Thymelææ, Grana cnidia seu Cocci cnidii dicuntur.

THYMUS, *Le Thim.* Pl. 588.

Thymus vulgaris. P. 219. T. 196. Lin. Sp. 825.

Folia & summitates florentes in usu.

TILIA, *Le Tilleul.* Pl. 590.

Tilia femina folio majore, (& minore). P. 426. T. 611.
Tilia europæa. Lin. Sp. 733.

Folia, flores & fructus in usu.

TITHYMALUS CATAPUTIA, *L'Épurge.* Pl. 593.

Lathyris major. P. 293.
Tithymalus latifolius Cataputia dictus. T. 86.
Euphorbia Lathyrus. Lin. Sp. 655.

Semen in usu.

TORMENTILLA, *La Tormentille.* Pl. 596.

Tormentilla sylvestris. P. 326. T. 298.
Tormentilla erecta. Lin. Sp. 716.

Radix in usu.

TRAGACANTHUM

TRAGACANTHUM GUMMI, *La Gomme Adragant.*

Tragacantha. P. 388.
Tragacantha massiliensis. T. 417.
Astragalus Tragacantha. Lin. Sp. 1073.

Tragacanthum est lacryma gummosa, lucida, tenax, levis, mucilaginosa, è vulneratâ plantâ fluens. Eligenda alba, pura, vermiculata, subdulcis. Planta in littore Massiliensi & Æthnâ nascitur.

TRITICUM, *Le Froment.* Pl. 606.

Triticum hibernum aristis carens. P. 21. T. 512. Lin. Sp. 126.

Semen in usu. Ex eo fit Farina, Similago, Furfur, Amylum & Panis, sive *fermentatus*, sive *azymus* seu fermenti expers (*Pain à chanter*).

TURPETHUM, *Le Turbith.* Pl. 32.

Turpethum repens, foliis Althææ vel indicum. P. 149.
Convolvulus indicus..... Turbith officinarum. T. 84.
Convolvulus Turpethum. Lin. Sp. 221.

Turpethi radicum cortices eligantur resinosi, albicantes, non cariosi. Ex Malabariâ & insulâ Ceylan advehuntur.

TUSSILAGO, *Le Tussilage.* Pl. 607.

Tussilago vulgaris. P. 197. T. 487.
Tussilago Farfara. Lin. Sp. 1214.

Folia & flores in usu.

VALERIANA HORTENSIS, *La grande Valériane.* Pl. 608.

Valeriana hortensis. P. 164. T. 132.
Valeriana Phu. Lin. Sp. 45.

Radix & folia in usu.

VALERIANA SYLVESTRIS, *La Valériane des Bois.* Pl. 609.

Valeriana sylvestris major. P. 164. T. 132.
Valeriana officinalis. Lin. Sp. 45.

Folia & radix in usu.

VANILLA, *La Vanille.* Pl. 55.

Vanilla flore viridi & albo, fructu nigricante. Plum. Gen. 25. *Icon.* 188.

Vanille. MERIAN. SUR. 25.
Lobus aromaticus subfuscus, Terebinthi corniculis similis. P. 404.
Epidendrum Vanilla. LIN. SP. 1374.

Siliquæ VANILLÆ sunt compressæ, longæ, calami scriptorii majoris crassitiei, coloris atro-fusci, saporis aromatici, odoris grati, pulpam seu medullam cum minutissimis acinis continentes. Eligendæ pingues & recentes. Ex Americâ afferuntur.

VERBASCUM, *LA MOLÊNE, LE BOUILLON BLANC.* PL. 613.

I. Verbascum mas latifolium luteum. P. 239. T. 146.
Verbascum Tapsus. LIN. SP. 252.

II. Verbascum femina flore luteo magno. P. 239. T. 147.
Verbascum Phlomoïdes. LIN. SP. 253.

Tapsus & Phlomoïdes sumuntur indiscriminatim. Folia & flores in usu.

VERBENA, *LA VERVEINE.* PL. 614.

Verbena communis flore cæruleo. P. 269. T. 200.
Verbena officinalis. LIN. SP. 29.

Herba florida in usu.

VERONICA, *LA VÉRONIQUE.* PL. 616.

Veronica mas supina & vulgatissima. P. 246. T. 143.
Veronica officinalis. LIN. SP. 14.

Herba florida in usu.

VIOLA, *LE VIOLIER, LES VIOLETTES.* PL. 622.

Viola martia purpurea flore simplici odoro. P. 199. T. 419.
Viola odorata. LIN. SP. 1324.

Folia, flores & semina in usu.

VIRGA AUREA, *LA VERGE D'OR.* PL. 627.

Virga aurea vulgaris latifolia. J. B. 2. 1062. T. 484.
Solidago Virga aurea. LIN. SP. 1232.

Radices, folia & flores in usu.

VIRGA AUREA MAJOR, *LA GRANDE VERGE D'OR.*

Virga aurea, sive Solidago saracenica latifolia serrata. J. B. 2. 1063.

Consolida aurea. TABER. ICON. 556.
Jacobæa alpina foliis longioribus serratis. T. 485.
Senecio saracenicus. LIN. SP. 1221.

Folia & flores in usu.

VISCUM, *LE GUI.* PL. 628.

Viscum baccis albis. P. 423. T. 610.
Viscum album. LIN. SP. 1451.

VISCUM est planta parasitica, fruticosa; multis arboribus innascens. Præfertur *Viscum Quercûs.* È fructu ejus, seu baccis, paratur GLUTEN, (*la Glu*): paratur quoque Gluten ex foliis Ilicis aquifolii.

VITIS, *LA VIGNE.* PL. 630.

Vitis vinifera. P. 298. T. 613. LIN. SP. 293.

VINUM est succus Uvarum maturarum VITIS VINIFERÆ, fermentationem spirituosam passus. Varia in variis regionibus Vina parantur, *alba, rubra, gallica, hispanica, italica, rhenana,* &c.

Vinum sit clarum, antiquum, subtile, maturum.

È Vino fit *Spiritus Vini*, AQUA VITÆ dictus.

FÆCES VINI veniunt quoque in usum.

TARTARUM est sal essentiale Vini, quo dolia in quibus Vinum asservatur, intùs quasi incrustantur: Vina rubra RUBRUM, alba ALBUM TARTARUM largiuntur.

ACETUM est Vinum fermentationem acidam passum. Sit fragrans, fortis, & gratæ aciditatis.

VITIS IDÆA, *L'AIRELLE, LA MYRTILLE.* PL. 631.

Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante. P. 470. T. 608.
Vitis Idæa, sive Myrtillus. TABER. ICON. 1078.
Vaccinium Myrtillus. LIN. SP. 498.

Fructus in usu.

ULMARIA, *LA REINE DES PRÉS.* PL. 632.

Ulmaria. T. 265. CLUS. cxviij. J. B. 3. 488.

Regina prati. Dod. 57.
Spiræa Ulmaria. Lin. Sp. 702.

Radix, folia & flores in ufu.

ULMUS, L'*Orme.* Pl. 633.

Ulmus campeftris. P. 426. T. 601. Lin. Sp. 327.

Cortices, folia & aqua veficularum in ufu.

UMBILICUS VENERIS, *Le Nombril de Vénus.* Pl. 634.

Cotyledon vera, radice tuberofâ. J. B. 3. 683.
Cotyledon major. P. 285. T. 90.
Cotyledon Umbilicus Veneris tuberofa. Lin. Sp. 615.

Herba in ufu.

URTICA, L'*Ortie Grièche, et la grande Ortie.* Pl. 637.

Urtica urens major, (& minor). Officinarum.
Urtica urens maxima, (& minor). P. 232. T. 534.
Urtica urens, (& dioïca). Lin. Sp. 1396.

Sumuntur indifcriminatim. Herba in ufu.

URTICA ROMANA. L'*Ortie romaine.* Pl. 638.

Urtica urens pilulas ferens. P. 232.
Urtica Romanà. Lob. Icon. 522.
Urtica urens pilulas ferens 1. *Diofcoridis, femine Lini.* T. 535.
Urtica pilulifera. Lin. Sp. 1395.

Herba in ufu.

UVA URSI, *La Bousserole ou Buxerole.*

Uva Urfi. Clus. Hist. 63. T. 599.
Radix Idæa putata & Uva Urfi. J. B. 1. 524.
Arbutus Uva Urfi. Lin. Sp. 566.

Folia & fummitates in ufu.

VULNERARIA RUSTICA, *La Vulnéraire des Paysans.* Pl. 640.

Loto affinis, Vulneraria pratenfis. P. 332.
Vulneraria ruftica. T. 391.
Vulneraria ruftica flore ferrugineo. Act. Stoch. 1741.

Anthyllis Vulneraria. LIN. SP. 1012.

Herba in uſu.

ZEDOARIA, *LE ZÉDOAIRE.* (*Zerumbeth*). PL. 33.

Zedoaria longa, (*& rotunda*). P. 36.
Malan-Kua, RHEED. MAL. 11. *p.* 17. *t.* 9.
Kæmpferia rotunda. LIN. SP. 3.

ZEDOARIÆ radices ſunt tuberoſæ, nodoſæ, fragrantes, cinereæ, ſapore acri, amaricante, ad Camphoram accedente. Eligendæ ponderoſæ, non carioſæ. Ex Indiâ orientali afferuntur.

ZEDOARIA LONGA & ROTUNDA ejuſdem radicis variæ partes eſſe videntur.

ZINZIBER, *LE GINGEMBRE.* PL. 34.

Zinziber. P. 35.
Inſchi. RHEED. MAL. 11. *p.* 21. *t.* 12
Amomum Zinziber. LIN. SP. 1.

ZINZIBER eſt radix ramoſa, nodoſa compreſſa, pallida, aromatica, ſaporis fervidi. Eligatur ponderoſa, minùs fibroſa, intùs albida, non carioſa.



CLASSIS SECUNDA.

DE SIMPLICIBUS EX ANIMALI REGNO.

ZOOLOGIA animalium naturam, habitum, victum, moreſque docet. Vide *naturalis hiſtoriæ* auctorum ſcripta: D. BUFFON, BRISSON, ARTEDI, RÉAUMUR, &c.

Medicamenta ſimplicia quæ ex animali regno deſumuntur, vel ſunt ANIMALIA integra, vel animalium PARTES, aut PRODUCTA: *oſſa*, ſcilicet, *teſtæ*, *ungulæ*, *medulla*, *caro*, *pinguedo*, *ſanguis*, *lac*, *lapilli*, &c.

PINGUEDO eſt pars oleoſa concreta in variis corporis animalium partibus depoſita. Ratione ſedis, conſiſtentiæ, & individuorum è quibus extrahitur, varium ſortitur nomen. Quæ in internis corporis humani, vel animalium quadrupedum non cornutorum, partibus reperitur, AXUNGIA nuncupatur; quæ in avibus, ADEPS; quæ verò ſolidior eſt, & circa renes animalium cornutorum & ruminantium adjacet, SEBUM aut SEVUM dicitur; tandem quæ in oſſium cavitatibus continetur, MEDULLA vocatur.

TABULA SYNOPTICA.

1. HOMO.
2. QUADRUPEDIA.

SOLIDIPEDIA.
- Elephas.
- Equus.
- Asinus.

FISSIPEDIA.

PECORA,

CORNUTA;

GREGARIA.
- Bos, *Vacca*, *Vitulus*.
- Hircus, *Capra*.
- Ovis, *Aries*, *Vervex*, *Agnus*.

SOLITARIA.
- Cervus.
- Mazama.
- Alce.
- Capra bezoardica.

NON CORNUTA.
- Camelus.
- Capra moschus.
- Sus.

FERÆ,

INDOMITÆ.
- Leo.
- Ursus.
- Lupus.
- Vulpes.
- Taxus.
- Zibethum.
- Talpa.
- Erinaceus.

DOMESTICÆ.
- Canis.
- Felis.

GLIRES.
- Lepus.
- Cuniculus.
- Castor.
- Mus.

3. AVES,

PALMIPEDES.
- Anas.
- Anser.

FISSIPEDES.
- Columba.
- Gallus, *Gallina*.
- Pavo.
- Hirundo. &c.

4. PISCES,

MARINI.
- Cete.
- Monoceros.
- Accipenser.
- Merlangius.

FLUVIATILES.
- Carpio.
- Perca.
- Lucius.
- Anguilla.

5. REPTILIA.

AMPHIBIA.
- Testudo.
- Lacertus.
- Scincus.
- Rana.
- Bufo.

SERPENTES.

Vipera. &c.

6. INSECTA.

COLEOPTERA.

Cantharis officinarum.

Profcarabæus Meloë.

HEMIPTERA. *Roftrum inflexum.*

Coccus Ilicis. *Kermes.*

Coccus Cacti. *Coccinella.*

LEPIDOPTERA.

Bombyx. &c.

HYMENOPTERA.

Apis.

Formica.

Cynips Quercûs. *Galla.*

Cynips Rofæ. *Spongia Cynosbati.*

DIPTERA.

Mufca Cardui. *Hæmorrhoïs Cardui.*

APTERA.

Onifcus.

Scorpio.

Cancer marinus.

Cancer fluviatilis.

Cancellus. *Bernardus Heremita.*

7. VERMES,

SIMPLICES.

Lumbricus.

Hirudo.

TESTACEI.

UNIVALVES.

Cochlea.

BIVALVES.

Mater Perlarum.

Oftreum.

BRACHIATI.

Sepia.

8. LITHOPHYTA ET ZOOPHYTA.

Corallium album.

Corallium rubrum.

Corallina.

Spongia.

Androface.

ORDO

ORDO ANIMALIUM.

ACCIPENSER, ſeu ICHTHYOCOLLA, *LE COLPESCE, L'ESTURGEON A COLLE.* PL. 660.

Accipenſer tuberculis carens. ARTED. *Gen.* 65. *Syn.* 92.
Accipenſer Huſo. LIN. SYST. I. 404.

Ex Accipenſeris cartilaginibus, corio, inteſtinis, &c. elixis, paratur ICHTHYOCOLLA: optima eſt alba, ſolida, in ſpiras contorta, odoris nullius, diaphana, facile ac tota ſolubilis. È Ruſſiâ affertur. *Garum Caviar* ex Accipenſeris ovis conficitur. Accipenſer quamvis marinus, in fluviis etiam reperitur.

ALCE, L'*ÉLAN.* PL. 709. BUFFON. *t.* 10. *p.* 226.

Alce officinarum. RAJ. QUADR. 86.
Cervus Alces. LIN. SYST. I. 92.

Ungulæ & cornua ſunt in uſu: eligantur integra. Mas, Cervorum more, cornua ſolida, ramoſa, decidua præfert. Habitat in borealibus Europæ, Aſiæ & Americæ regionibus.

ANAS SYLVESTRIS. *LE CANARD SAUVAGE.* PL. 678.

Anas fera. BRISS. ORNITH. *tom.* 6. *p.* 318.
Boſchas major. JONST. AV. 97.
Anas Boſchas. LIN. SYST. I. 205.

Pinguedo in uſu. Habitat in lacubus Europæ: victitat Ranis, Culicibus, Lemnâ, ſordibus.

ANDROSACES, ſive ACETABULUM.

Androſaces petræ innaſcens. P. 367.
Acetabulum marinum. T. 569.
Tubularia Acetabulum. LIN. SYST. I. 1303.

Eſt ſtirps radicata, filiformis, ſimpliciſſima, Tubuloſa; flores (animalia compoſita, eſfloreſcentia) habens terminales, ſolitarios. In mari Mediterraneo, Americano reperitur.

ANGUILLA, L'*Anguille*. Pl. 661.

Muræna unicolor, maxillâ inferiore longiore. Arted. *Gen.* 24. *Spec.* 66. *Syn.* 39.
Anguilla. Jonst. Pisc. 81.
Muræna Anguilla. Lin. Syst. 1. 426.

Fel & pinguedo in uſu. Habitat in fluviis, lacubus, ſtagnis Europæ; latet in luto, noctu obambulat, delectatur cadaveribus.

ANSER, L'*Oye*. Pl. 679.

Anſer domeſticus. Raj. Av. 136. Briss. Ornith. *tom.* 6. *p.* 262.
Anas Anſer. Lin. Syst. 1. 197.

Pinguedo & ſtercus in uſu. Habitat in Europæ & Americæ, maximè borealis, lacubus ac paludibus.

APER, *Le Sanglier*. Pl. 727. Buffon. *tom.* 6. *p.* 272.

Sus agreſtis, ſeu Aper. Raj. Quadr. 96.
Sus ſcrofa. Lin. Syst. 1. 102.

Dens in uſu: eligatur integer. Vix Aper differt à Sue domeſtico. Habitat in regionibus Europæ borealibus.

APIS, L'*Abeille*, *La Mouche a miel*. Pl. 650.

Apis operaria, mas, femina. Réaum. Ins. *tom.* 5. *tab.* 21. 23.
Apis mellifica. Lin. Syst. 1. 955.

Mel, *le Miel*, eſt ſubſtantia liquida, craſſiuſcula, ex albo flaveſcens, è favis Apum collecta, varia in variis regionibus. *Album* ſeu *virgineum* ſine igne & è favis recentibus; *flavum*, ignis ope & è vetuſtioribus favis elicitur. Optimum cenſetur purum, ſpiſſum, Narbonenſe: eligatur aromaticum, fragrans, guſtui gratum.

Cera, *La Cire*, eſt ſubſtantia *flava*, odoris mellei, pinguis, oleoſa, flexilis, è favis Apum calore liquata & expreſſa: multiplici lotione & inſolatione fit *alba*.

Apum reſpublica Gynæcocratica eſt, Reginâ unicâ imperante. Favos ſtruunt cæreos, & Mel è nectariis florum colligunt: in Europæ arboribus cavis habitant; at frequentius in alvearibus hoſpitantur.

ASINUS, L'*Asne*. Pl. 713. Buffon. *t.* 6. *p.* 132.

Aſinus. Raj. Quadr. 63.

Equus Asinus. LIN. SYST. I. 100.

Lac in usu. Ex Oriente est originarius.

BOMBYX. LE VER A SOIE. PL. 652. RÉAUM. INS. *tom.* 1. *t.* 4. *f.* 14. & *tom.* 2. *t.* 5. *f.* 2.

Bombyx Mori. LIN. SYST. I. 817. GEOF. INS. 2. 116.

Sericum crudum in usu.

BOS. LE BŒUF. PL. 699. BUFFON. *t.* 6. *p.* 171.

Bos domesticus. JONST. QUAD. 26.
Bos Taurus. LIN. SYST. I. 98.

In usum adhibentur medulla cruris, sebum, fel, calculus felleus, lac, sanguis, cornua, priapus, stercus, &c.

AQUA MILLE-FLORUM Codicis Parisiensis distillatur è stercore vaccino. Multi per eam intelligunt Urinam ipsam Vaccæ verno tempore pascentis, & ab aliquot diebus à Tauro separatæ. BOS hospitatur ubiquè: læditur à Cicutâ, Aconito, Anemone. Mas TAURUS, *le Taureau*; femina VACCA, *la Vache*; fetus VITULUS, *le Veau*, dicitur.

BUFO, LE CRAPAUD. PL. 672.

Bufo, sive Rubeta. RAJ. QUADR. 252.
Rana Bufo. LIN. SYST. I. 354.

Integer in usu. Reperitur in rudetis umbrosis; distinguitur à Ranâ esculentâ corpore ventricoso, lurido, fusco, verrucis lactescentibus venenatis. Viviparus est; delectatur Cotulâ, Actæâ, Stachyde fetidâ. A Buteone voratur.

CANCER FLUVIATILIS, L'ÉCREVISSE DE RIVIÈRE. PL. 654.

Cancer seu Astacus fluviatilis officinarum. MATH. 228.
Cancer Astacus. LIN. SYST. I. 1051. JONST. EXSANG. *t.* 4. *f.* 1. WILLIS. *tom.* 2. *p.* 15. *tab.* 3.

Integer in usu. OCULI CANCRORUM in officinis dicuntur lapilli in capita Cancri inventi, duri, albi, terrei, orbiculati, unâ parte compressi ac in modum acetabuli sinuati, alterâ convexi (*calculus oculus.* LIN. SYST. NAT. *tom.* 3. *p.* 177). Cancer in Europæ fluviis & lacubus habitat. Hepate Bovis, vel Lumbricibus in domibus nutritur: Urticæ foliis, asperso Aceto, servatur.

CANCER MARINUS, *Le Crabe*, *Le Poupart.* Pl. 653.

Pagurus. Bel. Aq. 368.
Cancer Pagurus. Lin. Syst. 1. 1044.

Chelarum apices nigricantes in usu. Crustam deponunt quotannis. Victitant cadaveribus.

CANCELLUS, *Le Soldat*, *ou Bernard l'Hermite.* Pomet. *tom.* 2. *p.* 213. *f.* 59.

Cancellus. Bel. Aq. 362.
Cancer Bernhardus. Lin. Syst. 1. 1049.

Ex eo paratur Oleum. Habitat in oceano Europæo, intra varias testas Cochlearum quas vacuas intrat, trahitque & mutat, prout adolescit.

CANIS, *Le Chien.* Pl. 701. Buffon. *t.* 6. *p.* 309.

Canis familiaris. Lin. Syst. 1. 56.

Catelli sunt in usu. Album Græcum officinarum dicuntur excrementa alba, non fetentia, Canis ossibus nutriti. Canis à Gramine vomitu purgatur: Lambendo vulnera curat: rabiem morsu disseminat.

CANTHARIS, *La Mouche Cantharide.* Pl. 655.

Cantharides vulgares, *Muscæ virides officinarum.* Raj. Ins. 101.
Meloë vesicatorius. Lyn. Syst. 1. 679.

Cantharides sunt insecta coleoptera, ex auro virescentia, fetida. Eligantur integra, recentia, non pulverulenta. Habitant in Ligustro, Fraxino, Sambuco, Syringâ. È calidioribus regionibus afferuntur.

CAPRA, *La Chèvre.* Pl. 703. Buffon. *t.* 6. *p.* 253.

Capra domestica. Raj. Quad. 77.
Capra Hircus. Lin. Syst. 1. 94.

Lac caprinum & sanguis exsiccatus Hirci in usu. Mas Hircus, *le Bouc*; femina Capra, *la Chevre*; fetus Hædus, *le Chevreau*, dicitur.

CAPRA BEZOARTICA, *La Chèvre du Bézoard* (*Capricerva orientalis*). Pl. 705. Buffon. *t.* 10. *p.* 339.

Capricerva. Kæmpf. Amœnit. 398.
Hircus Bezoarticus. Raj. Quadr. 80.
Capra Bezoartica. Lin. Syst. 1 96.

BEZOARD ORIENTALE (*calculus Bezoard.* LIN. SYST. NAT. 1. 176). Eſt calculus ſubrotundus, ſolidus, non bibulus, in abomaſo ventriculo Capræ ortus. Eligatur lamellatim concretus, cujus cavitas interna non planè vacua, & qui chartæ cretâ oblitæ affrictus lineam ducat ex luteo viridem. Capra habitat in Perſiâ.

CAPRA MOSCHI, *GAZELLE.* PL. 704. BUFFON. *t.* 10. *p.* 443.

Capra Moſchus. JONST. QUADR. 55.
Moſchus moſchiferus. LIN. SYST. 1. 91.

MOSCHUS officinarum eſt ſubſtantia unctuoſa, fragrantiſſima è folliculo propè umbilicum Capræ moſchi excerpta. Moſchus eligatur ſiccus, è ferrugineo nigricans, inter mandendum arenularum expers. Moſchus verſus Chinam in Tartariâ habitat.

CARPIO, *LA CARPE.* PL. 664.

Cyprinus cirris quatuor, oſſiculo tertio pinnarum dorſi, ac ani uncinulis armato. ARTED. *Gen.* 4. *Spec.* 25. *Syn.* 3.
Cyprinus. JONST. PISC. *l.* 3. *tit.* 3. *c.* 6. *t.* 29. *f.* 3-6.
Cyprinus Carpio. LIN. SYST. 1. 525.

LAPIS CARPIONUM officinarum, eſt os triangulare in ſummo palato reperiundum.

CASTOR, *LE CASTOR.* PL. 706. BUFFON. *t.* 8. *p.* 39.

Caſtor officinarum, ſive Fiber. RAJ. QUAD. 209.
Caſtor Fiber. LIN. SYST. 1. 78.

CASTOREUM officinarum eſt ſubſtantia fuſca, fetida, amara, ingrata, in folliculis celluloſis incluſa. Optimum è Ruſſiâ affertur, ponderoſum, carnoſum, acre, odore gravi. Caſtores in borealibus Europæ, Aſiæ, & Americæ regionibus, in modum Reipublicæ habitant, & ad ripas fluviorum & lacuum, corticibus Sorbi, Salicis, & potiſſimum Populi, victitant. Ad regionem pubis utriuſque ſexûs folliculi fetidi CASTOREUM, dum recens eſt, liquidum ut axungia, includentes reperiuntur.

CERVUS, *LE CERF.* PL. 707. BUFFON. *t.* 7. *p.* 13.

Cervus. RAJ. QUAD. 84.
Cervus Elaphus. LIN. SYST. 1. 93.

Cornu, medulla & os cordis in uſu.

CERVUS MAZAMA, *Le Mazame.* BUFFON. *t.* 10. *p.* 424.

Mazama seu Cervus. HERNAND. MEX. 324.
Cuguacu-été. PISON. 98.
Cervus Capreolus. LIN. SYST. I. 94.

BEZOARD-OCCIDENTALE (*calculus Bezoard.* LIN. SYST. NAT. *t.* 3. *p.* 176.) orientali fragilius & laxioris est compagis; lamellis constans crassioribus, pilos aut paleas in meditullio sæpe continet. Reperitur in ventriculo abomaso Cervi Mazamæ in Mexico. At in eâ regione multa reperiuntur animalia hoc BEZOARD producentia: indè diversitas figuræ, coloris & pretii.

CETUS DENTATUS, *Le Cachalot.* PL. 662.

Catodon fistulâ in cervice. ARTED. *Gen.* 79. *syn.* 108.
Cete. CLUS. EXOT. *l.* 6. *c.* 17.
Balena major in inferiore tantum maxillâ dentata, macrocephala, bipinnis. RAJ. PISC. 15.
Physeter macrocephalus. LIN. SYST. I. 107.

SPERMA CETI est substantia candida ceræ instar, pinguis, è cerebro Ceti educta. Eligatur recens, albissima, non rancida.

COCHLEA, seu LIMAX TERRESTRIS, *Le Limaçon, L'Escargot.* PL. 644.

Pomatia. GESN. AQ. 255.
Cochlea cineracea maxima, edulis, cujus os operculo crasso velut gypseo per hyemem clauditur. LISTER. ANGL. *p.* 111. *t.* 2. *f.* 1.
Helix Pomatia. LIN. SYST. I. 1244.

Testæ cum ipsis animalibus in usu. Testa turbinata est, cinerea sive sub albida, brevioris figuræ, intra quinque anfractus seu orbes finiens. Habitat in hortis ac vinetis.

COCCUS ILICIS, *La Graine d'Écarlate.* PL. 117.

Coccus infectorius, seu Chermes. Officinarum.
Coccus Ilicis. LIN. SYST. I. 740.

GRANA KERMES seu CHERMES sunt insecta hemiptera in Quercu cocciferâ Gallo-Provinciæ reperiunda, ubi Aceto immerguntur & exsiccantur. Eligenda integra, recentia, rubicundo-fusca.

NOTA. SYRUPUS È GRANIS KERMES ad nos asportatur ex Gallo-Provinciâ.

COCCUS OPUNTIÆ, *LA COCHENILLE*. PL. 118.

Coccus indicus, seu Coccinella. Officinarum.
Coccus Cacti coccinelliferi. LIN. SYST. 1. 742.

COCCINELLÆ sunt insecta hemiptera, in Opuntiâ seu Cacto novæ Hispaniæ collecta. Denso fumo suffocantur, insolantur, leniter manibus confricantur ut pedes & antennæ decidant, & in grana abeant. Eligantur integræ, ponderosæ, foris albicantès, tritæ verò purpureæ.

COLUMBA, *LE PIGEON*. PL. 685. BUFFON. OIS. *t.* 4. *p.* 301.

Columba domestica. RAJ. AV. 59. BRISS. ORNITH. *t.* 1. *p.* 68. LIN. SYST. 1. 279.

Sanguis, fimus & ipsa Columba in usu.

CONCHA MARGARITIFERA, *LA NACRE DE PERLE*. PL. 646.

Mater Unionum, Mater Perlarum. Officinarum.
Mytilus margaritiferus. LIN. SYST. 1. 1155.

MATER PERLARUM officinarum nominatur concha seu testa valida ponderosa, foris rugosa, aspera, non striata, intùs levis, argentei coloris, ex Oceano utriusque Indiæ asportata. MARGARITÆ, UNIONES, seu PERLÆ ORIENTATES officinarum (*calculus Margarita.* LIN. SYST. NAT. *t.* 3. *p.* 177.) sunt calculi seu lapilli rotundi, angulosi, albi, pellucidi, in Conchis margaritiferis reperti.

CORALLINA, *LA CORALLINE*. PL. 39.

Muscus marinus, sive Corallina officinarum. P. 363.
Corallina officinarum. LIN. SYST. 1. 1304.

Est stirps radicata, geniculata, filamentosa, calcarea, metamorphosi transiens in florens animal. Reperitur in Oceano europeo & Mediterraneo.

CYNIPS QUERCUS, *LE CINIPS DE LA NOIX DE GALLE*, RÉAUM. *tom.* 3. *tab.* 39. *f.* 14-17.

Cynips Quercûs folii. LIN. SYST. 1. 918.

Est insectum hymenopterum in Gallis globosis Quercûs quas efformat reperiundum.

GALLÆ officinarum (GEOF. PL. 116. B.) ſunt excreſcentiæ à punctura Cynipis Quercûs ortæ. Eligantur nigræ, nodoſæ, aculeatæ ponderoſiores, minores, quæ ex Alepo & Smyrnâ aſportantur. Improbantur majores, leviores & flaveſcentes.

CYNIPS ROSÆ, *L'INSECTE DU BEDEGUAR.* RÉAUM. *tom.* 3. *tab.* 46. *f.* 5. 6.

Diplolepis Bedeguaris niger, abdomine ferrugineo apice nigro, pedibus rufis, GEOF. INS. 2. 310.
Cynips Roſæ. LIN. SYST. 1. 917.

SPONGIA CYNOSBATI, *le Bedeguar*, (LOB. ICON. 2. 210. RÉAUM. *tom.* 3. *p.* 47. *f.* 104.) *L'Éponge de Cynorrhodon*, eſt excreſcentia ſpongioſa, hirſuta, coloris rufi, herbacei, odoris dùm recens eſt roſei, magnitudinis variæ. Adnaſcitur Roſæ caninæ, & à puncturâ Cynipis Roſæ oritur.

ELEPHAS, *L'ÉLÉPHANT.* PL. 711. BUFFON. *t.* 9. *p.* 187.

Elephas. RAJ. QUAD. 131.
Elephantus. JONST. QUAD. 30. *t.* 7. 8. 9.
Elephas maximus. LIN. SYST. 1. 48.

EBUR officinarum dicuntur Elephantis dentes laniari ſuperiores. Ebur ad albedinem uſtum SPODIUM nuncupatur.

ERINACEUS, *LE HÉRISSON.* PL. 710. BUFFON. *t.* 7. *p.* 310.

Echinus, ſeu Erinaceus terreſtris. RAJ. QUAD. 231.
Erinaceus europæus. LIN. SYST. 1. 75.

Integer in uſu: præparatur uſtione. Habitat in ſylvis Europæ, victitat Bufonibus, Vermibus, coleopteris, conchis, fructibus, aviculis, cadaveribus.

ERINACEUS MALACENSIS, *LE HÉRISSON DE MALACA.*

Erinaceus auriculis pendulis. BRIS. QUAD. 183.
Porcus aculeatus ſeu Hiſtrix malacenſis. SEBA. *t.* 1. *p.* 81.
Erinaceus malacenſis. LIN. SYST. 1. 75.

LAPIS HISTRICIS officinarum (*BOERH. de viribus med.* 194), ſeu *Pedra del Porco* eſt calculus fellis hujus Erinacei (*LIN. SYST. t.* 3. *p.* 177), levis, amariſſimus, ſaponis inſtar lubricus, nucis Juglandis magnitudinis. Cùm raró ad nos perveniat, ei ſubſtitui poteſt Calculus felleus Bovis.

FORMICA,

FORMICA, *La Fourmi*. Pl. 656.

Formica rufa, (*fusca*, & *atra*.) Lin. Syst. 1. 962 & 963.

Formicæ & earum ova in usu. Formicæ sunt insecta hymenoptera ut plurimum, in acervis acerosis sylvaticis socialiter viventia. Pelluntur piscium rejectaneis, & retibus his immersis ad arborum truncos circumligatis.

GALLUS, *Le Coq*. Pl. 689. Buffon. Ois. *t*. 3. *p*. 88.

Gallus Domesticus. Briss. Ornith. *tom*. 1. *p*. 166.
Gallus gallinaceus seu Gallina. Raj. Av. 51.
Phasianus Gallus. Lin. Syst. 1. 270.

Gallinæ ova recentia & eorum testæ veniunt in usum. Læditur baccis Sambuci; Pipere à pediculis liberatur. Gallina, *la Poule*, Pullus Gallinaceus, *le Poulet*, dicitur.

HIRUNDO, L'*Hirondelle*. Pl. 689.

Hirundo domestica, (& *Rustica*.) Raj. Av. 71.
Hirundo urbica, (& *rustica*.) Lin. Syst. 1. 343 & 344.

Nidus in usu.

HIRUDO, *La Sang-sue*. Pl. 647.

Sanguisuga. *Officinarum*.
Hirudo medicinalis. Raj. Ins. 3. Lin. Syst. 1. 1079.

Eligendæ sanæ, nigro-virescentes, lineis flavis maculatæ. In aquâ fluviatili sæpius renovatâ servandæ. Aut plena cruoris, aut Inspersâ muriâ, cutim mittit præstantissima phlebotoma.

HOMO, L'*Homme*.

Nosce te ipsum. Lac Muliebre, axungia, cranium Hominis violentâ morte extincti non humati, & Mumia Ægyptiaca in usu.

Mumiæ Ægyptiacæ sunt cadavera humana Aloë, Myrrhâ, Asphalato, aliisque aromaticis & balsamicis speciebus condita & exsiccata. Rarò integræ, sed in partes divisæ afferuntur: Eligatur Mumia odoris non ingrati, amara, bituminosa & splendida.

IBEX, *Le Bouquetin*. Buffon. *t*. 10. *p*. 278.

Ibex. Gesn. Quad. 303. Jonst. Quad. *tab*. 28.
Capra Ibex. Lin. Syst. 1. 95.

Sanguis exsiccatus in usu. Habitat inter nives in summis alpibus. Sanguis

RUPRICAPRÆ (*le Chamois.* PL. 704), vel Hirci herbis aromaticis nutriti, ejus eſt ſuccedaneus.

ISIS NOBILIS, *LE CORAIL ROUGE.* PL. 39. A.

Corallum rubrum. P. 366. T. 572.
Corallium rubrum Officinarum. RAJ. HIST. 1. 60.
Iſis nobilis. LIN. SYST. 1. 1288.

Eſt ſtirps radicata, ramoſa, lapidea, manifeſtâ metamorphoſi tranſiens in animalcula ſpontaneo motu ſenſuque prædita. Eligatur levis & unicolor. In Mediteraneo mari reperitur.

LACERTUS, *LE LÉZARD.* PL. 668 & 669.

Lacertus viridis (*& vulgaris.*) RAJ. QUAD. 264.
Lacerta agilis. LIN. SYST. 1. 363.

Integer in uſu. In Europâ auſtrali viridis, in Indiâ pulchrioris eſt coloris; vulgaris noſtras cinereus eſt. Habitat in rudetis & terræ cavernis.

LEPUS, *LE LIÈVRE.* PL. 717. BUFFON. *t.* 7. *p.* 96.

Lepus. RAJ. QUAD. 204.
Lepus timidus. LIN. SYST. 1. 77.

Sanguis & pili in uſu.

LUCIUS, *LE BROCHET.* PL. 664.

Eſox roſtro plagioplateo. ARTED. *Gen.* 14. *Spec.* 53. *Syn.* 26.
Lucius. RAJ. PIS. 112.
Eſox Lucius. LIN. SYST. 1. 516.

Mandibula ſeu maxilla inferior in uſu.

LUMBRICUS TERRESTRIS, *LE VER DE TERRE.* PL. 648.

Lumbricus terreſtris. ALDROV. INS. 693. LIN. SYST. 1. 1076. WILLIS. *tom.* 2. *p.* 18. *tab.* 4.

Integer in uſu. Quæruntur tempore nocturno, aut baculo agitato in terrâ.

MADREPORA, *LE MADRÉPORE.* PL. 39. B.

Corallium album oculatum officinarum. J. B. 3 805.
Corallium album. LOB. ICON. 253. T. 572.
Madrepora oculata. LIN. SYST. 1. 1281.

Eſt ſubſtantia calcarea, caulefcens, alba, intus perforata, ab animalculis ædificata. In Oceano Indiæ orientalis reperitur.

MERLANGIUS, *Le Merlan*. Pl. 661.

Aſellus marinus. Officinarum.
Gadus dorſo tripterigio, ore imberbi, corpore albo, maxillâ ſuperiore longiore. ARTED. *Gen.* 19 *Spec.* 62. *Syn.* 34.
Gadus Merlangus. LIN. SYST. 1. 438.

LAPIDES MERLANGII ſunt oſſa oblonga, in ejus capite reperiunda.

MILLEPEDES, *Les Cloportes.* (*Oniſci.*) Pl. 657.

Aſelli. Officinarum.
Oniſcus caudâ obtuſâ bifurcâ. GEOF. INS. 2. 670. *tab.* 22. *f.* 1.
Oniſcus Aſellus. LIN. SYST. 1. 1061.

Integri in uſu. ONISCUS eſt inſectum apterum, ovale, quatuordecim pedes habens: habitat in umbroſis ac humidis locis.

MONOCEROS, *Le Narval.* Pl. 662.

Monodon. ARTED. *Gen.* 78. *Syn.* 108.
Monoceros piſcis de genere cetaceo. RAJ. PIS. 11.
Monodon Monoceros. LIN. SYST. 1. 105.

Dens ſeu cornu, in officinis UNICORNU MARINUM, in uſu.

OSTREUM, L'*Huitre.* Pl. 645.

Oſtreum vulgare maximum, intùs argenteo quodam livore albeſcens. LIST. ANG. *p.* 176. *t.* 4. *f.* 26. WILLIS. *tom.* 2. *p.* 13. *tab.* 2.
Oſtrea edulis. LIN. SYST. 1. 1148.

Teſtæ in uſu.

OVIS, *La Brebis.* Pl. 723. BUFFON. *t.* 6. *p.* 225.

Ovis domeſtica. RAJ. QUAD. 73.
Ovis Aries. LIN. SYST. 1. 97.

Sebum & Œſypum, *la graiſſe de la laine graſſe*, in uſu. Mas ARIES dicitur, fetus AGNUS, caſtratus VERVEX. Obnoxia vivit vertigini, hydropi, phthiſi, ictero, hepatitidi; læditur à Pruno ſpinoſâ, Equiſeto, Flammulâ, Anemone nemoroſâ, &c.

PAVO, *Le Paon.* Pl. 693. BUFFON. *t.* 4. *p.* 1.

Pavo. RAJ. AV. 51. BRISS. ORNITH. *tom.* 1. *p.* 281. *t.* 27.
Pavo criſtatus. LIN. SYST. 1. 267.

Stercus in usu. Sambuci floribus occiditur; delectatur Piso, Tritico. Ex Africâ originarius.

PERCA, *La Perche*. Pl. 665.

Perca lineis utrinque sex transversis nigris, pinnis ventralibus rubris. Arted. *Gen.* 39. *Spec.* 74. *Syn.* 66.

Perca fluviatilis. Raj. Pisc. 97. Lin. Syst. 1. 481.

Lapides percarum in officinis, sunt ossicula quæ in capite juxta exortum spinæ dorsi reperiuntur.

RANA, *La Grenouille*. Pl. 671.

Rana esculenta. Lin. Syst. 1. 357.

Rana & ejus sperma in usu. Rana aquatica, ovipara, metamorphosim subit, quasi è pisce in Lacertam ex quâ in Ranam transiens.

SCARABÆUS UNCTUOSUS, *Le Proscarabée*. Pl. 658.

Proscarabæus. Dal. 391. Jonst. Ins. *tab.* 15.

Cantharus unctuosus. Schrod. Pharm. 5. *p.* 345.

Meloë Proscarabæus. Lin. Syst. 1. 679. Geof. Ins. 1. 377. *tab.* 7. *f.* 4.

Integer in usu. Est insectum corpore violaceo, elytris abbreviatis, absque alis; vere juxtà vias, & in apricis campis reperitur. Tactu oleum è geniculis pedum emittit.

SCINCUS, *Le Scinc*. Pl. 670.

Scincus. Math. In Dioscor. *Lib.* 2. *Cap.* 40. Raj. Quad. 271.

Lacerta Scincus. Lin. Syst. 365.

Corpus & præsertim lumbi in usu. Est amphibium reptile, caudatum, in montosis locis Ægypti, Arabiæ petreæ & Lybiæ habitans. Eligatur siccus, recens & integer.

SCORPIO, *Le Scorpion*. Pl. 659.

Scorpio officinarum. Raj. Ins. 9.

Scorpio europæus. Lin. Syst. 1. 1038.

Integer in usu. Est insectum apterum; formâ Cancros æmulans, iis tamen minus; colore subatro, veluti fuligineo; caudâ elongatâ, articulatâ, subtùs aculeo mucronatâ. Habitat in Europâ maximè australi. *In caudâ venenum.*

SEPIA, *La Seche*. Pl. 649.

Sepia. Gesn. Aquat. 851. Dal. 392. Math. 244.
Sepia officinalis. Lin. Syst. 1. 1095.

Os Sepiæ officinarum eligatur album, leve, fungosum, integrum; magnum & crassum: pars friabilis in usu. Sepia est piscis brachiatus formæ singularis, liquorem atrum quò se occultat ut à piscatore evadat dispergens.

SPONGIA, *L'Éponge fine*.

Spongia ad usum præstantissima foraminibus exiguis pervia. T. 575.
Spongia officinalis. Lin. Syst. 1. 1298.

Est stirps vegetans, radicata, subramosa, difformis, tenax, foraminulata, transiens in animalcula florida, quæ foraminibus aquam sugunt. Reperitur in mari Mediteraneo.

SUS, *Le Cochon*. Pl. 727. Buffon. *t.* 6. *p.* 272.

Sus sive Porcus domesticus. Raj. Quad. 92.
Sus scrofa. Lin. Syst. 1. 102.

Axungia in usu. Obnoxius vivit pediculis, scabie, scrophulis; Pipere occiditur.

TALPA, *La Taupe*. Pl. 728. Buffon. *t.* 7. *p.* 322.

Talpa. Raj. Quad. 236.
Talpa europæa. Lin. Syst. 1. 73.

Integra in usu. Præparatur ustione. Fugatur Ricino.

TAXUS, *Le Blaireau*. (*Meles*.) Pl. 720. Buffon. *t.* 7. *p.* 220.

Taxus. Jonst. Quad. *t.* 64. Raj. Quad. 185.
Meles. Gesn. Quad. 686.
Ursus Meles. Lin. Syst. 1. 70.

Axungia in usu.

VIPERA, *La Vipere*. Pl. 666. Pomet. *t.* 2. *p.* 175. *f.* 47.

Vipera officinarum. Dal. 470.
Coluber Berus. Lin. Syst. 1. 377.

Tota in usu: eligatur sana & crassa. Frequens in calidioribus regionibus. Morsu venenoso lædit. *Vide* Mead. *Tentam.* 1. *de Viperâ*. *p.* 15.

Viperæ exſiccatæ veniunt quoque in uſum. Eligantur longiores, ſicciores, ponderoſiores, corde & hepate præditæ & à vermibus non eroſæ.

VULPES, *Le Renard.* Pl. 702. Buffon. *t.* 7. *p.* 205.

Vulpes. Raj. Quad. 177.
Canis Vulpes. Lin. Syst. 1. 59.

Pinguedo in uſu. Aſtutiſſimè ſævit in Agnos, Anſeres, Gallinas, Aviculas, &c.

ZIBETHUM, *La Civette.* (*Animal Zibethi.*) Pl. 720. Buffon. *t.* 8. *p.* 342.

Civetta. Officinarum.
Vivera Zibetha. Lin. Syst. 1. 65.

Zibethum officinarum eſt ſubſtantia ſubpallida, pinguis, ſubliquida, ſenſim craſſeſcens, odoris fragrantiſſimi. Optimum ex Indiis affertur. Reperitur in folliculo animalis inter anum & vulvam exiſtente.



CLASSIS TERTIA.

DE SIMPLICIBUS È REGNO MINERALI.

MINERALOGIA, quæ è Terræ ſinu extrahuntur explorat. Videant tirones BOMARE & *Chymicorum* opera.

FOSSILIA ſunt *Aquæ*, *Terræ*, *Lapides*, *Salia*, *Petrificata*, *Sulphurea*, *Metalla* & *Semi-Metalla*.

Subſtantiæ Metallicæ, præſertìm Semi-Metallorum, fuſionis ope ab aliis ſubſtantiis heterogeneis ſeu *Scoriis* ſeparatæ, REGULINÆ dicuntur.

TABULA SYNOPTICA.

1. AQUÆ,
   - Communes *seu* dulces, *fontanæ*, *fluviatiles*, *&c.*
   - Marinæ.
   - Minerales.
2. SALIA.
   - Alumen.
   - Vitriolum.
   - Natrum murorum.
   - Natrum fontanum, *Epsamense*, *Seidlitzense*, *Mirabile Glauberi*, *&c.*
   - Nitrum.
   - Sal marinum.
   - Sal Gemmæ.
   - Sal Ammoniacum.
   - Borax.
3. TERRÆ,
   - ARGILLOSÆ.
     - Bolus Armena.
     - Terra sigillata.
   - CALCAREÆ.
     - Creta.
     - Lac Lunæ.
   - METALLICA.
     - Ochrum.
     - Terra Umbriæ.
4. LAPIDES,
   - LAMELLOSI ET FISSILES.
     - Nigrica, *seu* Pharmacitis.
     - Ardesia.
     - Creta Brigantina.
     - Talcum.
   - FILAMENTOSI.
     - Amyanthus.
   - VITRESCENTES ET VITRA.
     - GEMMÆ,
       - PRETIOSÆ.
         - Granatus.
         - Hyacinthus.
         - Smaragdus.
         - Saphirus.
         - Sardinus.
       - SPECIOSÆ.
         - Lazulus.
         - Lapis Armenus.
     - SILICES.
       - Silex igniarius.
       - Lapis nephriticus.
5. PETRIFICATA,
   - VEGETABILIUM.
     - Osteocolla.
   - QUADRUPEDUM.
     - Ebur fossile.
   - PISCIUM.
     - Bufonites.
   - VERMIUM.
     - Lapis judaïcus.
     - Lapis Lyncis.
   - MONTIUM IGNIVOMUM.
     - Pumex.
   - INTRA LAPIDES.
     - Lapis Ætites.
   - INTRA ANIMALIA.
     - Bezoar.
     - Lapis malacensis.
     - Margaritæ.
     - Oculi Cancrorum.

A

6. SULPHUREA,

PURA.

Sulphur.

MIXTA ſeu BITUMINOSA.

Bitumen judaïcum.

Carbo petræus.

Ambra.

Gagates.

Petroleum.

Succinum.

METALLICA.

Auripigmentum.

7. MINERÆ.

SEMI-METALLA,

SOLIDA.

Arſenicum.

Antimonium.

Biſmuthum.

Zincum.

FLUIDA.

Hydrargyrus.

METALLA,

ALTERABILIA;

ANTE CANDESCENTIAM FUSILIA.

Plumbum.

Stannum.

POST CANDESCENTIAM FUSILIA.

Ferrum.

Cuprum.

NOBILIORA ET INALTERABILIA.

Argentum.

Aurum.

ORDO MINERALIUM.

ÆRUGO, *Le Verd de gris.* ⊕

Viride Æris officinarum. BOMARE. 2. 203.
Ochra Ærugo. LIN. SYST. 3. 194.

Eligenda quæ colore ad cæruleum vergit. Paratur ex Cupro acidis aut vinaceis eroſo ac ſoluto. È Galliâ & Hiſpaniâ affertur.

ÆS, *Le Cuivre.* ♀

Venus. Chymicorum.
Cuprum nativum purum. BOMARE. 2. 178.
Cuprum nativum. LIN. SYST. 3. 143.

Eſt metallum rubrum, ſonorum, cujus ſolutio corroſivo-venenata; cærulea eſt ſi alkali, viridis ſi acido facta fuit: præcipitatur Ferro: vix ex toto diſſolvitur Aquâ forti. Omnibus miſcetur metallis. Reperitur in Europâ boreali; præparatum affertur.

ÆTITES, *La pierre d'Aigle.*

Ætites aquilinus. LIN. SYST. 3. 179.

Eſt tophus ochraceus, polymorphos, intra quem lapillus mobilis reperitur. Ex Helvetiâ affertur.

ALUMEN, L'*Alun.* BOMARE. 1. 290. LIN. SYST. 3. 101. O ⊏⊐

ALUMEN eſt ſal minerale ex acido vitriolico & terrâ argilloſâ combinatis, ortum; guſtu acerbo, aſtringenti & ſtiptico. Cryſtallos efformat octaëdras. Igne fuſum ebullit, ſpumeſcit & in modum calcis abit. Multiplex ALUMINIS ſpecies reperitur.

I. ALUMEN RUPEUM ſeu CRYSTALLINUM officinarum. Album eſt, è terrâ pyritoſâ & aluminoſâ, ſeu è lapide fiſſili extrahitur. *Alumen commune*, *Linnæi.*

II. ALUMEN ROMANUM, ſive RUBRUM officinarum. Extrahitur propè Romam è lapide ſeu terrâ aluminoſâ calcariâ. *Alumen romanum*, *Linnæi.*

III. Datur altera ſpecies Aluminis, non uſualis, guſtu acida & in aquâ ſolubilis : nempe, *Alumen nativum plumoſum*, LINNÆI. Cave ne cum Alumine plumoſo confundas *Amiantum*.

AMBRA GRISEA, L'*AMBRE GRIS*.

Ambra griſea, ſeu cineritia. Officinarum.
Ambra griſea vulgaris. BOMARE. 2. 276.
Ambra ambroſiaca. LIN. SYST. 3. 107.

Eſt ſubſtantia cineracea, odora, opaca, cerea, aquis ſupernatans, aciculæ candefactæ non adhærens, elicitur è ſinu maris præſertim Madagaſcarienſis, Indiæ orientalis & Æthiopici. Utrum hæc ſubſtantia circa renes Ceti dentati reperiatur, non conſtat.

AMIANTUS, L'*AMIANTE, SORTE DE LIN INCOMBUSTIBLE*.

Pſeudo-Asbeſtus plumoſus officinarum. BOMARE. 1. 108.
Amiantus plumoſus. LIN. SYST. 3. 55.

Eſt lapis fibroſus, fibris digito ſeparabilibus, flexilibus ac pappoſis conſtans. Fila non ſunt perfecta ut in *Lino incombuſtibili*; ſed in tomentum breviſſimum reſolvuntur. Particulæ aquis ſupernatant. Uſus tantum externus; ſed cautè ab Alumine nativo ſeu Plumoſo diſtinguendus. Reperitur in Siberiâ, Laponiâ, &c.

ANTIMONIUM, L'*ANTIMOINE*. ♁ ◇

Minera Antimonii ſtriata aut vulgaris. BOMARE. 2. 73.
Stibium ſtriatum. LIN. SYST. 3. 123.

Eſt ſubſtantia mineralis, friabilis, ſtriata, Plumbi coloris, igne poſt candeſcentiam avolans, conſtans è ſubſtantia ſemi-metallica ſeu Regulo & Sulphure. Rapit in igne metalla, exceptis Auro & Platino. Reperitur in Hungariâ, Galliâ, &c. fuſione purificatum affertur. Probatur Hungaricum, ſcoriis expers, & ſtrias ſeu acus longas & ſplendentes habens.

Regulum Antimonii purum colorem argenteum & plana nitida majuſcula exhibentem, Sahlbergæ invenit *D. SWAB. Act. Stoch.* 1748.

AQUA, L'*EAU*. ▽ ≈

AQUA eſt elementum liquidum, fluidum, humidum, limpidum, inſipidum, inodorum, diaphanum, ſine colore, facilè in vapores avolans, non compreſſibile : abſentiâ caloris glaciatur & ejus ultimus caloris gradus eſt ebullitio aëri aperto. Eligenda eſt pura clara & levis. Diverſa ſortitur nomina, pro varietate ſubſtantiarum quibus imprægna-

tur aut fontium è quibus scaturit: hinc *Aqua pluvialis*, *fontana*, *fluvialis*, *lacustris*, *salsa*, *marina*, *mineralis*, *thermalis*, *glaciei*, *nivea*, *&c.* Hùc pertinet *Ros majalis.*

ARDESIA, L'*Ardoise.*

Ardesia tegularis. BOMARE. 1. 139.
Schistus Ardesia. LIN. SYST. 3. 38.

Est lapis fissilis, durus, cærulescens. Nascitur è Schisto cum Ferro mixto. Reperitur in Belgiâ, Hiberniâ, &c.

ARGENTUM, L'*Argent.* ☽ ☾

Luna. Chymicorum.
Argentum nativum. LIN. SYST. 3. 148. WALL. MIN. 307. BOMARE. 2. 213.

Est metallum album, excepto Auro ductilissimum, sonorum, igne Calcinationem non patiens, post candescentiam liquabile, cujus solutio Aquâ forti alba est, (si Cupro mixtum, cærulea). Reperitur in Americâ, Galliâ, Norvegiâ, Wermalandiâ, &c.

Argento purissimo, *de coupelle* dicto, utantur Pharmacopœi.

ARMENUS LAPIS, *La pierre d'Arménie.*

Lapis Armenus. BOMARE. 1. 282.
Cuprum Armenus. LIN. SYST. 3. 146.

Est lapis opacus, cæruleus, maculis sæpe argenteis, viridibus & nigris intermixtis. Cum Aquâ forti lente effervescit, colorem viridem acquirens. Oritur ex Ochrâ Cupri.

ARSENICUM ALBUM, L'*Arsenic blanc.* o-o ☿

Arsenicum album. BOMARE. 2. 26.
Arsenicum nudum. LIN. SYST. 3. 117.

Est calx metallica solubilis in aquâ calidâ, fumo odore alliaceo, sapore dulci; *caute cum illâ versandum est, usus tantum externus.* Arsenicum *nativum* purum invenitur in Bohemiæ Joachimsdahl; *factitium* sublimatum è Cobalto sæpius affertur.

AURIPIGMENTUM, L'*Orpiment.* o-o

Arsenicum flavum, *Auripigmentum officinarum.* BOMARE. 2. 28.
Pyrites Auripigmentum. LIN. SYST. 3. 113.

Eſt ſubſtantia è Sulphure & Arſenico combinatis producta, punctulis ſive micis velut aureis nitens, coloris citrini. In Perſiâ & Hungaria invenitur, probatur Turcicum.

AURUM, L'OR. ☉

Sol. Chymicorum.
Aurum purum virgineum. BOMARE. 2. 238.
Aurum nativum. LIN. SYST. 3. 151.

Eſt metallum luteum, ponderoſiſſimum, ductiliſſimum; igne poſt candeſcentiam liqueſcit, dùm liquatur cyaneum eſt. Ejus Aquâ Regiâ ſolutio lutea eſt. Lapidi Lydio affrictum relinquit maculam auratam Aquâ forti non delebilem. Aurum nativum raró caret Argento, Argentum verò nativum raró ſcatet Auro. Reperitur in Peru, Chili, Africâ, Hungariâ, &c. ſæpius in Talco, Cinnabari, rariùs in fluviis.

BELEMNITES, LAPIS LYNCIS, *LA PIERRE DE LYNX.*

Helmintholithus Belemnites. LIN. SYST. 3. 170.

Eſt vermis foſſilis ſeu petrificatus, cylindraceus, verſus apicem conicus, teres, levis, longitudine & craſſitie digiti, ſemi-diaphanus. In Europæ auſtralis locis apricis campeſtribus reperitur.

BISMUTHUM, *LE BISMUTH*, *L'ÉTAIN DE GLACE.* BOMARE. 2. 48. LIN. SYST. 3. 128. ♃

BISMUTHUM, aut WISMUTHUM, ſive MARCHASSITA, eſt ſemi-metallum friabile, ponderoſum, digitos nigro inquinans, aëri expoſitum flaveſcens. Igni admotum fumat, liqueſcit ante candeſcentiam, & pro magnâ parte avolat, reſiduum poſt calcinationem in vitrum tranſmutatur. Biſmuthi ſolutio in Aquâ Regiâ lutei, in Aquâ forti hyalini eſt coloris: additione Aquæ ſimplicis, ſolutio in pulverem album coſmeticum fatiſcit *Magiſter Biſmuthi* nominandum. Invenitur Biſmuthum nativum purum, ſed ut plurimùm fuſione ſimplici è minerâ ſuâ ubi cum Cobalto mixtum eſt, extrahitur.

BITUMEN JUDAICUM, *LE BITUME DE JUDÉE.*

Bitumen judaïcum, ſeu Aſphaltum officinarum. BOMARE. 2. 263.
Bitumen ſolidum coagulatum. WALL. MIN. 195.
Bitumen Aſphaltum. LIN. SYST. 3. 110.

Eſt ſubſtantia ſolida fragilis, ponderoſa, admodum obſcura, è nigro ruſeſcens, ſplendens, inflammabilis, odore gravi, bituminoſo, præſertim dùm incaleſcit; igne liqueſcens, ac inflammabilis.

BOLUS ARMENA, *Le Bol d'Arménie.*

Bolus Armena, ſive orientalis officinarum. BOMARE. 1. 64.
Argilla Bolus rubra. LIN. 3. 203.

Eſt Argilla ſubtilis, pinguis, lubrica, impalpabilis. Laudatur pallido-rubra, non arenoſa. Olim ex Oriente advehebatur; hodie in Galliæ, Italiæ, & Germaniæ provinciis reperitur.

BORAX, *Le Borax.*

Borax, ſive Chryſocolla officinarum. BOMARE. 1. 342.
Borax depuratus albus octangularis. WALL. MIN. 192.
Borax Tincal. LIN. SYST. 3. 94.

Eſt ſal neutrum, ſapore obtuſum, igne intumeſcens, vitreſcens. Eligendum album, leve, cryſtallinum. E Chinâ, & Tranquebar allatum, in Hollandiâ depuratur. Sal illud è baſi Salis marini cùm Sale ſedativo Humbergii combinatum eſſe analyſis docet.

CALAMINARIS, *La pierre Calaminaire.*

Cadmia, aut Lapis Calaminaris officinarum. BOMARE. 2. 62.
Zincum Calaminaris. LIN. SYST. 3. 126.

Eſt ſubſtantia mineralis, flaveſcens, fuſca, lapideſcens, ſubterrea, cum Ferro præſertim, Terrâ & Zinco mixta. Cum Cupro fuſa, colorem aureum ei conciliat, ejuſque pondus auget. Reperitur in Angliâ, Achem, &c. Uſtulata affertur.

CALX, *La Chaux.*

Eſt Terra calcaria vi ignis violenti calcinata. Aquæ affuſione ſtrepit, incaleſcit, tandemque extinguitur & fit puls alba. Aëri humido expoſita, in pulverem album pollinis inſtar fatiſcit. De novo calcinata Calcis vivæ dotes recuperat. Eligenda recens & ſicca.

CARBO FOSSILIS, *Le Charbon de Terre, La Houille.*

Carbo petreus. BOMARE. 2. 249.
Bithumen Lithanthrax. LIN. SYST. 3. 111.

Extrahitur ex Hannoniæ, Galliæ, Angliæ, &c. fodinis.

CERUSSA, *La Céruse.*

Ceruſſa ſeu Plumbum album officinarum. BOMARE. 2. 114.
Ochra Plumbi. LIN. SYST. 3. 193.

Paratur è Plumbo acidis eroſo ac ſoluto. Eligenda ponderoſa & alba. Invenitur Chriſtiersberg ſupra Plumbi galenam.

CHALCITIS FACTITIA, *Le Colcothar.*

Colcothar ſeu Chalcitis Factitia eſt caput mortuum Vitrioli.

CHALCITIS NATIVA, *La Calcite.*

Lapis Vitrioli rubra. Bomare. 1. 313.
Vitriolum atramentarium. Lin. Syst. 3. 106.

Eſt Vitriolum mineraliſatum lapide friabili, imprimis Zinco. Chalcitis nominatur ſi rubrum ſit, ſi cinereum Sory, ſi flavum Misy, tandem ſi nigrum Melanteria dicitur. Invenitur in Rammelsberg cum Vitriolo albo.

CINERES CLAVELLATI, *Les Cendres gravelées.*

Sunt ſal lixivioſum, fixum, è fecibus Vini exſiccatis & combuſtis in Gallia, paratum. Potasse (*Gallicè.*)ſali priori analogum è lignis combuſtis in Poloniâ, Moſcoviâ, &c. producitur.

CINNABARIS NATIVA, *Le Cinabre naturel.* ☿ 33

Cinnabaris nativa officinarum. Bomare. 2. 87.
Hydrargyrum Cinnabaris. Lin. Syst. 3. 119.

Eſt ſubſtantia mineralis, rubra, longitudinaliter ſtriata ac ſplendens, è Sulphure & Mercurio combinatis conſtans. Ex eâ magna Mercurii optimi copia extrahitur.

CRETA ALBA, *La Craie blanche.*

Creta officinarum. Bomare. 1. 76.
Creta coherens ſolida. Vall. Min. 8.
Calx Creta. Lin. Syst. 3. 206.

Eſt terra alba & friabilis è quâ Calx conficitur.

CRETA BRIGANTINA, *La Craie de Briançon.*

Creta Brigantina, ſeu Hiſpanica. Officinarum.
Talco-ſteatites. Bomare. 1. 123.
Talcum ſmectis. Lin. Syst. 3. 52.

Hæc Creta conſtat lamellis minutiſſimis albis ſplendentibus, ſubpinguibus, digitis levi frictione adhærentibus.

FERRUM, *Le Fer.* Bomare. 2. 132. Lin. Syst. 3. 136. ♂

Mars. Chymicorum.

Eſt metallum duriſſimum, ſonorum, colore albo ſplendente, cum quodam livore ſi expolitum ſit, nigricante verò ſi rude & impolitum. A Magnete trahitur. Solutio Aquâ forti fuſca eſt. È Ferro elaboratur CHALYBS, (*l'Acier*); ad uſum vero medicum, Ferrum Chalybe longè præſtat. Ubique fere reperitur: optimum in fodinis Dannemoræ, Nordbergæ, &c. è minerâ nigricante elicitur. Raro Ferrum nativum reperitur.

Ferrum aquæ aut aëri expoſitum diu, in RUBIGINEM ſeu *Ferruginem* abit (*Ochra ferrugo.* LIN. 3. 194).

GAGATES, *LE JAIS, ou JAYET.*

Gagas. BOMARE. 2. 266.
Bitumen Gagas. LIN. SYST. 3. 111.

Eſt ſubſtantia bituminoſa, ſolida, pura, ſicca, leviſſima, aquis ſupernatans, polituram admittens. Reperitur in Galliâ, Angliâ, Germaniâ, &c.

GRANATUS, *LE GRENAT.*

Granatus orientalis. BOMARE. 1. 253.
Borax Granatus. LIN. SYST. 3. 96.

Eſt gemma pellucida, purpurea, rubra, incarnata, raro flava aut viridis. Pretioſior ex Oriente affertur; reperitur etiam in petris & fodinis Sueciæ.

HÆMATITES, *LA PIERRE HÉMATITE.*

Hæmatites officinarum. BOMARE. 2. 141.
Ferrum Hæmatites. LIN. SYST. 3. 140.

Eſt ſubſtantia ferruginea, ponderoſa, gleboſa, obſcurè rubra, ſapore terreo & aſtringente. Dùm frangitur ſtriæ oblongæ ad centrum tendere cernuntur. Naſci videtur ex Ochrâ Ferrugine regeneratâ. Ex Germaniâ affertur.

HYACINTHUS ORIENTALIS, *L'HYACINTHE.*

Hyacinthus orientalis. BOMARE. 1. 141.
Nitrum Fluor purpureo-fulvum. LIN. SYST. 3. 85.

Eſt gemma, purpureo-fulva, pellucida, cum Cryſtallo montanâ in eiſdem fodinis reperitur. Hyacinthus ab aquâ metallicâ in ipſâ generatione tingitur, undè durities & color.

LAC

LAC LUNÆ, *Le Lait de Lune.*

Agaricus mineralis. Officinarum.
Marga candida. DALE. 23.
Calx Gur. LIN. SYST. 3. 207.

LAC LUNÆ eſt Creta ſeu Calx fixa, farinæ inſtar friabiliſſima & impalpabilis, alba, leviſſima. Reperitur in profundis fiſſuris fodinarum & rupium. GUR dicitur dùm aquâ diluta ad thermas fluit.

LATERES, *Les Tuiles.*

Lateres vulgares noſtrates.

Eligantur nitidæ.

LAPIS LAZULI, *La pierre d'Azur.*

Jaſpis cærulescens. BOMARE. 1. 280.
Cuprum Lazuli. LIN. SYST. 3. 145.

Eſt lapis durus compactus cæruleus, colliſione ſcintillans, punctulis ac venis veluti aureis ſæpè ornatus. Nondùm ritè cognoſcitur: Cupro vix ſcatet, Aurum vix continet, ſæpiùs Argentum. Affertur ex Aſiâ, Africâ, Italiâ, Americâ.

LITHARGYRUS, *La Litharge.*

LITHARGYRUS vel LITHARGYRUM in purificatione Argenti producitur. Eligatur quod è Plumbo puro acquiritur. Duplex reperitur, LITHARGYRUM ARGENTEUM coloris paulo pallidioris, & LITHARGYRUM AUREUM præcedenti rubicundius utpotè magis calcinatum.

MAGNES, L'*Aimant.*

Magnes officinarum. BOMARE. 2. 145.
Ferrum Magnes. LIN. SYST. 3. 142.

Eſt lapis ferrugineus, ab aliis ſubſtantiis ferrugineis non diſcrepans niſi virtute ad ſeſe attrahendi Ferrum & polum borealem monſtrandi. Reperitur paſſim in Ferri fodinis.

MERCURIUS, *Le Mercure, Le Vif-Argent.* ☿

Mercurius purus nativus. BOMARE. 2. 84.
Hydrargyrum virgineum. LIN. SYST. 3. 119.

MERCURIUS ſeu HYDRARGYRUS eſt ſubſtantia metallica valdè ponderoſa, fluida, ſicca, argenteo ſplendore nitens, igne facilè avolans, cujus ſolutio Aquâ Forti albida eſt. Eligendus purus, nullo me-

tallo inquinatus. È Cinnabari nativâ copiosiùs extrahitur, & in pluribus Germaniæ provinciis invenitur.

NATRUM FONTANUM, *Le Sel des eaux minérales.*

Sal catharticum amarum. Officinarum.
Neutrum acidulare. BOMARE. I. 324.
Natrum fontanum. LIN. SYST. 3. 89.

Est sal neutrum seu medium sapore amaricans, igne liquescens. Reperitur in quibusdam fontibus: EPSOM in Angliâ: SEDLITZ in Bohemiâ: &c. Factitium ad cortinarum parietes in quibus Sal culinare coquitur, generatur.

NATRUM MURORUM, *Le Sel mural.*

Aphro-Natron. BOMARE. I. 321.
Aphronitrum. WALL. MIN. 300.
Natrum murorum. LIN. SYST. 3. 88.

Est sal calcarium, igne liquescens. Reperitur in muris calce constructis, sub eorum fornicibus aëri humido expositis, pruinæ instar efflorescens. Eligendum purum, album.

NEPHRITICUS LAPIS, *Le Jade, ou Pierre Néphrétique.*

Jade. BOMARE. I. 206.
Talcum Nephriticus. LIN. SYST. 3. 53.

Est lapis viridis, subdiaphanus, fissilis, Cupro scatens. Reperitur in Hispaniâ, Americâ.

NITRUM, *Le Nitre, ou Salpêtre.* BOMARE. I. 327. LIN. SYST. 3. 84. ⦶

NITRUM seu SAL PETRÆ est sal fusile, phlogistico detonans, gustu frigido-acre, crystallos efformans prismaticas, exagonas, basi acutas. Rarò purum à naturâ paratum reperitur, adeoque in officinis artificiale solummodo venale est & *Sal Petræ tertiæ coctionis* vocatur. Extrahitur è terrâ nitrosâ.

OSTEOCOLLA, L'*Ostéocolle.*

Rizolithus. BOMARE. 2. 295.
Tophus Osteocolla. LIN. SYST. 3. 189.

Est tophus calcarius, subcylindraceus, perforatus, albidus. Oritur è

materiâ calcariâ tenuissimâ, sabulo mixtâ & variarum arborum radicibus altiùs sepultis circumnatâ. Reperitur Massiliæ, in Silesiâ, Marchiâ Brandeburgicâ.

PETROLEUM, *Le Pétrol, L'Huile de Gabian.*

Petroleum. BOMARE. 2. 254.
Bitumen Petroleum. LIN. SYST. 3. 109.

PETROLEUM seu OLEUM TERRÆ est bitumen varii coloris & consistentiæ. Primò liquidum & purpurascens, dein lentescens & nigrum. Eligatur liquidiusculum ac fusco-rufescens. In Italiâ, &c. è marmore vel schisto exsudat.

PLUMBUM, *Le Plomb*, BOMARE. 2. 95. LIN. SYST. 3. 132. ♄

Saturnus. Chimicorum.

Est metallum molle, cærulescenti-album, mutum, non elasticum. Ejus solutio Aquâ Forti, hyalina est; præcipitatum, album. Igni admotum ante candescentiam liquescit, dein calcinatione in cineres grisei coloris transmutatur; aucto per gradus igne, primò flavescit (MASSICOT est), secundò rubescit (MINIUM vocatur), tandem fit LITHARGYRUM & vitrescit in vitrum flavum, trans crucibulum abiens.

POMPHOLIX, *Le Pompholix.*

POMPHOLIX seu NIHIL ALBUM est calx seu terra metallica Zinci, phlogistico privata: tempore deflagrationis Zinci, sub formâ flocculorum alborum, avolat & superiori fornacis parti adhæret. POMPHOLIX eligenda est alba, levis, impalpabilis, acrimoniæ expers.

PUMEX. *La Pierre Ponce.*

Pumex BOMARE. 2. 289.
Pumex Vulcani. LIN. SYST. 3. 181.

Est lapis porosus, spongiosus, levis, fibris constans setaceis, parallelis, nigris, temporis lapsu cineraceis. È montibus ignivomis eructatur.

SAL AMMONIACUM, *Le Sel Ammoniac.* ✱

Est sal neutrum è fuligine fimi Camelorum aliorumque quadrupedum combusti, in placentas sublimatum. Eligatur candidum purum, salis alkalini additione odorem salis volatilis subito spargens. In Ægypto paratur.

SAL GEMMÆ, *Le Sel Gemme.* ♉ ⊖

Sal Gemmæ. BOMARE. 1. 331.

Muria montana. LIN. SYST. 3. 98.

Eſt ſal foſſile ſolidum ac cryſtalliſatum, indolis Salis marini. Invenitur in Poloniâ minore & Hungariâ.

SAL MARINUM, *Le Sel ordinaire de Cuisine.* ⊖

Sal commune. BOMARE. 1. 330.
Muria marina. LIN. SYST. 3. 98.

Eſt ſal neutrum, cubicum, ſapore acuto, igne crepitans, ex aquâ marinâ ope ignis, Solis aut gelu, cryſtalliſatum.

SAPHYRUS, *Le Saphir.*

Alumen Saphyrus. LIN. SYST. 3. 103.

Eſt gemma, cærulea, pellucida, limam reſpuens, igne colorem amittens. In Indiis reperitur.

SARDINUS, *La Sardoine.*

Silex Sardus. LIN. SYST. 3. 68.

Eſt gemma ſubdiaphana, quaſi filis lacteis intricata, & punctis atomiſque ſanguineis aſperſa. Reperitur in Indiâ & Sardiniâ.

SILEX, *La Pierre a fusil.*

I. Saxum cornutum. Vulgo.
Silex cretaceus. LIN. SYST. 3. 67.

II. Silex pyromachus. LIN. SYST. 3. 67.

Cretaceus & Pyromachus Silex inter ſe ſunt affines. Prior in noſtratibus fodinis cretaceis vulgatiſſimus; poſterior in Galliâ frequens, à priori differt fragmentorum conſiſtentiâ minus fragili, & imprimis pelluciditate corneâ ac glabritie quaſi oleo imbutâ. Sumuntur indiſcriminatim.

SMARAGDUS, L'*Émeraude.*

Borax Smaragdus. LIN. SYST. 3. 95.

Eſt gemma, pellucida, viridis, calefactione phoſphorea, colorem in igne retinens; ad Boracem, figurâ cryſtallorum, proximè accedens. Invenitur in Indiâ orientali.

STANNUM, L'*Étain.* BOMARE. 2. 111. LIN. SYST. 130. ♃

Jupiter. Chimicorum.

Est metallum molle, malleabile, album, omnium levissimum, flexione stridens, mutum, vix elasticum. Plerisque metallis malleabilitatem aufert. Post fusionem candescit. Ejus solutio Aquâ Regiâ flava est. Stannum nativum vix invenitur. Elicitur è minerâ suâ quæ *Stannum crystallinum* nuncupatur. Stannum calcinatum gallicè *Potée d'Étain* vocatur.

SUCCINUM, *Le Succin.*

Succinum, sive Karabe officinarum. BOMARE. 2. 268.
Succinum electricum. LIN. SYST. 3. 208.

Est substantia bituminosa, dura, arida, fragilis, inflammabilis, pellucida; nunc flava vel citrina, nunc albicans, nunc fusca; saporis subacris, bituminosi, aliquantulùm astringentis; odoris dùm incalescit; fragrantis & bituminosi. Attrîta vel calefacta paleas & festucas ad se trahit. Optimum est pellucidum, maculæ expers, huic succedit album, dein flavum seu citrinum. Invenitur in Prussiâ, Galliâ, &c.

SULPHUR, *Le Soufre.* BOMARE. 2. 283. 🜍

Est substantia è phlogistico & acido vitriolico confecta, inflammabilis flammâ cæruleâ; fumum, odore acido, acuto, pulmonibus infestum exhalans; solubilis in Oleo. Sulphur nativum vivum *clarum* in gypso & spatho albo Helvetiæ & Siberiæ, *pulvereum* in thermis præsertim Italiæ & Aquis-Granensibus, *impurum* in montibus ignivomis invenitur. *Factitium, fusum, (le Soufre en canon,)* è pyrite Ferro mixtâ extrahitur; eligendum purum citrinum.

TERRA AMPELITIS, *La Pierre noire.*

Terra Pharmacitis. Officinarum.
Nigrica. BOMARE. 1. 142.
Schistus Nigrica. LIN. SYST. 3. 38.

Est lapis niger, fissilis; laminis constans molliusculis, friabilibus, tactu digitos inquinantibus. In Galliâ, Italiâ, Lusitaniâ, &c. reperitur.

TERRA COTARIA, *La Terre de Rémouleur.*

Est terra Ferro è cotariis lapidibus deciduo imprægnata.

TERRA LEMNIA, *La Terre sigillée.*

Terra Lemnia, sive Sigillata officinarum. BOMARE. 1. 64. N.° 5.
Argilla Lemnia. LIN. SYST. 3. 201.

Est terra seu argilla pallido-incarnata, pinguis, in aquâ cum strepitu fatiscens. Eligatur pura, non arenosa, linguæ adhærens. Ex insulâ Lemniâ & regno Turcico affertur.

TERRA UMBRIÆ, *La Terre d'Ombre.*

Umbra. BOMARE. I. 71.
Argilla Umbra. LIN. SYST. 3. 204.

Eſt terra purpuraſcenti-fuſca, parco bitumine & Ferro inquinata. Ex Germaniâ, Italiâ, Angliâ affertur.

TALCUM, *Le Talc.* X

Talcum album aut argenteum. BOMARE. I. 121.
Mica Talcoſa. LIN. SYST. 3. 59.

Eſt lapis ſubpinguis, friabilis ex lamellis flexibilibus, albo-vireſcentibus, ſubdiaphanis conſtans. Venetiis exportatur.

TUTHIA, *La Tutie.*

Nihil griſeum. Officinarum.

Eſt productum metallicæ indolis, in fornacibus in quibus Æs funditur collectum. Eligenda denſa, medicè gravis, & cinerea.

VITRIOLUM, *Le Vitriol.* BOMARE. I. 298. LIN. SYST. 3. 104. ⊕

Eſt ſal metallicum, acidum, ſapore ſtypticum, igni calcinabile: ratione baſis & coloris diſtinguitur in *album*, *cæruleum*, & *viride.*

VITRIOLUM ALBUM (*la Couperoſe blanche*), eſt acidum vitriolicum Zinco combinatum, cujus ſolutio, affuſo auſtero nigreſcit, alkalino lactea evadit. Eligendum album inſtar Sacchari, non nimis durum. Reperitur in Germaniâ.

VITRIOLUM CÆRULEUM (*le Vitriol bleu*), eſt acidum vitriolicum Cupro combinatum, cujus ſolutio, affuſo auſtero lacteſcit, alkalino cærulea evadit. Reperitur in Cypro.

VITRIOLUM VIRIDE (*le Vitriol verd*), eſt acidum vitriolicum Ferro combinatum, cujus ſolutio, auſtero affuſo nigra, alkalino vireſcens evadit. Reperitur in fodinis Ferri pyriticoſi.

ZINCUM, *Le Zinc.* BOMARE. 2. 54. LIN. SYST. 3. 125. ♃

Eſt metallum ſub-malleabile, cæruleſcenti-album, igne ante candeſcentiam liquabile, flammâ luteo viridi combuſtibile, & in favillas albas floccoſas (*Pompholix*) abiens. Solutio ejus Aquâ Forti alba eſt. Limatum attrahitur à Magnete uti Ferrum. Raró Zincum nudum nativum invenitur. Aliis ſubſtantiis metallicis miſcetur; exceptis Biſmuto & Molybdæno. Cum Cupro mixtum fit AURICHALCUM.

APPENDIX.

DE COLLECTIONE ET ASSERVATIONE SIMPLICIUM.

CANON. I. RADICES plantarum *Annuarum* evellas, cùm folia perfecta sint, ante caulium ad florescentiam eruptionem; *Biennium* autumno ejus anni quo sata sunt semina; *Perennium* autem, foliis defluentibus, ut plurimùm tempore autumnali.

Ablutæ, à fibrillis aridis & corruptis liberatæ, in taleolas aut orbiculos, si opus sit, sectæ, in umbrâ & loco perflabili suspendantur.

Radices, quarum virtus exsiccatione perit, sabulo sicco obrutæ, serventur.

Radices parvæ, tenues, rarioris compagis, singulis annis renoventur.

II. HERBÆ legantur illo ætatis vigore quo folia perfecta jam eruperunt; sed antequam flores explicentur.

Siccentur in umbrâ ut radices.

Singulis annis renoventur, licet pleræque diutiùs asservari possint.

III. FLORES mediocriter expansi, rore non madidi, tempore sereno carpantur; ut & nonnullarum SUMMITATES FLORENTES.

Rosarum rubrarum nondùm explicitarum petala exungulentur.

Flores quamdiu odorem, colorem & saporem retinent, asservari possunt, ut plurimùm annuatim renovandi.

IV. SEMINA colligantur matura, exsiccationi proxima, antequàm sponte excidant.

Calida, *acria*, *aromatica*, utpotè durabiliora, per biennium aut triennium servari possunt; frigida verò, quamdiu rancorem non contrahunt.

V. FRUCTUS maturi colligantur; nisi præscribantur immaturi.

Quotannis renoventur, at exotici & cortice duriori aut crustâ vestiti per duos tresve annos conservantur.

VI. LIGNA & CORTICES tempore præcipuè hiberno cædantur & abradantur.

In annum & ultra perdurant.

VII. RESINÆ & GUMMI diutiſſimè ſervantur.

VIII. ANIMALIA & eorum PARTES ſana, adulta & incorrupta eligantur; niſi juniora expetantur.

IX. MINERALIA ſunt omnium diuturniſſima.

DE SIMPLICIBUS UNO VERBO COMPREHENSIS.

Quinque radices aperientes majores.	Apii, Aſparagi, Fœniculi, Petroſelini, Ruſci.
Quinque radices aperientes minores.	Capparis, Eryngii, Graminis, Rubiæ tinctorum, Anonidis.
Quinque herbæ capillares..............	Adiantum verum, Adiantum album, Adiantum Polytrichum, Adiantum Ruta muraria, Ceterach.
Quatuor herbæ emollientes...........	Acanthus, Althæa, Malva, Viola.
Quatuor herbæ emollientes aliæ.......	Atriplex, Beta, Mercurialis, Parietaria.

Tres

Tres flores cordiales........
- Borraginis,
- Bugloſſi,
- Violarum.

Herbæ vulnerariæ, vulgò *Faltrank.*
- Folia.
  - Alchimillæ,
  - Pervincæ,
  - Pyrolæ,
  - Saniculæ.
- Flores.
  - Bellidis minoris,
  - Centaurii minoris,
  - Farfaræ,
  - Pedis Cati.
- Folia & Flores.
  - Betonicæ,
  - Brunellæ,
  - Jacobææ,
  - Virgæ aureæ,
  - Bugulæ,

Quatuor ſemina calida majora.
- Aniſi,
- Fœniculi,
- Carvi,
- Coriandri, vel Cumini.

Quatuor ſemina calida minora.
- Ammeos,
- Amomi, vel Cardamomi,
- Apii,
- Dauci.

Quatuor ſemina frigida majora.
- Citrulli,
- Cucumeris,
- Cucurbitæ,
- Melonum.

Quatuor ſemina frigida minora.
- Cichorii,
- Endiviæ,
- Lactucæ,
- Portulacæ.

Quatuor farinæ.	Fabarum, Fœnugræci, Hordei, Lini.
Quatuor farinæ aliæ.	Orobi, Lentium, Lupinorum, Similago.



PHARMACOPŒA *INSULENSIS.* PARS SECUNDA.

DE MEDICAMENTIS COMPOSITIS.

PROLUSIONES.

DE PONDERIBUS MEDICIS.

PRo Ponderum baſi ac fundamento eam ſeligimus Unciam, utpotè certam & immutabilem, quæ Beſſis (*le Marc*), octavam partem adæquat.

Caracteres Ponderum ſequenti modo ſignantur.

LIBRA, Uncias ſexdecim pendens. . . . . ℔ j.
SESQUILIBRA, Uncias viginti quatuor. . . . . ℔ iß.
SELIBRA, Uncias octo. ℔ ß.
UNCIA, Drachmas octo, ... ℥ j.
SESCUNCIA, Drachmas duodecim. . . . . ℥ iß.

SEMUNCIA, Drachmas quatuor. . . . . ℥ ß.

DRACHMA, Scrupulos tres. . . . . ʒ j.

SESQUIDRACHMA, Scrupulos quatuor & ſemis. . . . . ʒ iß.

SEMIDRACHMA, Scrupulum & ſemis. . . . . ʒ ß.

SCRUPULUS, Grana viginti quatuor. . . . . ℈ j.

SEMISCRUPULUS, Grana duodecim. . . . . ℈ ß.

GRANUM . . . . gr j.

Cum Trutinæ optimæ ſint neceſſariò adhibendæ, ſequentia in earum ſelectu notabis.

CANON. I. Trutina ſit Bilanx.

II. Examen (l'*Aiguille*,) ſit perpendicularis cum Jugo (*les Bras*,) ut tempore æquilibrii, ſtet in medio Anſæ (*la Chaſſe*).

III. Jugum ſit ab Axe (l'*Axe*,) ita æqualiter bipartitum, ut pondera æqualia poſſint in utràque Lance indiſcriminatim poni, & ſtare in æquilibrio.

Extremitates Jugi ſunt puncta Lances ſuſpendentia.

IV. *Centrum gravitatis*, (eſt punctum in medio lineæ jungentis extremitates Jugi), cum *centro ſuſpenſionis*, ſeu *oſcillationis* in Axe poſito confundetur, ut Bilanx non ſit fallax; quod duplici modo ſit.

Primo quandò centrum gravitatis altius eſt centro oſcillationis. Hæc Bilanx ponderibus quamvis æqualibus onerata, vix in æquilibrio poteſt ſtare; at rarò invenitur talis.

Secundò, quandò centrum oſcillationis altius eſt centro gravitatis; tùm Bilanx vix mobilis videtur, & difficulter hâc trutinemur. Bilancis falſæ hæc ultima ſpecies frequenter reperitur.

V. Pondera argentea vel ænea adhibeantur; plumbea enim aut ferrea facilius alterantur.

DE MENSURIS MEDICIS.

PINTA eſt Menſura cujus ſoliditas pollices cubicos viginti ſex cum dimidio adæquat. Aquâ communi frigidâ repleta uncias ſexdecim circiter pendet.

Sic notatur . . . . *Pint. j.*

CANON. Menſuras in Pharmaciâ non adhibe, ſed omnia trutinare: diverſa enim liquida ejuſdem Menſuræ, ponderibus diverſis æquipollent.

Metieris tamen liquida quorum dosis non ponderis sed Mensuræ caractere designatur.

DE ABBREVIATIS VERBIS.

℞. *Id est*, Recipe.

ANA, AN, A, AA, *seu* @. *Singulorum prius recensitorum medicamentorum quantitatem sequentem sumendam esse significat.*

AD PONDUS OMNIUM. *Medicamentum cui hæc nota adscribitur, æqualis debet esse ponderis, ac alia simul sumpta.*

B. M. Balneum Maris, *vel* Mariæ.

B. V. Balneum Vaporis.

BOL. Bolus. *Medicamentum Opiatæ consistentiæ unâ vice sumendum.*

COCHL. Cochleare. *Circiter semunciam liquoris, seu trigesimam secundam partem Pintæ capit.*

DOS. Dosis. *Determinata portio Medicamenti.*

FASC. Fasciculus. *Quantùm manu ad axillam complicatâ comprehenditur.*

HAUST. Haustus. *Potio unicâ vice sumenda. Capit circiter uncias quatuor liquoris, seu quartam partem Pintæ.*

M. *Id est* Misce.

MANIP. Manipulus. *Quantùm manus comprehendere potest. Unciam pendet si Herbæ sint recentes; semunciam verò si siccæ.*

N.° Numero.

PAR. Paria.

PART. ÆQ. Partes æquales.

PP. Præparare, *vel* Præparatum.

PUG. Pugillus. *Quantùm cum pollice duo primi digitorum apices assumere possunt. Drachmas duas pendet si Herbæ sint recentes, semidrachmam verò si siccæ.*

POO. Potio.

Q. S. Quantum satis, Quantitas sufficiens.

Q. V. Quantum vis. *Hoc est ad Pharmacopæi libitum.*

S. A. Secundum artem. *Id est*, secundum regulas artis.

DE SUPELLECTILE.

LABORATORIUM dicitur locus in quo Pharmacopœus operationes ſuas peragit, ac Medicamenta præparat. Præparata autem, in *Apothecis* ſeu Pixidibus aut vaſis idoneis ſervat, & in *Officinâ* convenienti ordine reponit.

MORTARIUM eſt campana pulverationi inſerviens, ex Ære, Ferro, Marmore, vel Vitro, &c. confecta, in quâ medicamenta contunduntur, vel teruntur, imò pulverantur *Pilâ* ſeu *Piſtillo* idoneo.

Pulveres per *Cribrum* ſeu *Incerniculum*, aut *Capiſterium*, ſi opus ſit, trajiciuntur & ſuccernuntur.

PORPHYRITES eſt lapis durus, ſuperficie levi, æquali, ad triturationem aptatus, *Molaris* alterius duriſſimi lapidis ope.

TORCULAR eſt prelum quo Olea vel Succi *exprimuntur*. Succi expreſſi ſæpè per *Filtrum* vel *Colum* trajiciuntur. Coli tres ſpecies diſtinguntur.

1° MANICA HIPPOCRATIS. Eſt ſaccus laneus figuræ pyramidalis.

2°. PANNUS. (*Blanchet*). Eſt panni albi portio quadratæ formæ.

3°. STAMEN. (*Étamine*). Eſt tenue cilicium, vel tela cannabina.

FILTRUM ſæpiſſime eſt *Charta emporetica* ſeu *Bibula*, ſive Papyrus poroſa, ſine glutine facta.

SPATHULA ſeu *Spatha*. Eſt inſtrumentum oblongum, inferius latum, quo abſque manuum inquinatione Medicamenta commodè tractantur.

ALEMBICUS. Eſt inſtrumentum è Cupro, Stanno, vel Vitro, &c. confectum, diſtillationibus inſerviens. Partes ejus ſunt;

I. VESICA ſeu *Cucurbita*. Eſt pars infima Alembici quæ in foco collocatur, & in quâ liquor diſtillandus imponitur. Figuræ eſt turbinatæ, oblongæ.

II. CAPITELLUM. Cucurbitæ imponitur operculi vice. Capitelli partes ſunt;

1.° REFRIGERATORIUM. Aquâ frigidâ repletur in diſtillatione, ut vapores condenſentur.

2.° GALEA (*la Tête de More*). Eſt pars interior Capitelli, ita fabrefacta ut vapores condenſati delabantur in Roſtrum.

3. ROSTRUM. eſt pars ſuperior *Fiſtulæ* perquam liquor in Excipienti ſeu Recipienti diſtillat.

Dantur Capitella *Cæca* dicta, sine Refrigeratorio & absque rostro.

III. RECIPIENS seu Excipiens. Est vas figulinum aut vitreum rostro Alembici adaptandum. Sæpè *Matratium*, seu lagena collo longo, Recipientis vices gerit.

Datur alia species Alembici CORNUTA vel RETORTA dicta, quia collum ejus ad instar cornu retortum est. Retorta capitello non indiget.

NOTA. I. Ad Alembicos pertinet VAS CIRCULATORIUM, (*Vaisseaux de rencontre*) : conficitur ex duobus matratiis sibi mutuè junctis, ita ut vapores elevati in proprium liquorem denuò descendant, & quasi in circulos rotentur. *Digestionibus* inservit.

II. BALNEUM est materia in quâ Cucurbita aut Retorta reponitur : quare dicitur *Balneum arenæ* si in arenâ collocatur ; *Balneum cinerum* si in cineribus insulsis ; *Balneum mariæ* seu *maris* si in aquâ calidâ ; *Balneum vaporis* si vaporibus aquæ bullientis exponatur, &c.

III. Fimus Equi calidus in quo Cucurbita aut Retorta imponitur *Venter equinus* dicitur.

FURNUS est machina cujus ope ignis continetur, coercetur & applicatur gradu necessario. Partes Furni sunt ;

I. CINERARIUM. Est pars inferior in quam cineres delabuntur.

II. FOCUS. Est locus ignem continens.

III. CRATICULA, cui carbones vel materia combustilis imponitur ; Focum à Cinerario separat.

IV. PORTÆ Cinerarii & Foci : foraminibus *Registris* dictis pertusæ sunt pro regimine ignis.

IGNIS GRADUS sunt quatuor.

PRIMUS GRADUS à calore hominis sani seu decimo octavo gradu Thermometri *D. RÉAUMUR* incipit & ad vigesimum octavum desinit. Est calor *Hypocaustorum* in quibus Medicamenta siccantur. Elixiriis, Tincturis, &c. parandis & fermentationi inservit.

SECUNDUS GRADUS ignis à vigesimo octavo gradu ejusdem Thermometri ad octogesimum extenditur, quo solet aqua ebullire. Decoctis, Distillationibus, &c. necessarius est.

TERTII GRADUS latitudo, est ab octogesimo gradu ad Olei & Argenti vivi ebullitionem. In eo gradu Plumbum & Stannum liquantur.

QUARTO ET ULTIMO gradu, in *Crucibulis* seu vasis fusoriis metalla

cætera funduntur, vitrescit arena, calcinatur lapis calcarius, &c. Hic gradus *Reverberii* vocatur.

NOTA. Dicitur *ignis graduatus* qui per gradus augetur. *Ignis arenæ* pro Balneo arenæ. *Ignis nudus* dùm aliquid prunis immediatè imponitur.

Modiolus fusorius (gallicè *Lingotiere*) & Conus, sunt vasa ferrea in quæ metalla fusa effunduntur.

DE OPERATIONIBUS.

Operatio dicitur ea actio quâ Medicamenta parantur: quod fit;

I. Per Dispensationem seu simplicium Medicamentorum, remedium compositum *ingredientium*, debitâ quantitate selectionem, proùt *formula* seu regula docet.

II. Per Processum seu debitam manipulationem, & ad leges artis consonum operandi modum. *Processus chymicus* dicitur cùm de operatione chymicâ agitur.

Levigare est substantiarum pulverationem ad perfectissimum gradum ducere. Has substantias *conquassatas*, seu pistillo tusas vel trituratas grosso modo, *pulvera* tenuiùs; dein *leviga* seu in pollen subtilissimum & impalpabile (sive ut aiunt in *Alkool*) redige.

Levigatio vel fit simpliciter supra porphyritem *siccè*; aut, si opus sit, affuso liquido. Vel fit *abluendo* in magnâ liquidi quantitate, *per inclinationem* materiam turbidam effundendo, tandem post *subsidentiam* longam *Decantando*.

Depurare vel *Defecare* est purum ab impuro separare. Impura quæ post depurationem relinquntur *Magma* aut *Feces* dicuntúr. Pluribus modis fit Depuratio.

Per residentiam aut *subsidentiam*: *Decantare* dicitur, Liquor à fecibus *per inclinationem* seu sensim inclinando effunditur, ne feces liquorem turbent.

Per Despumationem. Inter coquendum spuma supernatans aufertur.

Per Clarificationem. Succos aut Decocta clariora redduntur vel *Filtratione*, vel *Colaturâ*, per Filtrum vel Colum trajiciendo; (liquor colatus, *Colatura* dicitur.) vel additione Albuminis, Aceti, &c. vel fermentatione.

Fermentatio autem est motus intestinus substantiarum quo earum principia,

principia ita mutantur ut producta diversa præbeant. Triplex est: prima *vinosa* est, & spiritum ardentem distillatione producit; secunda *acida*, quâ Aceta parantur; tertia *putrida*, quâ putrefiunt omnia.

Tandem MUNDARE dicitur quoque de separatione rerum impurarum, inutilium, aut nocivarum. Fit;

1.° LAVANDO aquâ, aliove liquore.
2.° DECORTICANDO, seu *excorticando*, hoc est à cortice liberando.
3.° RADENDO, seu partes exteriores cultro auferendo.
4.° EXUNGULANDO, dùm petalorum pars infima rescinditur, &c.

MALAXARE est emollire, manu aut pilâ subigendo.

INCORPORARE est plurima medicamenta in massam coadunare.

DISSOLVERE dicitur de metallis; SOLVERE autem de salibus. Est convenienti *Menstruo* seu liquore, rem ita dividere & resolvere ut penitùs evanescat.

Si in Argento vivo fiat dissolutio *Amalgama* vocatur: *Mars* nequit amalgamari.

Si materia dissoluta fundum menstrui petat, *Præcipitata* dicitur.

INFUNDERE est materiam liquori immergere. Per *Infusionem* Medicamentorum vires extrahuntur. Si Infusio blando & constanti calore fiat DIGESTIO dicitur. Si autem fiat frigidè, MACERATIO nuncupatur. Tandem si radiis solaribus exponatur INSOLATIO est.

DISTILLARE est corporum partes volatiles per Alembicum vi ignis elicere. Fit pluribus modis.

I. PER ASCENSUM dùm Alembicus munitus est capitello.
II. PER LATUS dùm distillatio fit per Retortam.
III. PER DESCENSUM dùm materia distillanda sub igne ponitur. Hujus distillationis usus, utpotè vitiosus, abolevit.

In distillationibus prodeunt: 1.° volatiliora ut *Spiritus* seu partes tenuissimæ & incorruptibiles, vel *Essentiæ* in quibus potissimùm vires medicamentosæ resident.

2.° Partes minus volatiles ut *Phlegma* seu pars aquosior.
3.° *Empireumatica* seu adusta, odoris ingrati ob ignis violentiam.
4.° Remanet in fundo Alembici *Caput mortuum* vel *Terra mortua* (*Terre morte*) seu materia residua ascensionis incapax.

Diſtillatio corporis ſolidi *Sublimatio* dicitur: partes ejus volatiles *Flores* vel *Salia volatilia* appellantur & ſub formâ ſolidâ ad capitellum adhærent.

Si liquor diſtillatus proprias ſuper feces affundatur, ac denuò diſtilletur, fit *Cohobatio*.

Rectificantur, id eſt iterùm diſtillantur, quædam remedia, ut puriſſima ſive in *Alkool* evadant. Vinum cujus pars ſpirituoſa avolavit *Vappa* dicitur.

NOTA. I. Retortæ igni nudo exponendæ *loricantur*, id eſt argillâ aliâve materiâ, à nimiâ ignis torturâ, defenduntur.

II. In omnibus fère diſtillationibus vaſa *lutantur* ſive eorum juncturæ vel fiſſuræ viſcido quodam obturantur.

Crystallisare eſt ſalia in cryſtallos efformare: quod fit,

I. Refrigerando, ſeu in loco frigido ſolutionem reponendo.

II. Evaporando & refrigerando ſimul; tum fit evaporatio *ad pelliculam*, hoc eſt uſque dum pellicula ad ſuperficiem liquoris appareat. Cryſtallis exemptis, evaporatio & refrigeratio inſtituentur iterum, toties id repetendo donec ſolutio cryſtallos dare neget.

Evaporatur *ad ſiccitatem*, cùm humiditas omnis diſſipatur.

Candisare eſt Saccharum cryſtalliſare.

Quædam ſalia cryſtalliſationis incapacia ſunt; ſed ad ſiccitatem evaporata, denuò humiditatem attrahunt & *in deliquium* ſeu in liquorem diffluunt: talia ſunt *Sal Tartari*, *Butyrum Antimonii*, &c.

Assare, ſeu *Torrere*, eſt in ſartagine igni expoſitâ, Medicamentorum humiditatem abſumere, *continue agitando*.

Decrepitare eſt ſal, vi ignis, aquâ cryſtalliſationis cum ſtrepitu privare.

Calcinare verò eſt principia volatilia omnia vi ignis auferre, ut in *Calce viva*; aut corpora phlogiſtico privare, ut in *Calce metallicâ*.

Fumigare eſt fumo exponere.

Fundere & *Liquare* eſt materiam igni exponere donec fluat. *Fundere* ad metalla, *Liquare* ad reliqua pertinet.

Incinerantur corpora dùm in cineres rediguntur.

NOTA. I. Materiæ pluries candefactæ & in aquâ toties alternatim immerſæ, *Extinctæ* dicuntur, ſed Mercurius vivus dicitur extinctus quando cum Axungiâ aut Terebinthinâ ita miſcetur ut percipi nequeat.

II. CEMENTARE vel *Stratificare* eſt medicamenta cum *Cemento* ſeu pulvere aut paſtâ idoneis alternatim per *ſtrata* ſeu *ſtratum ſuper ſtratum* diſponere ; eâ cautione ut primum & ultimum ſtratum ſit à cemento.

III. DETONATIO , *Exploſio* , ſeu *Deflagratio* eſt actio Nitri cum phlogiſtico combuſti, aut ſolummodò calefacti vel confricti. Cave ab omni detonatione, ſed præſertim à deflagratione *Auri fulminantis*.

DE PRÆPARATIONIBUS MEDICAMENTORUM.

ADIPIS PRÆPARATIO.

℞. Adipis recentis cujuſvis animalis ſani. *Quantùm volueris.*

Fibras & venulas exime, concide minutim & elue multotiès aquâ purâ. Liqueſcat igne leni ad humiditatis conſumptionem; cave ne comburatur. Cola & reconde in vaſe idoneo.

ALOES LOTIO.

℞. Aloës . . . . *Quantùm volueris.*

Solve in aquæ fontanæ quantum ſatis, adhibito leni calore. Cola; rejectis fecibus, ad Mellis conſiſtentiam evapora.

NOTA. Aloë lucida & puriſſima non indiget lotione.

ALTHÆÆ MUCAGO. (*a*)

℞. Radicum Althææ in taleolas ſectarum. *Libram.*
Aquæ tepentis . . . . *Pintas vj.*

Digere per viginti quatuor horas ſuprà cineres

(a) *Mucago*, ſeu *Mucilago* quaſi ad *Mucum* accedens.

calidos, identidem agitando ſpathâ ligneâ. Dein bulliant donec aqua paulò plus lenteſcat quam albumen. Tùm trajice per ſetaceum & fortiter exprime.

Eodem modo parantur MUCAGINES { CYDONIORUM, FŒNUGRÆCI, LINI, PSYLLII, &c.

ALUMINIS PURIFICATIO.

℞. Aluminis romani . . . . *Quantùm volueris.*

Solve in ſufficienti quantitate aquæ ferventis. Filtra; evapora ad pelliculam. Repone in cellâ ut concreſcant cryſtalli.

Sic purificatur BORAX.

ALUMINIS USTIO.

℞. Aluminis rupei . . . . *Quantùm volueris.*

Mitte in patinam fictilem non vitratam. Igne nudo calcina.

GUMMI AMMONIACI PURIFICATIO.

℞. Gummi Ammoniaci . . . . *Quantùm volueris.*

Solve, leni igne, in ſufficienti quantitate Vini albi, aut Aceti. Solutionem lacteſcentem pluries per ſtamen vel cribrum trajice, fortiter exprimendo: colaturam evapora ad mellis conſiſtentiam.

Sic purificantur { BDELLIUM, GALBANUM, SAGAPENUM, OPOPANAX, EUPHORBIUM.

NOTA. I. Gummi lacrymæ puriores non indigent purificatione.

II. *Scammonium* præparatum DIAGRIDIUM vel DIACRIDIUM vocatur. Nullà tamen indiget

præparatione ; ſed poſt pulverationem aëri expoſito ut nauſeoſum odorem amittat.

ANTIMONII PRÆPARATIO.

℞. Antimonii crudi in mortario ferreo pulverati . . . . *Quantùm volueris.*

Suprà porphyritem leviga. Cum aquâ multâ permiſce ; aquam turbidam per inclinationem in vas idoneum decanta. Cum Antimonio ſuperſtite eaſdem operationes repete donec totum exhauſtum ſit. Dein Antimonium alkooliſatum, per ſubſidentiam in fundo remanens, exſicca & ſerva.

Eodem modo præparantur { BOLUS, CERUSSA, CINNABARIS, CRETA, HÆMATITES, LITHARGYRUS, MAGNES, &c.

ARI FECULA.

℞. Radicum recentium Ari mundatarum . *Quantùm volueris.*

In mortario marmoreo tuſas, in ſacco cannabino prelo exprime. Succum in vaſe vitreo repone. Paulatim *Fecula* ſubſidet, Amyli inſtar. Decantato liquore ad Solis calorem Feculam exſicca in lapide cretaceo chartâ albâ cooperto.

Sic præparatur FECULA { BRYONIÆ, IREOS, &c.

BUFONUM USTIO.

℞. Bufones . . . . *Quot volueris.*

Crema igne nudo per horam, in ollâ fictili coopertâ non vitratâ. Pulvera & ſerva.

Sic uri poſſunt { ERINACEI, SPONGIÆ, &c.

BUTYRI MAJALIS PRÆPARATIO.

℞. Butyri recentis insulsi sub finem Maii confecti . . . . *Quantùm volueris.*

Liqua balneo maris in vase fictili vitrato. A subsidente sero separa. Reconde in vase & loco idoneis.

CALAMINARIS PRÆPARATIO.

℞. Lapidis Calaminaris electi . . . . . *Quantùm volueris.*

Candefactum in crucibulo, in aquâ Fœniculi extingue. Semel atque iterùm id repete. Supra porphiritem cum aquâ leviga, & in Trochiscos redige.

Sic præparantur { TUTHIA, PUMEX, &c.

CATECHU PURIFICATIO.

℞. Catechu selecti & contriti . . . . . *Quantùm volueris.*

In sufficienti quantitate aquæ calentis per aliquot horas infunde. Solutionem perfectam per setaceum cribrum trajice. Catechu per residentiam defecatum vaporet ad siccitatem.

CHELARUM CANCRORUM PRÆPARATIO.

℞. Chelarum nigrarum Cancrorum . . *Quantùm volueris.*

Aquâ fluviatili calente pluries in die renovatâ ablue, donec nullus in eis deprehendatur odor; tùm exsicca. Pulvera subtilissimè in mortario ferreo. Suprà porphyritem leviga, instillando aquam communem. Ubi Chelæ ori inditæ nullum sub dentibus stridorem edunt eas in Trochiscos redige.

Simili modo præparantur { CORALLA, MATER PERLARUM, OCULI CANCRORUM, OSTREARUM TESTÆ, PERLÆ seu MARGARITÆ, &c.

CORNU CERVI CALCINATIO.

℞. Cornu Cervi apices . . . . *Quot volueris.*

Igne violento ad albedinem, in ollâ fictili, apertâ, non vitratâ, combure. Tere in mortario. Suprà porphyritem leviga, instillando aquam, & in Trochiscos redige.

Sic calcinatur EBUR.

CORNU CERVI PHILOSOPHICA PRÆPARATIO.

℞. Cornu Cervi apices . . . . *Quot volueris.*

Coque in vase ritè obturato cum sufficienti quantitate aquæ communis, donec exterior pellicula scalpello facilè detrahatur. Hanc pelliculam & medullam extrahe, & apices sicca.

NOTA. In distillatione herbarum, Cornua Cervi philosophicè præparari possunt, si in collo Vesicæ suspendantur, donec friabilia evadant.

ESULÆ PRÆPARATIO.

℞. Corticis medii radicis Esulæ . . . . *Quantùm volueris.*

Per viginti quatuor horas in Aceto forti macera. Exime & sicca.

Simili modo præparantur radices HELLEBORI.

HYDRARGYRI PURIFICATIO.

℞. Hydrargyri . . . . *Quantùm volueris.*

In mortario vitreo cum Aceto Sale marino saturato, tere. Aqua largiori lava. Chartâ bibulâ absterge; dein leni calore sicca. Tandem per alutam trajice & serva.

LAPIDUM PRETIOSORUM PRÆPARATIO.

℞. Fragmentorum Lapidum pretiosorum. *Quantùm volueris.*

Aquâ ablue. In mortario ferreo crassè pulvera.

Suprà chartam pulverem expande; & Magnetis ope, Ferri particulas aufer. Tùm ſupra porphyritem in alkool leviga.

LAZULI PRÆPARATIO.

℞. Lapidis Lazuli . . . . *Quantùm vis*.

Candeſcat in crucibulo. Suprà porphyritem cum aquâ leviga, & in Trochiſcos redige.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

℞. Lumbricos terreſtres . . . . *Quot volueris*.

Mundentur à terrâ. Aquâ ablue. Rejectâ aquâ, cum Vino iterum ablue; & illico balneo maris exſicca. Siccos in vaſe vitreo accurate clauſo ſerva.

MARTIS LIMATURÆ PRÆPARATIO.

℞. Limaturæ Martis ope Magnetis à ſordibus mundatæ . . . . . . *Quantùm vis*.

Tere in mortario ferreo. Dein ſupra porphyritem ſine aquâ leviga ad alkool.

MELLIS DESPUMATIO.

℞. Mellis optimi . . . . *Quantùm volueris*.

Igni lento expone in vaſe idoneo donec ſpumeſcat: ſpumas ſupernatantes abſtrahe. Tùm ab igne remove. Per ſetaceum trajice & ſerva.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

℞. Millepedes viventes, coloris argentei . . . . *Quot volueris*.

Vino albo ſuffoca & ablue. Exſicca & ſerva.

RHEI TORREFACTIO.

℞. Rhei pulverati . . . . *Quantùm volueris*.

Mitte in patinam ferream. Impone igni mode-

rato,

rato, continuè ſpathâ movendo, donec fuſcum colorem acquiſiverit. Serva ad uſum.

Sic torreſiunt MYROBALANI, &c.

NITRI PURIFICATIO.

℞. Nitri tertiæ coctionis . . . . *Quantùm volueris.*

In aquâ limpidâ ſolve. Igne lento ad pelliculam craſſam vaporet. Tepidum liquorem filtra. Criſtallos cubicas (*Sal marinum*) rejice. Ad cryſtalliſationem repone, & Nitrum exime. Bis, terve proceſſum repete donec liquor cryſtallos cubicas dare neget. Tùm Nitrum Sale marino omninò ſpoliatum obtinebis.

NOTA. Reſiduum aquæ purificationis, AQUA MATER NITRI, vocatur.

OVORUM PUTAMINUM PRÆPARATIO.

℞. Putaminum Ovorum . . . . *Quantùm volueris.*

Cum aquâ leviter & diù conquaſſa. Aquâ plurimâ ferventi multoties ablue. Membranulas decantando rejice. Remanentia in fundo putamina pulvera; leviga, & in Trochiſcos redige.

SALIS MARINI DECREPITATIO.

℞. Salis marini . . . . *Quantùm volueris.*

Projice per vices in ollam fictilem, non vitratam, candentem. Vaſe cooperto decrepita.

SCILLÆ COCTIO, *ad Trochiſcos.*

℞. Scillas recentes, ablatis corticibus exterioribus & radiculis . . . . . *Quot volueris.*

Singulas paſtâ Tritici ſubactâ & fermentatâ involve. In clibano coque donec feſtucâ penetrari poſſint. Tùm ſingularum ſquamas, cruſtâ mundatas, demptis membranulis, pinſa & per ſetaceum trajice.

SCILLÆ EXSICCATIO.

℞. Scillæ ſquamas . . . . *Quot volueris.*

Filo trajice ita ut una aliam non attingat. In umbrâ & loco ſicco exſiccentur.

SERI LACTIS PRÆPARATIO.

℞. Lactis vaccini, vel alterius animalis ſani . . . . *Pintas ij.*

Inde vaſi idoneo. Incipiente ebullitione adde,

Cremoris Tartari pulverati . . . . . *Drachmam.*

Vas ab igne remove. Lac coagulatum cola. Colaturam Ovi albumine ſine ebullitione clarifica & per filtrum trajice.

SPONGIÆ PRÆPARATIO.

℞. Spongiæ nondum in uſum vocatæ, ab arenulis expurgatæ, & exſiccatæ . . . . *Quantùm volueris.*

Immerge Ceræ flavæ liquefactæ, dein prelo fortiter exprime. Refrigeratam exime & ſerva.

STYRACIS LIQUIDÆ PURIFICATIO.

℞. Styracis liquidæ . . . . *Quantùm volueris.*

Per ſetaceum trajice.

SUCCINI PRÆPARATIO.

℞. Succini . . . . *Quantùm volueris.*

Tere in mortario. Trajice per cribrum. Pollinem ſuprà porphyritem leviga, donec nullæ ſplendentes particulæ appareant.

SUCCORUM DEFECATIO.

℞. Herbarum recentium, Florum, aut Fructuum . . . . *Quantùm volueris.*

Contunde in mortario marmoreo, piſtillo ligneo; vel abrade, pro rei naturâ. Prelo exprime. Succum ſine per ſubſidentiam reſidere, limpidum decanta; vel trajice per manicam.

NOTA. I. Plantis minùs ſucculentis, ferventem aquam; viſcoſis, ignem moderatum adhibe.

II. Succi cum Saccharo vel Melle clarificandi vel coquendi; aut Unguentis & Empiaſtris admiſcendi, defecatione non indigent.

III. Succi acidi aut auſteri, uti *Acetoſæ*, *Citri*, *Cydoniorum*, *Mororum*, *Rubi idæi*, *&c.* Pro Syrupis parandis, in lagenis anguſti colli, ſuperaffuſo oleo, in loco frigido aſſerventur.

TEREBINTHINÆ COCTIO.

℞. Terebinthinæ venetæ . . . . *Quantùm volueris.*

Coque in ſufficienti quantitate aquæ communis, ad Colophoniæ duritiem. Exime & ſerva.

GUMMI TRAGACANTHI MUCAGO.

℞. Gummi Tragacanthi albi & puriſſimi . . . . *Quantùm volueris.*

Digere in Aquæ communis ſufficienti quantitate, donec perfectam ſolutionem & Mivæ conſiſtentiam acquiſiverit. Per cribrum ſetaceum trajice.

CLASSIS PRIMA.

DE OPERATIONIBUS GALENICIS.

ARTICULUS PRIMUS.

DE PTISANIS, DECOCTIS ET JUSCULIS.

OMnia hujus articuli remedia decocta ſunt ſive ebullita. Vix niſi per etymologiam differunt. Decoctum cum hordeo PTISANA vocatur; decoctum fortius, APOZEMA; decoctum ad injectiones CLYSTER, CLYSMA, vel ENEMA; decoctum cum jure, JUSCULUM; decoctum ad irrigandum partes, EMBROCHE; ad fovendum, FOTUS, ſeu FOMENTUM; Fotus autem ad ſtomachum EPITHEMA nuncupatur.

CANON. I. Vegetabilia recenter & modicè ſiccata (niſi recentia expetantur) antè coctionem incide & contunde.

II. Bulliant primò Cornua Cervi, Ligna, Cortices, Radices, &c. ſiccioris & durioris compagis; ſub finem coctionis adde Viſcoſa; tandem Aromatica & Glycyrrhizam raſam & contuſam, hæc enim diuturnâ ebullitione amarorem conciliat.

III. Decocta ſubſidendo depura; ſi turbida expetantur, hæc per ſtamen cola.

IV. Ptiſanas pro potu & affatim hauriendas, ſic para, ut coctione nimiâ nec lenteſcant, nec oculis aut palato diſpliceant.

PTISANÆ.

PTISANA COMMUNIS.

℞. Hordei integri & in aquâ calidâ loti . . . . *Uncias ij.*
Radicis Graminis mundatæ . . . . *Unciam.*

Coque in Aquæ communis *ſufficienti quantitate*, ad *Pintas viij*. ſub finem coctionis adde.

Glycyrrhizæ raſæ & contuſæ . . . . *Unciam* ß.

Decoctum refrigeratum decanta.

PTISANA ſeu DECOCTUM HORDEACEUM.

℞. Hordei integri, in aquâ calidâ loti . . . . *Unciam.*
Aquæ communis . . . . *Pintam* iß.

Coque ad *crepaturam* (*a*). Cola.

PTISANA PECTORALIS.

℞. Orizæ mundatæ & lotæ . . . . *Unciam.*

Coque ad crepaturam (*a*) in

Aquæ communis . . . . *Pintis vj.*

Tùm per horæ quadrantem infunde,

Radicis Althææ mundatæ & inciſæ . . . *Drachmas ij.*
Foliorum Capillorum Veneris, } *ana* . . . *Drachmam.*
Florum Tuſſilaginis, }
Papaveris rhœados . . . . *Drachmam* ß.
Glycyrrhizæ raſæ & contuſæ . . . . . . *Drachmas ij.*

Ptiſanam refrigeratam decanta.

DECOCTA.

DECOCTUM EMOLLIENS.

℞. Quatuor herbarum emollientium . . . . . *Uncias ij.*
Florum Chamæmeli, } *ana* . . . . *Unciam* ß.
Meliloti, }

Coque in Aquæ communis *ſufficienti quantitate* ad *Pintas ij*. Cola.

DECOCTUM LAXANS.

℞. Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . . *Unciam.*

(*a*) Id eſt ad perfectam mollitiem.

Salis Tartari . . . . *Scrupulos ij.*
Aquæ communis . . . . *Uncias xx.*

Bulliant igne leni ad quintæ partis consumptionem; sub finem coctionis, adde,

Seminum Anisi . . . . *Drachmam iß.*

Colaturam serva.

Decoctum seu Ptisana regia.

℞. Radicum Polypodii querni, } Cichorii, } *ana* . . . . *Unciam.*
Tamarindorum . . . . *Unciam ß.*
Aquæ communis . . . . *Pintas ij.*

Bulliant in vase figulino ad tertiæ partis consumptionem. In decocto fervent infunde per aliquot horas,

Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . *Unciam.*
Liquiritiæ rasæ & contusæ . . . . *Unciam ß.*
Foliorum Pimpinellæ . . . . *Drachmas ij.*

Decoctum refrigeratum cola.

Decoctum album Sydenhami.

℞. Cornu Cervi calcinati & levigati . . . *Drachmas iij*
Micæ Panis albissimi Lacte confecti . . *Unciam.*
Aquæ communis . . . . *Pintas iij.*

Bulliant ad tertiæ partis consumptionem. Cola, & edulcora cum sufficienti quantitate Sacchari albissimi. Adde Aquam Naphæ, vel Cinnamomi ad gratum saporem pro Medici præscripto.

Decoctum amarum.

℞. Radicis Gentianæ in taleolas sectæ . . . . *Drachmas ij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas iiij.*

Bulliant per horæ semi-quadrantem, tùm infunde,

Summitatum siccarum Centaurii min. } Cardui benedicti, } *ana. Drach. ij.*

Summitatum ſiccarum Scordii, } *ana* . . *Drachmas. ij.*
Flavedinis Citri recentis, }

Decoctum refrigeratum decanta.

DECOCTUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Radicum Bardanæ, } *ana* . . . . *Unciam.*
Oxylapathi, }
Aquæ communis . . . . *Pintas v.*

Bulliant in vaſe figulino vitrato ad *Pintas iiij.* tùm injice,

Radicis Raphani ruſticani inciſæ, } *ana. Unc. j.*
Foliorum recent. inciſ. Becabungæ, }
Barbareæ, }
Cochleariæ, }
Naſturtii aquatici, }
Trifolii fibrini. }

Vaſe accuratè obturato, ſine dococtum refrigeſcere. Percolato liquori adde Citrei Mali flavedinem & ſuccum.

DECOCTUM FORESTI.

℞. Hordei mundati . . . . *Unciam ß.*
Cicerum rubrorum . . . . *Unciam iß.*
Caricas pingues, } *ana* . . . . *Numero iiij.*
Jujubas, }
Seminum Malvæ, } *ana* . . . . *Drachmam.*
Althææ, }
Quatuor Seminum frigidorum majorum. *Drach. ij.*
Radicis Liquiritiæ . . . . *Drachmas iij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas iij.*

Præparata bulliant, ſuo ordine, ad tertiæ partis conſumptionem. Cola.

DECOCTUM SCORZONERÆ, COMPOSITUM.

℞. Radicum Scorzoneræ, } *ana* . . . . *Drachmas vj.*
Graminis, }
Hordei integri mundati . . . . *Unciam.*

Rasuræ Cornu Cervi, } ana . . . . . . *Unciam* ß.
Liquiritiæ rasæ & contusæ, }
Aquæ communis . . . . *Pintas iiij.*

Bulliant suo ordine, ad medias. Cola.

DECOCTUM SUDORIFERUM.

℞. Ligni Guajaci in scobem redacti . . . . . . *Unciam* ß.
Radicum Chinæ in taleolas sectæ, } *ana. Drach. vj.*
Sarsæparillæ minutim incisæ, }
Aquæ communis . . . . *Pintas iij.*

Digere per viginti quatuor horas, in vase terreo, vitrato, clauso. Dein coque ad *Pintas ij.* Sub finem adde,

Rasuræ ligni Sassafras, } *ana* . . . . *Drachmam.*
Glycyrrhizæ rasæ & contusæ, }

Post infusionem cola.

INFUSIO AROMATICA, *pro Fotu.*

℞. Summitatum Rosmarini, }
Rutæ, }
Salviæ, } *ana* . . . . . *Drachmas ij.*
Hyssopi, }
Lavandulæ, }
Florum Chamæmeli, }
Aquæ communis ferventis . . . . *Pintas iij.*

Digere vase clauso. In colaturâ solve,

Salis Ammoniaci . . . . *Drachmam.*

NOTA. Si loco *Aquæ communis*, *Vinum rubrum generosum* adhibeatur, erit VINUM AROMATICUM, *pro Fotu.*

JUSCULA.

JUSCULUM VIPERINUM.

℞. Viperam vivam.

Caput

Caput amputa; pellem exime; exentera. Incisam, additis sanguine, corde & hepate, coque igne leni per tres quatuorve horas in Aquæ communis sufficienti quantitate ad *Semi-pintam*. Cola.

Jusculum è Cancris fluviatilibus.

℞. Pulli gallinacei *dimidiam partem*; vel Carnis vitulinæ . . . . *Uncias xij.*
Cancros fluviatiles vivos in mortario marmoreo contusos . . . . *Numero vj.*

Coque igne leni in sufficienti quantitate Aquæ communis ad *Pintam*. Cola; leviter exprime.

Nota. His Jusculis, pro Medici jussu, variæ Plantæ & Radices adduntur.

Gelatina Cornu Cervi, *extemplò paranda.*

℞. Rasuræ Cornu Cervi . . . . *Libram ß.*
Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Vase figulino cooperto coque ad *Pintas ij.* Cola cum expressione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libram ß.*

Ovi Albumine clarifica. Coque igne leni ad Gelatinæ mollioris consistentiam. Sub finem, Flavedine Citri aromatiza. Repone in loco frigido ut in Gelatinam concrescat.

ARTICULUS SECUNDUS.

DE ACETIS, VINIS ET CEREVISIIS.

HÆc Remedia fermentationem passa, variorum Medicamentorum viribus per infusionem imprægnantur.

CANON. I. Vina generosa elige: eorum evaporationem cave.

II. Ingredientia omnia mundata, incisa, & contusa, simul infunde.

III. Herbæ sint modicè siccatæ, ni aliter præscribantur.

ACETA.

ACETUM ANTI-PESTILENTIALE.

℞. Summitatum recent. Absinthii majoris,
minoris,
Rosmarini,
Salviæ,
Menthæ,
Rutæ, } *ana. Unc.* iss.

Florum siccatorum Lavandulæ . . . . . *Uncias* ij.

Allii,
Acori veri,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, } *ana* . . . . *Drachmas* ij.

Aceti acerrimi . . . . *Pintas* viij.

Digere balneo arenæ in matratio ritè obturato per duodecim dies. Cola fortiter exprimendo. Filtra. Tùm adde,

Camphoræ in Spiritu Vini solutæ . . . *Unciam* ß.

Serva in lagenâ benè obturatâ.

ACETUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ . . . . *Drachmam.*

In mortario lapideo tere, affundendo

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Guttas* xx.

Adde,

Sacchari albi . . . . *Uncias* ij.

Diù simul tritis misce,

Aceti Vini fragrantis . . . . *Uncias* x.

ACETUM LITHARGYRATUM.

℞. Lithargyri aurei pulverati . . . . *Libram* ß.
Aceti acerrimi . . . . *Pintam.*

Coque simul in vase fictili ad quartæ partis consumptionem, tùm liquorem filtra, & serva.

NOTA. 1.° Misce Aceti lithargyrati *Drachmas ij*, cum Aquæ communis *Pintâ*; erit LIQUOR SATURNINUS.

NOTA. 2.° Non albescit Liquor, si paretur cum Aquâ stillatitiâ vel pluviali.

OXYCRATUM.

Fit ex unâ parte *Aceti Vini* & sex *Aquæ.*

ACETUM SCILLITICUM.

℞. Scillæ exsiccatæ . . . . *Libram* ß.
Aceti Vini acerrimi . . . . *Pintas* v.

Insolentur, in vase benè obturato, per quindecim dies. Acetum cola, fortiter exprimendo, filtra & serva.

Similili modo parantur ACETA { è FLORIBUS SAMBUCI, è ROSIS RUBRIS, è DRACUNCULO HORTENSI, &c.

VINA.

VINUM ABSINTHITES.

℞. Comarum exsiccatarum utriusque Absinthii . . . . *Uncias* ij.
Vini albi . . . . *Pintas* ij.

Macera, per viginti quatuor horas, in matratio obturato, cola cum expressione & filtra.

VINUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Radicum recentium & minutim incisarum
Raphani rusticani . . . . *Unciam* iß.

Foliorum recentium Cochleariæ,
Nasturtii aquatici,
Becabungæ,
Trifolii fibrini,
Lepidii.
Seminum Sinapi, } *ana Drach. vj.*
Salis Ammoniaci pulverati . . . . *Drachmam iß.*
Vini albi . . . . *Pintas vj.*

Herbas in mortario marmoreo contunde. Semen Sinapi tere cum aliquantulâ parte Vini. Omnia macerentur in vase idoneo ritè abturato, per aliquot dies. Cola cum expressione, & serva in lagenis benè obturatis.

VINUM EMETICUM.

℞. Croci metallorum . . . . *Unciam.*
Vini albi optimi . . . . *Pintam.*

Digere in vase vitreo ritè obturato, sæpiùs agitando, per aliquot dies, & simul serva ad usum.

CEREVISIÆ.

CEREVISIA ANTI-SCORBUTICA.

℞. Radicum Raphani rusticani . . . . . . *Uncias vj.*
Acetosæ pratensis . . . . . . *Uncias iij.*
Canellæ albæ . . . . *Unciam.*
Herbarum recentium Trifolii fibrini . *Uncias iiij*

Incisis & contusis macerentur in vase idoneo per aliquot dies in

Cerevisiæ mediæ & recentis . . . . . . *Pintis xxxx.*

CEREVISIA DIURETICA.

℞. Seminum Sinapi,
Baccarum Juniperi, } *ana* . . . . *Uncias iiij.*
Seminum Dauci sylvestris . . . . *Unciam iß.*
Foliorum Absinthii vulgaris . . . . . . *Unciam.*

Incisa & contusa, macerentur in vase idoneo, in

Cerevisiæ mediæ & recentis . . . . . *Pintis xxxx.*

ARTICULUS TERTIUS.

DE EXTRACTIS.

EXTRACTA, Decoctis & Infusis analoga sunt; nam pleraque ebullitione parantur, & evaporatione perficiuntur. Extractorum consistentia varia est pro eorum naturâ, alia enim ficciorem, alia molliorem exigunt.

CANON. I. Decocta vel Infusa, è quibus Extracta parantur, per subsidentiam vel colaturam depura.

II. Substantias gummosas, mucilaginosas, salinas, & saponaceas, Aquâ extrahe; oleosas verò & resinosas, Spiritûs Vini infusione.

III. Levi ebullitione in vasis figulinis & balneo maris vaporet Extractum, ne quid metallicum aut, nimio ignis gradu, odorem empireumaticum seu adustum contrahat.

IV. Ad evaporationem faciliorem vasa plana adhibe.

V. Extracta in vasis vitreatis reconde; quæ verò temporis lapsu duriora evadunt vesicis, Oleo vel liquore idoneo illitis, priùs involuta sint.

EXTRACTUM ABSINTHITES.

℞. Herbarum Absinthii recenter siccatarum *Quantùm vis.*

Bulliant in Aquæ communis sufficienti quantitate. Colatura fortiter expressa, igne lento, ad Mellis crassioris consistentiam vaporet.

Eodem modo parantur EXTRACTA Herbarum { AGRIMONIÆ, CENTAURII MINORIS, CARDUI BENEDICTI,

Fructuum COLOCYNTHIDIS,

Radicum { ENULÆ CAMPANÆ, GENTIANÆ, HELLEBORI NIGRI, LAPATHI, &c. }

EXTRACTUM MENYANTHES.

℞. Succi defecati foliorum Menyanthes . *Quantùm vis.*

Vaporet igne lento ad Mellis spissitudinem.

Eodem modo parantur EXTRACTA Herbarum { CICHORII, DENTIS LEONIS, FUMARIÆ, CICUTÆ, *cum succo non defecato.* }

EXTRACTUM RHEI.

℞. Rhei electi incisi . . . . *Quantùm vis.*

Affunde Aquæ ferventis quantum sufficit, digere balneo maris per duodecim circiter horas. Liquorem calentem cola cum expressione, & colaturam serva. Materiæ superstiti novam Aquæ ferventis quantitatem affunde. Digere ut supra. Cola calidè cum expressione forti.

Colaturas calentes mixtas trajice per manicam. Vaporent balneo maris ad debitam consistentiam.

Simili modo parantur EXTRACTA { CROCI, KINÆ-KINÆ. }

EXTRACTUM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi maturarum & recentium . . . . *Libras iiij.*

Contundantur & bulliant ad mollitiem in

Aquæ communis . . . . *Pintis viij.*

Liquor fervens exprimatur per manicam, coletur & balneo maris vaporet ad Extracti liquidi consistentiam.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . *Unciam.*
Turbith gummoſi,
Radicis Hellebori nigri,
Agarici albi & levis,
Rhabarbari electi,
Pulpæ Colocynthidis.
} *ana* . . . . . *Unciam* ß.

Inciſa & contuſa, digere balneo arenæ per duos treſve dies in cucurbitâ vitreâ, cum

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Pintis ij.*

Exprime fortiter. Vaporet ad Mellis conſiſtentiam. Tùm,

℞. Magma prioris Infuſionis

Digere per horas viginti quatuor, in Aquæ communis *Pintis ij*. Bulliant; unâ aut alterâ ebullitione factâ, cola cum expreſſione & filtra: vaporet ad Mellis conſiſtentiam. Dein,

℞. Extracta duo ſuprà dicta non refrigerata,
Aloës lucidæ pulveratæ . . . . *Drachmas vj.*

Miſce diligenter. Cùm refrixerint adde,

Scammonii ſubtiliter pulverati . . . . . *Drachmas vj.*
Extracti Croci . . . . *Scrupulum* ß.

Miſce iterùm exactè, & aromatiza cum

Oleorum eſſentialium Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Aniſi.
} *ana* . *Guttis iij.*

Malaxa aliquamdiù & ſerva.

NOTA. Si quis primam infuſionem diſtillare velit, extrahet Spiritum Vini.

Extractum Opii.

℞. Opii minutim incisi . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ pluvialis purissimæ . . . . *Pintas ij.*

Inde matratio vitreo. Igne graduato arenæ bulliant per duas horas. Liquor, colatus in vase figulino vitreato, vaporet ad Mellis consistentiam.

Intereà, magma prioris colaturæ levi calore exsicca; tùm, affuso Spiritu Vini ad eminentiam quatuor digitorum, per duodecim horas digere. Liquor colatus vaporet balneo mariæ ad Mellis consistentiam.

Tandem Extracta duo misce exactè, & balneo mariæ inspissa, donec Pilulæ efformari possint.

Extractum seu Sal Kinæ-kinæ *Comitis de Lagaray.*

℞. Corticis Peruviani conquassati . . . . *Uncias ij.*
Aquæ frigidæ . . . . *Pintas viiiß.*

Inde vasi vitreo. Macera per duos dies sæpe agitando. Filtra. Sine ebullitione vaporet ad *Pintam.* Frigidam filtra denuò, inde tribus aut quatuor faventinis lancibus. Balneo maris exsicca. Cultello squamatim abrade. Serva in vase optimè obturato.

ARTICULUS QUARTUS.

DE MELLITIS, SYRUPIS ET LOOCH.

In hoc articulo, Remedia liquida ex Melle vel Saccharo plerumquè condita, locantur. Quæ ex Melle Mellita, quæ verô ex Saccharo Syrupi vocantur.

Quædam alia Remedia cum Melle aut Saccharo, extemporè parantur: scilicet, Suppositorium, ano inserendum.

Emulsio, Lacti similis, ex seminibus oleosis, ut Amygdalis, &c. elicitur.

Looch

LOOCH vel ECLEGMA, seu LINCTUS sensim deglutitur.
JULEP seu JULAPIUM ex Aquâ & Syrupo paratur.
OLEOSACCHARUM vel ELEOSACCHARUM est Oleum stillatitium cum Saccharo mixtum.

CANON. I. Articuli primi tres priores Canones, huc revoca.

II. Syrupi non coquendi Saccharo purissimo indigent. Et ratione liquoris, duplum Sacchari pondus, balneo maris dissolvendum adhibe.

III. Syrupos cum Albumine clarifica.

IV. Syrupos è succis acidis aut austeris, in vase figulino vitreato confice & in lagenis serva.

V. Syrupi coctio cognoscitur dùm è cochleari, guttæ ultimæ non delabuntur sphericæ, sed elenchi formam referentes.

MELLITA.

MEL MERCURIALE.

℞. Succi Mercurialis, } ana . . . . *Partes æquales.*
Mellis optimi, }

Misce, coque. Despuma, & ad Syrupi consistentiam redige.

MEL ROSATUM.

℞. Petalorum Rosarum rubrarum recentium . . . . *Libras iij.*
Aquæ bullientis . . . . *Pintas xij.*

Digere per duodecim horas in vase terreo vitreato, cola & exprime. Parem Petalorum Rosarum quantitatem in colaturâ digere; idque tertiò repete. Ultimæ colaturæ ponderatæ, adde,

Mellis optimi . . . . *Parem quantit.*

Unicâ factâ ebullitione, cola, & ad Syrupi consistentiam coque.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Mellis optimi despumati . . . . *Libras ij.*
Aceti Vini optimi . . . . *Pintam.*

Coque igne lento, in vase fictili ad Syrupi consistentiam.

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Mellis optimi despumati . . . . *Libras ij.*
Aceti scillitici . . . . *Pintam.*

Coque ut Oxymel simplex.

HYDROMEL VINOSUM.

℞. Mellis optimi . . . . *Partem unam.*
Aquæ communis . . . . *Part. quinque.*

Bulliant igne lento. Despuma donec Ovum recens, crudum, injectum supernatet. Liquorem quiete depuratum dolio inditum, ad fermentationem repone. Dùm odorem vinosum acquisiverit, liquorem decapula & serva.

MEL VIOLACEUM.

℞. Florum integrorum & recentium Violarum . . . . *Libras ij.*
Aquæ calidæ . . . . *Pintas iiij.*

Digere per duodecim horas. Cola cum expressione. Adde Mellis optimi *Libras vj.* Coque. Despuma, & in Syrupi consistentiam redige.

SUPPOSITORIUM COMMUNE.

℞. Mellis . . . . *Drachmas iij.*
Salis marini . . . . *Drachmam ß.*

Coque ad spissitudinem, adde,

Saponis veneti minutim incisi . . . . . *Drachmam.*

Liquefacto, fiat Suppositorium.

SYRUPI SIMPLICES.

SYRUPUS DE CAPILLIS VENERIS.

℞. Adianti americani . . . . *Unciam.*
Aquæ Bullientis . . . . *Pintas vj.*

Digere per duas horas. Cola, adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Coque in Syrupum Aquâ Naphæ, si lubet, aromatizandum.

Eodem modo paratur SYRUPUS DE ABSINTHIO SIMPLEX.

SYRUPUS DE FARFARA.

℞. Florum Farfaræ recentium . . . . . . *Libras iij.*
Aquæ ferventis . . . . *Pintas xij.*

Digere per noctem. Manè factâ unâ aut alterâ ebullitione cola cum expressione.

In colaturâ, novam digestionem cum pari florum quantitate, & per idem temporis spatium repete. Cola & fortiter exprime. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij*

Clarifica. Coque in Syrupum.

Eodem modo paratur SYRUPUS DE NYMPHÆA. Cum petalis mundatis & marcidis.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO.

℞. Capitum Papaveris albi, maturorum, recentium & abjectis seminibus . . . . *Libras ij.*

Aquâ frigidâ ablue. Scinde minutim. Coque ad mollitiem in sufficienti quantitate Aquæ communis ad *Pintas vj*. Cola cum expressione. Decoctum clarifica. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Coque in Syrupum

Syrupus de Papavere erratico.

℞. Petalorum recentium Papaveris rhœados *Libram.*
Aquæ ferventis. . . . . *Pintas iij.*

In vaſe figulino vitreato digere per octo horas. Cola cum expreſſione.

Novam & æqualem petalorum quantitatem in colaturâ digere denuo. Cola cum expreſſione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Clarifica & coque in Syrupum.

Syrupus de Rosis pallidis.

℞. Petalorum Roſarum pallidarum . . . *Quantum ſatis,*

Ut vas figulinum repleatur. Quibus affunde Aquæ bullientis quantum vas capere poteſt. Ritè obtura. Stent in infuſione per viginti quatuor horas. Bulliant & colentur cum expreſſione. In colaturâ aliam Roſarum infuſionem ter quatervè eâdem methodo repete, donec petalorum color in infuſo intactus remaneat. Tandem poſtremæ colaturæ ponderatæ, adde Sacchari albi *parem quantitatem.* Clarifica. Coque in Syrupum.

Eodem modo paratur Syrupus de Floribus Persicis.

Syrupus de Rosis siccis.

℞. Roſarum rubrarum recenter ſiccatarum *Libram ß.*
Aquæ calentis . . . . *Pintas iiij.*

Digere per viginti quatuor horas. Bulliant. Cola cum expreſſione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiß.*

Clarifica. Coque in Syrupum.

Syrupus violaceus.

℞. Petalorum Violarum recentium mundatorum & contuſorum . . . . *Libram.*

Aquæ ferventis . . . . *Pintas ij.*

Stent in vaſe fictili vitreato & cooperto, donec refrigeſcant. Colaturæ mediocriter expreſſæ & ponderatæ, adde,

Sacchari albiſſimi pulverati, ratione liquoris . . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus Balneo maris.

Eodem modo ſit SYRUPUS È FLORIBUS TUNICÆ.

SYRUPUS DE KINA-KINA.

℞. Corticis Peruviani conquaſſati . . . . *Uncias vj.*
Vini rubri generoſi . . . . *Pintas ij.*

Digere vaſe clauſo, per octo dies, identidem agitando. Filtra. Adde,

Sacchari albi, ratione liquoris . . . . . *Duplum.*

Coque in Syrupum.

SYRUPUS DE STIBIO.

℞. Vitri Antimonii ſubtiliter pulverati . . *Unciam.*
Infunde in Vini albi generoſi . . . . . *Pintâ.*

Stet in infuſione per tres quatuorve dies, in vaſe vitreo, ſæpius agitando. Filtra, adde,

Sacchari albi, ratione liquoris . . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris.

SYRUPUS È SUCCO CICHORII.

℞. Succi Cichorii igne defecati, } *ana* . . *Partes æquales.*
Sacchari albi, }

Miſce. Clarifica. Coque in Syrupum.

Eodem modo parantur SYRUPI È SUCCO { BETONICÆ, BRASSICÆ RUBRÆ, FUMARIÆ, &c.

SYRUPUS È SUCCO CITRI.

℞. Succi Citri per ſubſidentiam defecati . . *Quantum vis.*
Sacchari albiſſimi, ratione liquoris . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus, in vaſe fictili, balneo maris.

Eodem modo parantur SYRUPI { EX ACETO VINI, È SUCCO FRUCTUUM BERBERIS, RIBIUM, CYDONIORUM, LIMONIUM, MORORUM, &c.

SYRUPUS È CORTICIBUS CITRI.

℞. Flavedinum Citri . . . . *Uncias vj.*
Aquæ ferventis . . . . *Pintas ij.*

Digere balneo maris, in vaſe clauſo, per duodecim horas. Cola. Adde,

Sacchari albiſſimi, ratione liquoris . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris. Refrigeratum aromatiza Spiritu Citri.

SYRUPUS DE HYSSOPO, SIMPLEX.

℞. Summitatum Hyſſopi mediocriter ſiccatarum . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas ij.*

Diſtilla balneo maris donec elicitæ ſint *Unciæ vj.* Balneo maris, ſolve in liquore diſtillato

Sacchari albiſſimi pulverati . . . . . . *Uncias xij.*

Fiat Syrupus. Tum,

℞. Diſtillationis reſiduum.

Cola. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Clarifica Albumine. Coque in Syrupum. Tandem Syrupos supra dictos ferè frigidos misce, & serva in lagenis optimè obturatis.

Simili modo parantur SYRUPI SIMPLICES { DE PRASSIO; DE MENTHA CRISPA; DE MELISSA, &c.

SYRUPUS DE RHAMNO CATHARTICO.

℞. Succi depurati baccarum maturarum Rhamni cathartici . . . . *Pintas vj.*
Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Coque in Syrupum.

SYRUPI COMPOSITI.

SYRUPUS ABSINTHITES, COMPOSITUS.

℞. Foliorum Absinthii pontici tenui-folii *Uncias viij.*
Rosarum rubrarum . . . . *Uncias ij.*
Spicæ Indicæ . . . . *Drachmas iij.*

Mixta, inde cucurbitæ vitreæ. Adde,

Vini optimi, veteris, } ana . . . . *Pintas ijß.*
Succi Cydoniorum, }

Digere in cucurbitâ vitreâ, clausâ, per viginti quatuor horas. Distilla igne arenæ donec elicitæ sint circiter *Unciæ vj.* Balneo maris dissolve, in liquore distillato,

Sacchari albissimi, ratione liquoris . . *Duplum.*

Fiat Syrupus. Tùm,

℞. Distillationis residuum.

Coque in vase terreo per horæ quadrantem. Cola cum expressione forti. Adde,

Sacchari albi . . . . *Uncias xx.*

Albumine clarifica. Igne moderato coque in Syrupum.

Tandem Syrupos refrigeratos misce.

Syrupus de Aceto cum Frambœsiis.

℞. Frambœsiarum maturarum . . . . . . *Uncias iiij.*
Aceti acerrimi . . . . *Pintam.*

Macera per viginti quatuor horas in vase vitreo. Cola. Adde, ratione liquoris,

Sacchari albissimi. . . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris.

Syrupus de Althæa Fernelii.

℞. Radicum Althææ recentium . . . . . *Uncias ij.*
Asparagi,
Graminis,
Liquiritiæ,
Passularum exacinatarum, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Cicerum rubrorum,
Cymarum Malvæ,
Althææ,
Parietariæ,
Foliorum Pimpinellæ minoris,
Plantaginis majoris,
Adianti nigri. } *ana* . *Unciam.*

Coque in sufficienti quantitate Aquæ fontanæ ad *Pintas vj.* In colaturâ adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Albumine clarifica. Coque in Syrupum.

Syrupus anti-scorbuticus.

℞. Foliorum virentium Cochleariæ,
Beccabungæ,
Nasturtii aquatici,
Radicis Raphani rusticani, } *ana Libram.*

Flavedinis

Flavedinis Aurantiorum amarorum . . . *Uncias ij.*
Cinnamomi . . . . *Unciam ß.*

Incifa & contufa inde cucurbitæ vitreæ. Affunde fta-tim

Vini albi generofi . . . . *Pintas iiij.*

Capitello protinùs adaptato & ritè obturato, macera per biduum. Balneo maris diftilla leni calore donec elicita fit liquoris fpirituofi & volatilis *Libra*. Fiat Syrupus, in vafe vitreo claufo, Balneo maris, cum

Sacchari albiffimi, ratione Liquoris . . *Duplo.*

Tum,

℞. Liquorem in cucurbitâ fuperftitem, co-latum cum forti expreffione, per refi-dentiam & decantationem depuratum,
Sacchari albi . . . . *Libras ij.*

Coque in Syrupum. Tepidum priori admifce.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicum Iridis florentinæ,
Helenii,
Rubiæ tinctorum,
Valerianæ fylveftris,
Leviftici,
Nardi indici, } *ana* . *Unciam ß.*
Cinnamomi . . . . *Unciam.*

Incifa & contufa inde cucurbitæ vitreæ. Affunde

Aquæ communis . . . . *Libras decem.*

Vafe tecto, ftent in digeftione per viginti horas. Tum adde,

Foliorum Artemifiæ, recentium . . . . *Uncias iiij.*
Herbarum Pulegii,
Calaminthæ, } *ana* . . . . . *Uncias ij.*

Herbarum Nepetæ,
Meliſſæ,
Majoranæ,
Marrubii albi,
Matricariæ, } *ana* . . . . . *Uncias ij.*

Seminum Aniſi,
Fœniculi,
Dauci ſylveſtris,
Rutæ. } *ana* . . . . *Unciam* ß.

Inciſa & contuſa digere per duodecim horas. Adaptato capitello, diſtilla donec elicita ſit liquoris *Pinta* in quâ diſſolve leni igne

Sacchari albiſſimi . . . . *Libras ij.*

Fiat Syrupus. Tùm,

℞. Quod in cucurbitâ ſupereſt,

Bulliat ad *Pintas iiij.* Cola cum expreſſione, adde,

Sacchari albi . . . . *Libras ij.*

Clarifica. Tum adde,

Mellis deſpumati . . . . *Uncias xij.*

Coque in Syrupum. Frigidum priori frigido immiſce.

Syrupus balsamicus de Tolu.

℞. Syrupi de Capillis Veneris, recens facti ac tepidi . . . . *Libram iß.*

Immiſce paulatim

Tincturæ Balſami Tolutani . . . . *Unciam.*

Agitatione mixturam perfice. In balneo maris detine uſque dùm ſit exhalatus ſpiritus. Serva in lagenis ritè obturatis.

Syrupus de Cichorio cum Rheo.

℞. Radicum Cichorii . . . . *Uncias iij.*

Radicum Apii,
Taraxaci,
Herbæ & Florum Cichorii. } *ana* . . . *Unciam.*

Omnia recentia, incisa & contusa, decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis ad *Pintas iij*: in colaturâ infunde

Rhei optimi incisi . . . . *Uncias vj.*

Bulliant leviter. Cola cum expressione. Per subsidentiam depura, & cum

Sacchari albi . . . . *Libris iiij.*

Coque in Syrupum.

Syrupus de Erysimo, Lobelii.

℞. Erysimi totius, recentis . . . . *Libras ij.*
Passularum exacinatarum,
Hordei integri,
Radicum recentium Helenii,
Tussilaginis,
Liquiritiæ rasæ & contusæ, } *ana Unc. ij.*
Herbarum Borraginis,
Cichorii,
Capillorum Veneris, } *ana* . *Unciam.*
Florum Borraginis,
Buglossi,
Violarum,
Anthos,
Stœchados, } *ana* . . . *Drachmas ij.*
Seminum Anisi . . . . *Drachmas vj.*

Incidenda incide, contundenda contunde. Coque in

Aquæ communis . . . . *Pintis vj.*

Ad medias. Cola cum expressione. Adde,

Succi Erysimi . . . . *Pintam ß.*

Sacchari albi . . . . *Libras iiß.*

Clarifica, tum adde,

Mellis deſpumati . . . . *Uncias xij.*

Coque, igne moderato, in Syrupum.

SYRUPUS HORDEATUS.

℞. Amygdalarum excorticat. dulcium . . . *Libram.*
amararum . *Uncias iij.*

Contunde in mortario marmoreo, piſtillo ligneo, ſenſim affundendo,

Decocti Hordei mundati . . . . *Libras ij.*

Cola cum expreſſione. Adde,

Sacchari albiſſimi pulverati, ratione liquoris . . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris; refrigerato adde,

Aquæ Naphæ . . . . *Uncias iij.*

Miſce.

SYRUPUS DE MENTHA, COMPOSITUS.

℞. Menthæ romanæ floreſcentis, recenter collectæ & inciſæ . . . . *Uncias xij.*
Cinnamomi,
Nucis Moſchatæ, contuſorum, } *ana* . *Drachmam.*
Decocti ex aliâ Menthæ quantitate, vaſe clauſo facti & valdè imprægnati . . . *Pintas iiiß.*

Digere per viginti quatuor horas in vaſe ritè clauſo. Diſtilla donec ſint elicitæ liquoris *Unciæ xij*, in quibus diſſolve leni igne

Sacchari puriſſimi, ratione liquoris . . *Duplum.*

Fiat Syrupus.

Liquorem in cucurbitâ ſuperſtitem cola cum expreſſione & ſerva, tum,

℞. Succci Cydoniorum . . . . *Uncias xxxvj.*
Roſarum rubrarum . . . . *Uncias ij.*

Digere per noctem. Mane ebullitione factâ, cola. Adde

Liquorem è diſtillatione ſuperſtitem,
Sacchari albi . . . . *Libras iiß.*

Clarifica. Coque in Syrupum, cum refrixerit priori etiam refrigerato immiſce & ſerva.

SYRUPUS DE KARABE.

℞. Opii puriſſimi minutim inciſi . . . . . *Scrupulos ij.*
Aquæ communis . . . . *Uncias xij.*

Inde vaſi vitreo. Digere ad Opii ſolutionem. Cola cum expreſſione forti. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libram.*

Clarifica. Coque in Syrupum craſſioris conſiſtentiæ. Syrupo refrigerato adde,

Spiritûs Succini . . . . *Scrupulos ij.*

Miſce. Serva in lagenis accuratè obturatis.

SYRUPUS DE PÆONIA.

℞. Radicis Pæoniæ maris recentis, } *ana* . . *Uncias ij.*
Raſuræ Guajaci, }
Buxi, } *ana* . . . . *Unciam.*
Viſci Quercini, }
Seminum Pæoniæ maris . . . . *Unciam ß.*
Herbarum recentium Betonicæ, } *ana* . *Unciam.*
Galegæ, }
Verbenæ, }
Hyſſopi } *ana* . . *Unciam ß.*
Florum Lavandulæ, }
Anthos, } *ana.* . . . . . . *Drachmas ij.*
Stœchados, }
Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Primò rasuras Guajaci, Buxi, cum Visco Quercino contuso infunde. Digere per viginti quatuor horas. Bulliant donec liquoris supersint *Pintæ iiiß*, tum cætera suo ordine adjice & bulliant ad medias. Cola cum expressione, adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiß*

Clarifica. Coque igne lento in Syrupum.

Syrupus de Pomis, solutivus.

℞. Succi per subsidentiam defecati Pomarum Curtipendularum, vel earum defectu Renetiarum. . . . . *Libras vß.*
Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . . *Uncias viij.*
Seminum Anisi . . . . *Drachmas vj.*
Croci . . . . *Drachmas ij.*

Digere per viginti quatuor horas. Cola cum expressione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Clarifica coque, igne lento, in Syrupum.

Syrupus de quinque radicibus aperientibus.

℞. Radicum recentium Apii, Asparagi, Fœniculi, Petroselini, Rusci, } *ana. Uncias iiij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Bulliant ad tertiæ partis consumptionem. Cola cum expressione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Clarifica. Coque in Syrupum.

Syrupus de Rosis pallidis cum Senna et Agarico.

℞. Infusionis Rosarum pallidarum clarificatæ, (vide confectionem Syrupi de Rosis pallidis) . . . . *Pintas ix.*
Foliorum Sennæ mundatorum . . . . *Uncias viij.*
Agarici electi & incisi . . . . *Uncias iiij.*
Seminum Anisi contusorum . . . . . . *Unciam ß.*
Zinziberis contusi . . . . *Drachmas ij.*

Digere per viginti quatuor horas. Cola cum expressione; residuum bulliat cum Aquæ communis *Pintis iiij*, ad medias. Colaturam priori admisce. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Clarifica. Coque in Syrupum.

Syrupus de Symphyto.

℞. Radicis Symphyti majoris . . . . *Uncias ij.*
Foliorum Symphyti majoris, Prunellæ, } *ana* . . . *Uncias iiij.*
Plantaginis, Pimpinellæ, Centinodiæ, } *ana* . . . . . . *Uncias ij.*
Florum siccatorum Tussilaginis, Rosarum rubrarum, } *ana Unciam.*

Mundatis & incisis omnibus affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas vij.*

Coque leviter bulliendo. Cola cum expressione. Adde

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Clarifica. Coque in Syrupum.

Syrupus de Stœchade.

℞. Florum Stœchados arabicæ . . . . . . *Uncias iiij.*
Foliorum Thymi, Betonicæ, Calaminthæ vulgaris, Origani, } *ana. Unciam iß.*

Foliorum Salviæ,
Florum Rofmarini, } *ana* . . . . . *Unciam* ß.
Seminum Rutæ,
Pæoniæ maris,
Fœniculi, } *ana* . . . . *Drachmas iij.*
Sacchari albiffimi . . . . *Libras iij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Incidenda incifa, contundenda contufa, inde (excepto Saccharo) cucurbitæ vitreæ. Digere per quatuor horas. Capitello impofito balneo maris diftilla ufque dùm prolectæ fint liquoris circiter *Unciæ xij*; tùm,

℞. Liquorem anteà diftillatum,
Radicum Zinziberis,
Calami aromatici,
Cinnamomi, } *ana* . . . *Drachmas ij.*

Digere per noctem. Cola. Adde,

Sacchari pulverati, ratione liquoris . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris:

Aliundè,

℞. Materiam in cucurbitâ refiduam.

Bulliat ufque dùm fuperfint liquoris *Pintæ iij*. Cola cum expreffione. Adde,

Sacchari . . . . *Reliquum.*

Clarifica. Coque in Syrupum. Tandem utrumque refrigeratum mifce, & ferva in lagenis exactè obturatis.

SYRUPUS VERMIFUGUS.

℞. Prunorum damafcenorum . . . . *Uncias viij.*
Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . *Uncias vj.*
Seminum Contra . . . . *Uncias iij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas iiijß.*

Coque

Coque Pruna per horæ quadrantem. Infunde cætera per viginti quatuor horas. Cola cum expreſſione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libram iß.*

Clariſica. Coque in Syrupum.

ECLEGMATA, *extemplò paranda.*

LOOCH ALBUM.

℞. Amygdalas excorticatas dulces . . . . *Numero xvj.*
amaras . . . *Numero ij.*
Sacchari albiſſimi . . . . *Unciam.*

Contunde in mortario marmoreo, piſtillo ligneo, ſenſim affundendo,

Aquæ communis . . . . *Uncias iiij.*

Lac emulſum cola. Tùm,

℞. Gummi Tragacanthi ſubtiliſſime triti . *Grana xvj.*

Senſim, (initio guttatim,) affunde Lac amygdalinum ſuprà emulſum, identidem agitando in mortario marmoreo, ad mucilaginis ſpiſſitudinem. Sub finem adde,

Olei Amygdalarum dulcium . . . . *Unciam.*
Aquæ Naphæ . . . . *Drachmas ij.*

Miſce.

LOOCH EX OVO.

℞. Vitellum Ovi recentis,
Olei Amygdalarum dulcium . . . . . . *Uncias ij.*

Identidem agita, piſtillo ligneo, donec coeant in pultem; tum ſenſim adde continuè agitando,

Syrupi de Althæâ Fernelii . . . . *Unciam.*
Decocti Hordei . . . . *Uncias ij.*
Aquæ Naphæ . . . . *Drachmas ij.*

APPENDIX.

EMULSIO COMMUNIS.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum, } ana Drach. ij.
Seminum quatuor frigidorum majorum ; }
Sacchari albi . . . . Unciam ß.

Simul in mortario marmoreo contunde ſenſim affundendo,

Aquæ communis . . . . Pintam.

Cola fortiter exprimendo.

ARTICULUS QUINTUS.

DE ROB, CONSERVIS ET CONDITIS.

ROB ſeu GELATINÆ aut MIVÆ ſunt ſucci cum Saccharo ad Mellis conſiſtentiam cocti.

Plantarum partes cum Saccharo coctæ, ſi contuſæ ſint & in pulpam redactæ, CONSERVÆ dicuntur, ſi vero integræ CONDITA nominantur.

CANON. I. Rob & Conſervæ plantarum partes jam perfectas requirunt; ad Condita verò, radices juniores tempore verno evulſas, flores nondùm explicitos, fructus ante maturitatem perfectam lectos adhibe; niſi aliter præſcribatur.

II. Galatinæ ritè coctæ ſunt, ſi gutta in marmor delapſa & refrigerata glutinis conſiſtentiam acquirat; aut ſi digiti Gelatinâ inquinati quaſi conglutinentur.

III. Conſervæ, ut plurimùm triplum Sacchari pondus, ratione Remedii, requirunt.

IV. Pulpas per cribrum ſetaceum inverſum, convexæ partis cochlearis ope, trajice.

ROB ET GELATINÆ.

Rob seu Gelatina Ribium.

℞. Ribium maturarum, à petiolis mundatarum . . . . *Libras iiij.*

Bulliant in vase figulino vitreato, cum Aquæ communis tantillo. Sæpissimè agita, donec fructus rugas contrahant: tùm cola sine ullâ expressione. Succo limpidissimo adde,

Sacchari albi . . . . *Libras ij.*

Coque igne satis valido ad consistentiam Gelatinæ.

Rob Sambuci.

℞. Succi baccarum maturarum Sambuci optimè depurati . . . . *Libras iij.*

Bulliant in vase figulino igne lento ad medias, tum adde,

Sacchari albi . . . . *Uncias iiij.*

Coque in Rob consistentiam.

Miva seu Gelatina Cydoniorum.

℞. Cydoniorum maturescentium . . . . . *Libras viij.*

Absterge cortices. Semina & eorum involucra abjice. Incide in frusta. Affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas xx.*

Bulliant ad medias. Cola cum expressione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras vj.*

Clarifica. Igne lento ad Gelatinæ consistentiam coque.

Sic paratur Gelatina è Pomis, &c.

CONSERVÆ ET CONDITA.

CONSERVA ABSINTHII.

℞. Summitatum floridarum Absinthii . . . *Libram.*

Contunde in mortario marmoreo sensim addendo,

Sacchari albi pulverati . . . . *Libram.*

Tum,

℞. Sacchari albi . . . . *Libras ij.*
Aquæ communis . . . . *Quantum satis.*

Coque ad Tabellarum consistentiam. Adjice Absinthium cum Saccharo contusum. Misce. Serva in vase vitreato.

Simili modo parantur CONSERVÆ FLORUM { ANTHOS, BETONICÆ, CALENDULÆ, LILII CONVALLIUM. PÆONIÆ, PRIMULÆ VERIS, ROSARUM RUBRARUM, exungulatarum, SALVIÆ, TUNICÆ, VIOLARUM, &c.

CONSERVA COCHLEARIÆ.

℞. Foliorum recentium Cochleariæ . . . . *Uncias ij.*
Sacchari Albissimi . . . . *Uncias vj.*

Simul pinsando, misce in mortario marmoreo donec conservæ formam acquisiverint.

Simili modo parantur CONSERVÆ { ACETOSÆ, OXYTRIPHYLLI, &c.

CORTICES CITRI CONDITI.

℞. Corticum Malorum Citreorum recentium *Libram* ß.
Aquæ communis . . . . *Quant. suffic.*

Macera ad mollitiem. Bulliant. Cola. Cortices in vase dispone, tùm,

℞. Colaturam supra dictam,
Sacchari albi . . . . *Libram.*

Clarifica. Coque ad Syrupi spissioris consistentiam. Super Cortices coctos affunde. Post triduum decanta. Denuo coque ad debitam consistentiam; idque toties repete donec Syrupus perfectam consistentiam servet.

Eodem modo condiuntur CORTICES AURANTIORUM,
RADICES { ANGELICÆ, ENULÆ CAMPANÆ, ERYNGII, &c.

PULPA CYDONIORUM CONDITA.

℞. Cydoniorum à seminibus & eorum involucris mundatorum. . . . . *Libras vj.*

Coque ad mollitiem in Aquæ communis *sufficienti quantitate*. Per cribrum trajice. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras ij.*

Coque ad Conservæ consistentiam.

PULPA CYNOSBATI CONDITA.

℞. Cynosbati fructus ab arillis & lanugine mundatos . . . . *Quantum vol.*

Cum tantillo Vini rubri macera ad mollitiem in vase idoneo: contunde. Per cribrum trajice. Adde,

Sacchari albi pulverati, ratione Pulpæ . *Duplum.*

Misce.

ARTICULUS SEXTUS.

DE PULVERIBUS.

PUlveres ſunt vel ſimplices vel compoſiti. Pulveres ſimplices quære in Præparationibus. Compoſiti verò, diverſa ſimplicia ſimul unita continent & SPECIES præcipuè dicuntur dùm aliis compoſitionibus inſerviunt. In duas ſeries dividuntur, ALTERANTES nempè & PURGANTES.

CANON. I. Carioſa, exeſa, immunda, corrupta, uti & plantarum ſtipites abjice.

II. Omnia in mortario æneo, piſtillo ferreo tuſa, per cribrum ſetaceum vel ſericeum trajice; Mineralia tamen, Lapides & Terras, porphyrio leviga.

III. Gummi aliaque tritu difficilia admiſce ſiccioribus, ut poſt pulverationem per cribrum unà trajiciantur.

IV. Quæ ſeorſim ſunt pulveranda quaſdam cautiones exigunt.

Roſas, *Crocum*, & ſimilia, modicè & leni admodum calore in chartaceo ſacco ſicca.

Colocynthidem, *Euphorbium*, *Cantharides*, *Helleborum album* & ſimilia guttis aliquot Aquæ idoneæ inſperge, ne polline volatili Artifex lædatur. *Euphorbium* terendo, nares obtura.

Gummi Tragacanthum & *Arabicum* ſiccata calefacto mortario tunde.

V. Pulveres ex Aromaticis parati, exiguâ quantitate & in vaſis vitreis probè obturatis ſerventur.

PULVERES ALTERANTES.

PULVIS ARI BIRKMANNI.

℞. Radicum ſiccat. Ari . . . . *Uncias ij.*
Acori veri,
Pimpinellæ albæ, } . . *Unciam.*

Lapidum Cancrorum præparatorum, } ana Drach. iij.
Cinnamomi,
Salis Abſinthii, } ana . . . . Drachmam.
Juniperi,
Sacchari albi . . . . Unciam.

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS ARTHRITICUS AMARUS.

℞. Radicum Gentianæ, } ana . Partes æquales.
Centaurii majoris,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Foliorum Chamædryos,
Chamæpityos,
Summitatum Centaurii minoris,

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS CACHECTICUS.

℞. Croci Martis aperientis . . . . Unciam.
Cinnamomi acuti . . . . Drachmas ij.
Sacchari albi . . . . Uncias iij.

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS COMITISSÆ DE KENTH.

℞. Chelarum Cancrorum præparatorum . Uncias iij.
Oculorum Cancrorum fluviatilium, } ana Unciam.
Coralli rubri,
Succini albi præparati,
Cornu Cervi philoſophicè præparati,
Viperarum ſiccatarum, } ana . . Unciam ß.
Margaritarum præparatarum,
Lapidis Bezoardici orientalis,

Fiat ex omnibus Pulvis.

Pulvis de Guttetta.

℞. Radicum Pæoniæ maris,
Dictamni albi,
Seminum Pæoniæ maris,
Visci quercini,
Ungulæ Alcis, } ana. . . . . *Unciam ß.*
Seminum Atriplicis sativæ . . . . *Drachmas ij.*
Cranii humani radulâ abrasi . . . . . *Drachmas iij.*
Coralli rubri præparati,
Succini præparati,
Cornu Cervi abrasi, non præparati, } *ana Drach. iß.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

Pulvis Haly.

℞. Seminum Papaveris albi . . . . *Scrupulos v.*
Quatuor frigidorum majorum,
Cydoniorum, } *ana* . *Scrupul. iiiß.*
Portulacæ,
Althææ,
Malvæ,
Gummi Tragacanthi,
Arabici,
Amyli,
Oculorum Cancrorum præparatorum,
Liquiritiæ rasæ, } *ana* . *Drachmam ß.*
Sacchari albi . . . . *Drachmas x.*

Fiat ex omnibus Pulvis, extemplò parandus.

Pulvis stomachicus.

℞. Radicum Angelicæ,
Foliorum Menthæ crispæ,
Cinnamomi, } *ana* . . . . *Unciam ß.*

Macis

Macis . . . . *Drachmas ij.*
Balauſtiorum, } *ana* . . . . *Scrupulos ij.*
Piperis longi, }
Sacchari albi . . . . *Uncias ij.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum Majoranæ, } *ana* . . . . . . *Drachmam iſs.*
Salviæ,
Betonicæ,
Pulegii, } *ana* . . . . *Drachmam ſs.*
Florum Lilii convallium,
Radicum Pyrethri,
Hellebori albi,

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS TEMPERANS, STAHLI.

℞. Tartari vitriolati, } *ana* . . . . *Drachmas iij.*
Nitri puriſſimi, }
Cinnabaris factitiæ præparatæ . . . . . *Scrupulos ij.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVERES PURGANTES.

CARYOCOSTINUM.

℞. Caryophyllorum, } *ana* . . . . *Drachmas ij.*
Coſti arabici,
Zinziberis,
Cumini,
Hermodactylorum, } *ana* . . . . *Unciam ſs.*
Scammonii. }

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS DE TRIBUS, CORNACHINI.

℞. Antimonii diaphoretici, } ana . . . . . *Partes æquales.*
Cremoris Tartari,
Scammonii,

Fiat ex omnibus Pulvis.

SPECIES DIACARTHAMI.

℞. Medullæ ſeminum Carthami, } ana . . *Unciam.*
Hermodactylorum,
Turbith electi . . . . *Unciam iß.*
Scammonii . . . . *Drachmas vj.*
Radicum Liquiritiæ raſæ, } ana . . . . *Unciam ß.*
Zinziberis,
Sacchari albiſſimi . . . . *Uncias ij.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

SPECIES HIERÆ-PICRÆ, GALENI.

℞. Cinnamomi, } ana . . . . *Drachmam.*
Ligni Aloës,
Radicum Aſari
Spicæ Nardi,
Maſtiches,
Croci vaſtinienſis,

Aloës lucidæ . . . . *Uncias ij. & Scrupulos ij.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS HYDRAGOGUS.

℞. Cremoris Tartari . . . . *Unciam.*
Radicum Jalappæ, } ana . . . . *Drachmas ij.*
Turbith,
Mechoacannæ,
Hermodactylorum,
Scammonii.

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS VERMIFUGUS.

℞. Corallinæ levigatæ,		
Seminum Contra,		
Abſinthii majoris,		
Tanaceti		
Foliorum Scordii,	*ana* . . .	*Partes æquales.*
Sennæ,		
Rhei electi,		
Radicum Filicis maris,		

Fiat ex omnibus Pulvis, quotannis renovandus.

ARTICULUS SEPTIMUS.

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI inter Pulverum & Tabellarum claſſes medium videntur tenere locum; ſunt enim medicamenta ſicca pleraque ex Pulveribus, Pulpæ vel Mucilaginis ope, in *Orbiculos*, ſeu *Placentulas*, aut *parvos Panes* efformata.

Trochiſci ad fumigationes PASTILLI nuncupantur.

CANON. I. Pulverum Canones huc refer.

II. Ut ritè ſiccentur Trochiſci, imponantur cribro inverſo, in loco umbroſo, libero & perflabili, & ſæpiùs verſentur.

III. Trochiſcos in vaſis vitreis ſiccè ſerva.

TROCHISCI ALBI, RHASIS.

℞. Ceruſſæ venetæ Aquâ Roſarum lotæ .	*Drachmas x.*
Sarcocollæ	*Drachmas iij.*
Amyli	*Drachmas ij.*
Gummi Arabici, Tragacanthi, } *ana*	*Drachmam.*
Camphoræ	*Drachmam ß.*

Fiat ex omnibus Pulvis. Et cum Albumine ex Aquâ Rosarum quassato Trochiscos finge.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Radicum recentium Tussilaginis . . . . *Libram.*
Aquæ communis . . . . *Pintas xvj.*

Coque. Cola. Adde,

Extracti Glycyrrhizæ incisæ . . . . *Libras xij.*

Glycyrrhizâ solutâ, cola iterum. Evaporationem perge ad Extracti solidi consistentiam. Demùm adde,

Olei essentialis Anisi . . . . *Unciam.*

Trochiscos finge oblongos.

TROCHISCI DE CATECHU.

℞. Catechu purificati . . . . *Unciam ß.*
Sacchari albi . . . . *Unciam iß.*
Caryophyllorum . . . . *Scrupulum.*
Mucilaginis Gummi Tragacanthi in Aquâ Rosarum soluti . . . . *Quant. satis.*

Formentur Trochisci.

NOTA. Adde, si lubet, guttas aliquot Olei essentialis Cinnamomi, Corticum Citri, vel Tincturæ Ambari.

TROCHISCI ESCHARROTICI DE MINIO.

℞. Minii . . . . *Unciam ß.*
Mercurii sublimati corrosivi . . . . . . *Unciam.*
Micæ Panis exsiccati pulveratæ . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ Rosarum . . . . *Suffic. quantit.*

In mortario marmoreo, pistillo ligneo pinsa. Trochiscos finge oblongos.

TOCHISCI SCILLITICI.

℞. Scillæ coctæ . . . . *Uncias xij.*
Radicum Dictamni albi pulveratarum . *Libram ß.*

In massam redige. Fiant Trochisci.

PASTILLI.

℞. Carbonum Salicis . . . . *Libram.*
Styracis calamitæ . . . . *Uncias ij.*
Benzoïni . . . . *Unciam.*
Caryophyllorum . . . . *Unciam ß.*
Labdani . . . . *Drachmas vj.*

Fiat ex omnibus Pulvis, & cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Gummi Tragacanti Aquâ Roſarum extractæ fiant Paſtilli ſeu *Baccilli pyramidati.*

ARTICULUS OCTAVUS.

DE ELECTUARIIS.

ELECTUARIA vel ELECTARIA è Medicamentis electis conficiuntur, duplicis ſunt generis, ſolida nempè, & mollioris conſiſtentiæ.

PARAGRAPHUS PRIMUS.

DE ELECTUARIIS SOLIDIS.

Electuaria ſolida vel Paſtæ ſunt, vel Tabellæ. TABELLÆ ſiccæ, duræ, ſolidæ, in *morſulos* variæ figuræ formatæ, ſigillo ut plurimùm notantur. PASTÆ autem conſiſtentiam non itâ duram aut ſiccam obtinent, ſed in maſſam ſpiſſam & ſectilem parantur.

CANON. I. Ea quæ de Pulveribus dicta ſunt, Canonem quartum Articuli quinti, & Canones ſecundum & tertium Paragraphi ſequentis, conſule.

II. Sacchari ad Tabellarum conſiſtentiam coctionem peractam cognoſces, ſi in Sacchiro Spumatorium immerſum dein remotum & ſufflatum, floccos exhibeat.

III. Tabellas ut efformes, maſſam calentem, liquidam, ſupra marmor Oleo perfuſum diſtribue; vel ſupra chartam Oleo imbutam, aut tabellam Amylo vel Saccharo pulverato aſperſam, cylindro ligneo extende.

IV. Tabellas in hypocauſto ſicca. In loco ſicco & in thecis aptè obturatis ſerva.

PASTÆ ET TABELLÆ.

PASTA DE ALTHÆA.

℞. Radicis Althææ recentis in taleolas diſſectæ *Uncias iiij.*

Bulliant in Aquæ fontanæ *Pintis vj*, ad dimidiæ partis conſumptionem, in colaturâ ſolve,

Gummi ſenegalenſis albiſſimi, } ana . . *Libras ij.*
Sacchari albiſſimi,

Cola. Vaporet igne lento ad Extracti ſpiſſitudinem, aſſidue ſpathulâ movendo. Ab igne remove: agita multùm & celeriter ut albus color concilietur. Tunc inſperge identidem Albumina ſex Ovorum recentium, in ſpumam redacta cum Aquæ Naphæ odoratiſſimæ *Unciâ ß*, maſſam inſpiſſa lento calore, agitatione perpetuâ, uſque dùm manui admota non adhæreat. Tandem Paſtam Amyli pulvere inſperſam ſerva.

TABELLÆ DE ALTHÆA.

℞. Pulpæ radicum Althææ coctarum. . . . *Uncias iij.*
Sacchari albi pulverati . . . . *Quantum ſatis.*

Fiat maſſa in Tabellas efformanda.

TABELLÆ BECHICÆ.

℞. Sacchari albiſſimi . . . . *Libras iij.*
Ireos florentinæ, } ana . . . . *Unciam.*
Gummi arabici,
Glycyrrhizæ . . . . *Unciam iß.*

Fiat ex omnibus Pulvis & cum Mucagine Gummi Tragacanthi in Aquâ Naphæ ſoluti ſubige in maſſam è quâ formentur Tabellæ.

TABELLÆ DE MANNA, *extemporè parandæ.*

℞. Mannæ electæ . . . . *Unciam.*

Sacchari albi in Aquâ ſoluti & ad Tabellarum conſiſtentiam cocti *Uncias iij*, in ſaccharo adhuc calenti liquetur Manna, & datâ ebullitione alterâ fiant Tabellæ.

TABELLÆ MARTIALES D. *Deſſault.*

℞. Croci Martis rore majali parati,
Coralli rubri,
Oculorum Cancrorum,
Millepedum præparatorum,
Benzoïni amygdaloïdes, } *ana*. *Unciam ß.*
Cinnamomi pulverati . . . . *Drachmas iij.*
Sacchari albiſſimi . . . . *Uncias viij.*

Miſce cum ſufficienti quantitate Gummi Tragacanthi in Aquâ ſoluti. Subige in maſſam è quâ formentur Tabellæ ponderis *Drachmarum ij.*

TABELLÆ DE SULPHURE, SIMPLICES.

℞. Florum Sulphuris . . . . *Drachmas iiij.*
Sacchari albi . . . . *Uncias iiij.*

Saccharo in Aquâ Roſarum ſoluto & ad Tabellarum conſiſtentiam cocto Flores Sulphuris admiſce. Ex maſſâ ſubactâ Tabellas finge.

TABELLÆ DIASULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris . . . . *Unciam iß.*
Benzoïni . . . . *Scrupulum.*
Radicum Enulæ campanæ,
Liquiritiæ,
Amyli, } *ana* . . . *Drachmas iij.*
Ireos florentinæ pulveratorum . . . . . *Drachmam.*
Sacchari albiſſimi . . . . *Uncias xij.*

Fiat ex omnibus Pulvis & cum ſufficienti quantitate Mucaginis Gummi Tragacanthi, fiat maſſa è quâ formentur Tabellæ.

TABELLÆ ANTIMONIALES.

℞. Amygdalarum dulcium . . . . *Unciam.*
Cinnamomi acuti . . . . *Drachmas ij.*
Cardamomi minoris . . . . *Drachmam ß.*
Antimonii crudi præparati . . . . *Unciam ß.*
Sacchari albi . . . . *Uncias vij.*

Fiat ex omnibus pulvis, & cum ſufficienti quantitate Mucaginis Gummi Tragacanthi in Aquâ Roſarum ſoluti fiat maſſa è quâ formentur Tabellæ ponderis *Drachmarum ij.*

TROCHISCI SEDANTES.

℞. Capitum Papaveris albi ſiccatorum, minutim inciſorum, rejectis ſeminibus . *Unciam iß.*
Florum Tuſſilaginis ſiccatorum . . . . *Unciam.*
Hordei mundati . . . . *Unciam ß.*

Coque in Aquæ communis *Pintis v*, ad *Pintas iij*, Cola. In colaturâ ſolve,

Extracti Glycyrrhizæ,
Gummi Tragacanthi,
Sacchari albi, } *ana* . . . . . . *Uncias v.*

Cola iterum. Vaporationem perge ad Extracti ſolidi conſiſtentiam; & Trochiſcos finge.

PARAGRAPHUS SECUNDUS.

DE ELECTUARIIS MOLLIORIS CONSISTENTIÆ.

ELECTUARIA ad Mellis conſiſtentiam parata, ANTIDOTA dicuntur ſi contra venena ſint compoſita, CONFECTIONES quæ modo perfectiori confecta creduntur. OPIATA cum Opio parata olim dicebantur; hodie Electuaris omnibus *Opiatæ* nomen impropriè datur.

CANON.

CANON. I. Quæ de Decoctis & Pulveribus parandis dicta sunt, ad Electuaria quoque pertinent.

II. Gummi, ſuccos ſpiſſatos, aliaque pulveratu difficilia, in parcâ quantitate idonei liquoris ſolve.

III. Ut Tabellarum & Electuarii miſtura fit æquabilis & uniformis, ſtrenuè materiam agita, & identidem paulatim Pulveres per cribrum trajiciendos adjice.

IV. Electuaria aſtringentia, ut ea quæ pulpas fructuum recipiunt, parcâ quantitate aſſerva. Pulparum humiditas ſuperflua leni igne vaporet ante miſturam.

V. In Electuariis parandis ſæpiſſime triplum Mellis ratione Pulveris, adhibetur.

VI. Electuariiia, Opiata præſertim & Antidota, ſi areſcant, Vino Canarino vel Hydromelite emolliantur, ut in priſtinam reducantur conſiſtentiam.

ELECTUARIA SOLUTIVA.

CASSIA COCTA.

℞. Pulpæ Caſſiæ . . . . *Libram ß.*
Syrupi Violacei . . . . *Uncias iiij.*

Coque balneo maris ad Mellis conſiſtentiam. Refrigeratam ſerva.

DIACATHOLICUM AD ENEMATA.

℞. Foliorum Malvæ . . . . *Uncias ij.*
Florum Chamæmeli . . . . *Unciam iß.*
Radicum Bryoniæ . . . . *Uncias v.*
Polypodii . . . . *Uncias iiij.*

Coque in ſufficienti quantitate Aquæ communis. Cola. Adde, Mellis crudi *Libras viiß.* Cola iterum. Ad conſiſtentiam ſpiſſam coque. Adde,

Pulpæ Prunorum . . . . *Libram iß.*
Foliorum Sennæ pulveratorum . . . . *Uncias x.*
Seminum Aniſi pulveratorum . . . . . *Uncias ij.*
Fœniculi pulveratorum . . . *Unciam.*

Fiat Electuarium.

Diacatholicum cum Rheo.

℞. Radicum Polypodii querni recentium & contuſarum . . . . *Uncias viij.*

Bulliant in Aquæ fontanæ *Pintis vj*, ad medias, in Decocto colato & expreſſo ſolve,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Coque in Syrupum ſpiſſum. Admiſce,

Pulparum Caſſiæ, Tamarindorum, adjectâ ſuperioris Decocti portiunculâ extractarum & probè evaporatarum, } *ana Unc. v.*

Dilutis, adde ſequentia pulverata,

Foliorum Sennæ . . . . *Uncias iiij.*
Mechoacannæ, Rhei electi, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Liquiritiæ raſæ . . . . *Unciam.*
Seminum Aniſi, Fœniculi dulcis, } *ana.* . . . . *Unciam ß.*
Cinnamomi . . . . *Drachmas ij.*

Fiat Electuarium.

Diaphœnicum.

℞. Pulpæ Dactylorum in Aceto maceratorum, ritè evaporatæ . . . . *Uncias xij.*
Mellis optimi depurati . . . . *Libram iß.*

Permixtis, adde Pulveres ſequentes,

Turbith electi . . . . *Uncias iiij.*
Amygdalarum dulcium excorticatarum . *Uncias ij.*
Scammonii . . . . *Unciam iß.*

Santali citrini,
Radicum Galangæ,
Zinziberis,
Foliorum Rutæ ſiccatorum,
Piperis longi,
Cinnamomi acuti,
Macis,
Seminum Aniſi,
Fœniculi dulcis,
Dauci noſtratis, } *ana* . . . *Drachmas ij.*

Fiat Electuarium.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Myrobalanorum citrinarum . . . . *Uncias iiij.*
chebularum,
indarum,
Radicum Polypodii recentium,
Pulpæ Colocynthidis inciſæ, } *ana* . *Uncias iij.*
Abſinthii vulgaris,
Thymi, } *ana* . . . . *Unciam.*
Roſarum rubrarum . . . . *Unciam ß.*
Foliorum Sennæ mundatorum,
Agarici albi & levis,
Rhei electi,
Epithymi, } *ana* . *Uncias ij.*
Seri Lactis præparati . . . . *Quantum ſatis.*

Bulliant & coquantur ſuo ordine. Cola cum expreſſione. Adde,

Succi Fumariæ depurati . . . . *Pintam iß.*
Sacchari albi,
Mellis deſpumati, } *ana* . . . . *Libram iß.*

Coque ad Mellis conſiſtentiam. Cola iterum. Adde,

Pulparum ritè evaporatarum Prunorum,
Caſſiæ, } *ana Unc. iiij.*

Pulparum ritè evaporatarum Uvarum passarum, Tamarindorum,	ana.	*Unc. iiij.*
Mannæ electæ purissimæ	. . . .	*Uncias iij.*

Dilutis, adde sequentia pulverata,

Foliorum Sennæ mundatorum	. . . . .	*Uncias iij.*
Agarici albissimi, Rhei electi, Scammoni,	*ana*	*Unciam iß.*
Cinnamomi	. . . .	*Unciam ß.*
Zinziberis	. . . .	*Drachmas iij.*
Seminum Fumariæ, Fœniculi, Anisi, Spicæ Nardi indicæ,	*ana*	*Unciam ß.*

Fiat Electuarium.

Electuarium Hieræ-picræ, Galeni.

℞. Specierum Hieræ-picræ	. . . .	*Quantum vol.*

Cum Mellis despumati *triplo* fiat Electuarium.

Electuarium lenitivum.

℞. Foliorum Sennæ	. . . .	*Uncias iiij.*
Glycyrrhizæ	. . . .	*Uncias ij.*
Seminum Coriandri	. . . .	*Unciam.*
Aquæ bullientis	. . . .	*Pintas iij.*

Digere per noctem in vase clauso. Cola cum expressione. Adde,

Sacchari albi	. . . .	*Libras iiß.*

Coque ad Syrupi consistentiam. Adde,

Pulparum rite evaporatarum Prunorum,		*Uncias xij.*
Cassiæ, Tamarind.	*ana*	*Uncias vj.*

Fiat Electuarium.

ANTIDOTA, CONFECTIONES ET OPIATÆ.

DIASCORDIUM, FRACASTORIS.

℞. Foliorum Scordii recenter ſiccatorum, } ana Unciam.
Roſarum rubrarum exungulatarum, }
Boli armenæ . . . . Uncias ij.
Radicum Biſtortæ
Gentianæ,
Tormentillæ,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Dictamni cretici,
Seminum Acetoſæ,
Styracis calamitæ,
Gummi Arabici ſplendentis,
Galbani puri, } ana . . Unciam ß.
Opii nitidi,
Zinziberis,
Piperis longi, } ana . . . . Drachmas ij.
Omnia pulverata miſceantur cum,
Mellis deſpumati . . . . Libris ij.
Fiat Electuarium.

THERIACA, ANDROMACHI.

℞. Trochiſcorum ſcilliticorum . . . . . . Uncias vj.
Carnis viperinæ, probè exſiccatæ,
Piperis longi,
Opii nitidi, } ana. Uncias iij.
Opobalſami,
Cinnamomi acuti, } ana . . . . Drachm. xiij.
Roſarum rubrarum,
Iridis florentinæ,
Succi Glycyrrhiſæ condenſati,
Seminum Buniadis,
Cimarum Scordii,
Agarici albi & levis, } ana . Unciam iß.

Ingredients	Dose
Myrrhæ Trogloditicæ, Croci, Seminum Cardamomi minoris, Caſſiæ ligneæ, Spicæ Nardi indicæ,	*ana . Unciam.*
Junci odorati, Coſti arabici,	*ana . . . . Drachmas vij.*
Radicum Valerianæ hortenſis, Acori veri,	*ana. . . Drachmas. vj*
Gentianæ, Mei Athamantici, Spicæ Nardi celticæ, Polii montani, Cimarum Chamædryos, Chamæpithyos, Hyperici Baccarum Juniperi, Seminum Ammeos, Aniſi, Fœniculi, Seſeleos maſſilienſis, Thlaſpios, Terræ Lemniæ, Chalcitidis factitiæ, Succi Acaciæ veræ, Hypociſtidis, Styracis calamitæ, Gummi Arabici, Sagapeni,	*ana . Unciam ß*
Thuris maſculi, Piperis nigri, Foliorum Dictamni cretici, Calaminthæ vulgaris, Praſſii albi, Malabathri,	*ana . Drachmas vj.*
Stœchados arabicæ, Radicum Pentaphylli,	*ana . . . . Drachmas vj.*

Radicum Rhapontici,
Zinziberis,
Seminum Petroſelini macedonici,
Terebinthinæ chiæ, } *ana. Drachmas. vj.*

Ligni Aloës,
Corticum ligni Saſſafras,
Foliorum Majoranæ,
Mari veri,
Radicum Aſari,
Maſtiches, } *ana . . . . Drachmam.*

Radicum Ariſtolochiæ tenuis,
Summitatum Centaurii minoris,
Seminum Dauci cretici,
Galbani puri,
Opopanacis,
Bituminis judaïci,
Caſtorei, } *ana . Drachmas ij.*

Mellis optimi deſpumati . . . . *Libras xß.*

Omnia, exceptis Terebinthinâ, Opobalſamo & Chalcitide, in tenuiſſimum pulverem redigantur & cum Melle miſceantur: ſub finem adde Chalcitidem in pauco Vini ſolutam, Terebinthinam & Opobalſamum. Miſce, fiat Electuarium.

CONFECTIO ALKERMES.

℞. Santali citrini . . . . *Unciam.*
Cinnamomi . . . . *Unciam jß.*

Coſti arabici,
Vanillæ,
Coccinellæ, } *ana . . . . Drachmam jß.*

Radicis Galangæ minoris,
Seminum Cardamomi minoris,
Macis, } *ana . . Drachmam ß.*

Omnia pulverata miſceantur cum,

Syrupi Kermeſini . . . . *Librâ.*

Fiat Electuarium cui admiſce,

Foliorum Auri . . . . *Scrupulum.*

CONFECTIO HYACINTHINA.

℞. Hyacinthorum præparatorum, } *ana* . . *Drachmas ij.*
Terræ Catechu , }
Coralli rubri præparati; }
Boli Armenæ , } *ana* . . . *Unciam.*
Santali citrini , }
Cinnamomi , }
Radicum Tormentillæ , }
Contrayervæ, }
Angelicæ, }
Foliorum Dictamni , } *ana* . . . *Unciam ß.*
Rosarum rubrarum , }
Croci , }
Myrrhæ Trogloditicæ , }
Caryophyllorum aromaticorum . . . . *Drachmam.*

Omnia pulverata misceantur cum ,

Syrupi de floribus Tunicæ , ... *Librâ.*
Mellis narbonensis . . . . *Unciis ij.*

Fiat Electuarium. Cui admisce ,

Foliorum Argenti . . . . *Scrupulos ij.*

DENTIFRICIUM.

℞. Lapidis Pumicis , }
Aluminis usti , }
Oculorum Cancrorum , } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Coccinellæ , }
Sanguinis Draconis , }
Ireos florentinæ , }
Cremoris Tartari , ... *Unciam.*

Omnia pulverata subtiliter misce cum ,

Mellis narbonensis . . . . *Suffic. quantit.*

Electuario probè facto adde odoris gratiâ ,

Olei

Olei eſſentialis Caryophyllorum . . . . *Scrupulos ij.*

Miſce.

ARTICULUS NONUS.

DE PILULIS.

PILULÆ ſeu PARVÆ PILÆ, aut CATAPOTIA Electuariis duriores, ſufficientem requirunt conſiſtentiam, ut poſſint pro Medici præſcripto in ſpherulas efformari.

CANON. I. Canones pro parandis Pulveribus datos conſule.

II. Gummi & ſuccos ſpiſſatos liquore idoneo priùs emollias. Pulveres ſenſim injice, maſſam ſtrenuè tundendo ut æquabilis evadat.

III. Ne Pilularum maſſæ glutinoſiores digitis adhæreant, pulvere Glycyrrhizæ aſpergantur, vel digitis Oleo amygdalino imbutis tractentur.

IV. Maſſas Pilularum in veſicis Oleo oblitis, ſerva.

PILULÆ ALUMINOSÆ.

℞. Aluminis rupei . . . . *Uncias iiij.*
Sanguinis Draconis . . . . *Drachmas ij.*

Omnia tenuiſſime pulverata miſce cum,

Mucaginis Tragacanthi . . . . *Suffic. quantit.*

Fiant Pilulæ *xij* ex quâque *Drachmâ.*

PILULÆ BALSAMICÆ, MORTONI.

℞. Millepedum præparatorum . . . . . . *Drachmas vj.*
Gummi Ammoniaci electi . . . . *Drachmas iij.*
Florum Benzoïni . . . . *Drachmas ij.*
Croci optimi, } *ana* . . . . . *Scrupulum.*
Balſami peruviani ſicci, }
Balſami Sulphuris aniſati . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat maſſa pilularis ſecundum Canones.

PILULÆ BALSAMICÆ, STAHLI.

℞. Gummi Hederæ, }
Juniperi, electorum, } ana . . Uncias iiß.
Myrrhæ electæ, }
Aloës foccotrinæ, } ana . . . . Uncias ij.
Extracti Abſinthii, }
Menyanthes, } ana . . . { Unciam & Drac. vij.
Cardui benedicti, }
Fumariæ, }
Hellebori nigri, } ana . . . . Drachmas v.
Rhei, }
Terebinthinæ . . . . Unciam.

Fiant Pilulæ ponderis *unius Grani.*

PILULÆ BENEDICTÆ, FULLERI.

℞. Aloës lucidæ . . . . Unciam ß.
Affæ fetidæ, }
Galbani, } ana . . . . Drachmam.
Myrrhæ, }
Foliorum Sennæ . . . . Drachmas ij.
Salis Martis . . . . Drachmas vj.
Croci, }
Macis, } ana . . . . Drachmam ß.
Olei Succini . . . . Guttas xxxx.
Syrupi de Artemiſiâ . . . . Suffic. quantit.

Fiat maſſa pilularis.

PILULÆ COCCIÆ, RHASIS.

℞. Aloës ſoccotrinæ, }
Scammonii, } ana . . . . Uncias ij.
Fructus Colocynthidis . . . . Unciam.
Olei Caryophyllorum aromaticorum . . Drachmas ij.
Syrupi de Rhamno cathartico . . . . Suffic. quantit.

Fiat maſſa pilularis.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO.

℞. Corticis radicum Cynoglossi siccati, }
Opii thebaïci, } *ana Unciam ß.*
Seminum Hyoſciami albi, }
Myrrhæ electæ . . . . *Drachmas vj.*
Thuris maſculi . . . . *Drachmas v.*
Croci, } *ana* . . . . *Drachmas ij.*
Styracis calamitæ, }
Caryophyllorum aromatic. } *ana* . . . . *Drachmam.*
Caſtorei, }
Mellis roſati . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat maſſa pilularis.

PILULÆ HYSTERICÆ.

℞. Gummi Ammoniaci, }
Galbani, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Sagapeni, }
Myrrhæ, }
Aſſæ fetidæ, } *ana* . . . . *Drachmas iij.*
Caſtorei, }
Gummi Opopanacis . . . . *Unciam.*
Olei Succini . . . . *Scrupulum.*
Theriacæ . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat maſſa, ſecundum Canones.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Mercurii è Cinnabari redivivi, }
Scammonii, } *ana.* . *Unciam.*
Jalappæ, }
Cremoris Tartari . . . . *Unciam ß.*
Syrupi de Capillis Veneris . . . . *Suffic. quantit.*

Mercurium perfecte extingue in mortario marmoreo cum Cremore Tartari & pauco Vini. Dein adde paulatim cætera pulverata, cum Syrupo. Fiat massa exactè miscendo, diù & fortiter tundendo.

Pilulæ Ruffi.

℞. Aloës lucidæ . . . . *Uncias ij.*
Myrrhæ . . . . *Unciam.*
Croci . . . . *Unciam ß.*

Seorsim pulvera, & cum sufficienti quantitate Vini generosi massam forma pilularem.

Pilulæ saponaceæ.

℞. Saponis albi optimi . . . . *Uncias iiij.*
Liquiritiæ pulveratæ . . . . *Unciam ß.*

Fiat massa, addendo, si opus sit, aliquantulum Syrupi de Althæâ.

Pilulæ scilliticæ.

℞. Scillæ recentis,
Gummi Ammoniaci electi, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Millepedum,
Saponis albi purissimi . . . . *Unciam.*
Balsami de Copaïbâ . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat massa, secundùm Canones.

Pilulæ stomachicæ.

℞. Aloës optimæ . . . . *Drachmas vj.*
Masticles,
Rosarum rubrarum, } *ana* . . . . *Drachmas ij.*
Syrupi absinthites . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat massa pilularis.

PILULÆ TARTAREÆ, BONTII.

℞. Aloës lucidæ . . . . *Drachmas iij.*
Tartari vitriolati . . . . *Drachmam ß.*
Gummi Ammoniaci . . . . *Unciam iß.*
Aceti scillitici . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat massa, secundùm Canones.

PILULÆ TEREBINTHINATÆ.

℞. Succi Liquiritiæ,
Rhei,
Masticheṣ,
Boli Armenæ,
Olibani,
Succini præparati,
Ossis Sæpiæ,
} *ana* . . . . *Drachmas ij.*
Terebinthinæ chiæ . . . . *Quant. suffic.*

Fiat massa pilularis.

ARTICULUS DECIMUS.

DE OLEIS, BALSAMIS, UNGUENTIS ET EMPLASTRIS.

OMnia hujus Articuli Remedia pinguia sunt, & consistentiâ aut nomine tenùs discrepant. Ex Oleo, Cerâ, Butyro, Adipe, Axungiâ aut Sebo, Resinis, &c. conficiuntur. Omissis Oleis & Balsamis naturalibus quæ in primâ Pharmacopœæ parte recensentur, de artificialibus Galenicis solum acturi sumus.

OLEA SIMPLICIA è seminibus emulsivis, & præsertim *Olivis* contusis preloque expositis eliciuntur. OLEA verò COMPOSITA infusione aut decoctione parantur;

BALSAMA ſunt Olea virtute balſamicâ imprægnata.

LINIMENTA litui inſerviunt, conſiſtentiam inter Balſama & Unguenta mediam expoſcunt.

UNGUENTA ab ungendo dicta, Linimentis ſpiſſiora, Ceratis molliora ſunt.

CERATA è Cerâ facta mediam inter Unguenta & Emplaſtra conſiſtentiam deſiderant.

EMPLASTRA, magis ſolida & dura, in *Magdaleones* ſeu cylindros efformantur.

SPARADRAPA ſunt telæ Emplaſtro ex utrâque ſuperficie illitæ.

CEREI vernaculè *Bougies* ſunt ſparadrapa ad urethræ morbos accommodata & in teretem formam torſa.

Huc referri poſſunt CATAPLASMATA & SINAPISMI, Remedia topica Emplaſtrorum modo applicanda.

CANON. I. Olea per expreſſionem torculari exprime, & quantum fieri poteſt ſine igne.

II. Quoad Decocta & Infuſiones, pulverationes & Pulverum incorporationes, vide, ſuis locis, Canones hùc pertinentes.

III. Pro Unciâ Olei, Ceræ Semi-drachmam ad Linimentum dabis; Drachmas duas ad Unguentum.

IIII. Cùm Emplaſtra & Unguenta pleraque, Aquæ communis admiſtionem poſtulent, ad humiditatis conſumptionem ea igne lento coque.

V. Plumbi præparationes cum oleoſis & pinguibus coque primò: ſub finem Gummi & Pulveres immiſce.

VI. Emplaſtra & Unguenta cocta, piſtillo ligneo, vel ſpathulâ agita donec refrixerint.

VII. Manibus Aquâ madidis vel Oleo illitis, Emplaſtra frigore nondum indurata, in magdaleones redige.

PARAGRAPHUS PRIMUS.

DE OLEIS ET BALSAMIS.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

℞. Amygdalarum dulcium ſiccatarum non rancidarum . . . . *Quantùm vis.*

Tunde in mortario marmoreo, piſtillo ligneo. Sacco cannabino aut cilicio include. Torculari fortiter exprime. Oleum ſerva in vaſe idoneo.

Simili modo eliciuntur OLEA AMYGDALARUM AMARARUM;
Seminum PAPAVERIS ALBI,
LINI,
HYOSCIAMI,
CANNABIS, &c.

OLEUM ANISI.

℞. Seminum Aniſi mundatorum & aptè contuſorum . . . . *Quantum vis.*

Supra cribrum inverſum extende. Cooperta vapori Aquæ ferventis per horæ ſemiquadrantem expone ut penitùs humeſcant. Sacco denſo include. Prelo calido promptè ac fortiter exprime.

Simili modo eliciuntur OLEA ſeminum ANETHI, CUMINI, CARVI, FŒNICULI, NUCIS MOSCHATÆ, &c.

OLEUM seu BUTYRUM CACAO.

℞. Fructuum Cacao . . . . *Quantum vol.*

Leviter in ſartagine ferrea torrefactos & à cortice mundatos, in mortario ferreo calido contunde. Tum in ſufficienti quantitate Aquæ communis bulliant donec Oleum ſupernatet. Aquâ refrigeratâ, Oleum concretum collige. Balneo maris in Aquâ multoties liquefac ut albeſcat.

Eodem modo elicitur OLEUM è BACCIS LAURI, *ſed ſine torrefactione fructuum.*

OLEUM OVORUM.

℞. Ova recentia ad duritiem elixa . . . . . *Quot volueris.*

Vitellos comminutos in ſartagine, igne moderato, continuè ſpathulâ agitando, aſſa donec Oleum exſudare incipiat. Tunc, ſacculo cannabino incluſos, prelo calido promptè exprime.

OLEA PER INFUSIONEM ET DECOCTIONEM.

OLEUM DE CASTOREO.

℞. Caſtorei optimi minutim inciſi . . . . *Unciam.*
Vini rubri . . . . *Uncias iij.*
Olei Olivarum . . . . *Uncias xij.*

Inde cucurbitæ vitreæ coopertæ. Digere balneo maris per viginti quatuor horas ſæpe agitando; tunc humiditas vaporet balneo maris. Oleum ſerva in lagenâ ritè obturatâ, Caſtoreo in fundo remanente.

OLEUM DE CATELLIS.

℞. Catellos recens natos & necatos . . . . *Numero iij.*
Conjice in,
Olei Olivarum . . . . *Libris iij.*
Vini generoſi albi . . . . *Unciis iiij.*

Coque igne lento ad oſſium compaginis ſeparationem. Cola cum expreſſione. Colaturæ calenti adde,

Summitatum

Summitatum ſiccatarum & inciſarum Origani, Serpilli, Pulegii, Hyperici, Majoranæ, } *ana . . . Uncias ij.*

Inſolentur per quindecim dies vaſe clauſo. Cola cum expreſſione, per ſubſidentiam & decantationem depura, & ſerva.

OLEUM DE EUPHORBIO.

℞. Euphorbii pulverati . . . . *Drachm. xiij.*
Olei Olivarum . . . . *Libram.*

Liquefac igne lento. Cola & ſerva.

OLEUM DE HYPERICO.

℞. Florum Hyperici leviter contuſorum . *Libram.*
Olei Olivarum . . . . *Libras ij.*
Vini rubri . . . . *Pintam.*

Macera per tres dies. Coque igne lento ad humiditatis conſumptionem. Cola cum expreſſione. Novam eâdem methodo infunde Florum & Vini quantitatem. Idque ter repete. Per ſubſidentiam & decantationem defeca. Adde,

Terebinthinæ claræ . . . . *Libram iß.*

Repone ad uſum.

OLEUM DE LUMBRICIS.

℞. Lumbricorum terreſtrium recentium . *Libras ij.*

Mundentur à terrâ. Aquâ pluries ablue. Rejectâ aquâ, conjice in,

Vini albi . . . . *Uncias iiij.*
Olei Olivarum . . . . *Libras ij.*

Bulliant igne lento ad Vini conſumptionem. Oleum

cola, per ſubſidentiam & decantationem depura. Serva in lagenis obturatis.

OLEUM DE MUCAGINIBUS.

℞. Radicum Althææ recentium in taleolas ſectarum . . . . *Uncias viij.*
Seminum integrarum Fœnugreci, Lini, } *ana* . *Uncias iiij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas v.*

Bulliant igne leni ad radicum mollitiem. Cola cum expreſſione, adde,

Olei Olivarum . . . . *Libras ij.*

Coque igne moderato ad humiditatis ferè totam evaporationem. Cola ſine expreſſione. Per ſubſidentiam & decantationem depura.

OLEUM IRINUM.

℞. Radicum ireos noſtratis . . . . *Libram.*
Florum Ireos noſtratis . . . . *Libram ß.*
Olei Olivarum . . . . *Libras ij.*

In Oleo radices contuſas digere per viginti quatuor horas. Cola cum expreſſione. Vaporet humiditas. Flores in Colaturâ digere per duodecim horas. Cola, iterum vaporet humiditas, dein per ſubſidentiam & decantationem depura & ſerva.

OLEUM ROSATUM.

℞. Roſarum pallidarum recentium cum calycibus leviter contuſarum . . . . . . *Libras iiij.*
Olei Olivarum . . . . *Libras x.*

Leni balnei maris calore in vaſe clauſo digere. Cola cum expreſſione. Novas eâdem methodo digere Roſas, idque ter repete. Leniſſimo calore vaporet humiditas. Per ſubſidentiam & decantationem defeca. Serva in lagenis bene obturatis.

NOTA. Ut oleum rubrum habeas, radicis Anchusæ ope, tinge.

Eodem modo parantur Olea
- è floribus CHAMÆMELI,
  - GENISTÆ,
  - KEIRI,
  - LILIORUM ALBORUM,
  - MELILOTI,
  - NYMPHÆÆ ALBÆ.
  - SAMBUCI,
  - VIOLARUM,
- è comis florentibus ABROTANI,
  - ABSINTHII,
  - ANETHI,
  - HYOSCIAMI,
  - MAJORANÆ,
  - MENTHÆ,
  - ROSMARINI,
  - RUTÆ,
- è fructibus SOLANI, &c.

OLEUM DE SCARABÆIS.

℞. Proscarabæorum . . . . *Libram* ß.
Olei Laurini . . . . *Libram.*

Proscarabæos quassa & in Oleo Laurino infunde. Post aliquot dies leni calore vaporet humiditas. Cola cum expressione; per subsidentiam & decantationem depura & serva.

BALSAMA.

BALSAMUM LUCATELLI.

℞. Ceræ citrinæ . . . . *Uncias iiij.*
Olei Olivarum, Terebinthinæ claræ, } *ana* . . . . *Uncias viij.*

Liquefac igne leni. Ab igne remove. Adde,

Olei Hyperici recentis . . . . *Uncias ij.*
Balsami peruviani . . . . *Unciam iß.*
Santali rubri pulverati . . . . *Unciam.*

Misce & agita donec refrixerint.

BALSAMUM VIRIDE, METENSIUM.

℞. Viridis Æris subtilissime triti . . . . *Drachmas iij.*

Vitrioli albi . . . . *Drachmam iß.*

Tere in mortario ſenſim immittendo,

Olei Lini expreſſi, } *ana.* . . . . *Uncias vj.*
Olivarum, }
Laurini . . . . *Unciam.*
Terebinthinæ claræ . . . . *Uncias ij.*

Simul aliquandiù digerantur, dein permiſce,

Aloës Soccotrinæ pulveratæ . . . . . . *Drachmas ij.*
Oleorum ſtillatit. baccarum Junniperi . *Unciam ß.*
Caryophillorum . . . *Drachmam.*

Et factum erit Balſamum.

BALSAMUM TRANQUILLANS.

℞. Foliorum Stramonii,
Solani officinarum,
Phytolaccæ,
Belladonæ,
Mandragoræ,
Nicotianæ,
Hyoſcyami nigri,
Papaveris albi,
nigri, } *ana* . . *Uncias iiij.*

Summitatum recentium Roſmarini,
Salviæ,
Rutæ,
Abſinthii utriuſque,
Hyſſopi,
Lavandulæ,
Thymi,
Majoranæ,
Coſti hortenſis,
Menthæ,
Sambuci,
Hyperici,
Perſicariæ, } *ana Unciam.*

Bufones . . . . *Numero v.*

Herbas inodoras concide minutim, injice in

Olei Olivarum . . . . *Libras vj.*

Coque leviter. Herbis coctis, Bufones vivi in Oleum coquantur. Cola. Adde Herbas fragrantes concisas. Digere balneo maris per duodecim horas. Cola iterum. Per subsidentiam & decantationem defeca. Serva ad usum.

PARAGRAPHUS SECUNDUS.
DE UNGUENTIS ET CERATIS.

Unguentum album, Rhasis.

℞. Olei rosati . . . . *Libram.*
Ceræ albæ, } *ana* . . . . *Uncias iiij.*
Sevi ovini, }

Simul liquatis, adde,

Cerussæ præparatæ . . . . *Libram ß.*

Misce. Agita donec perfrixerint.

Nota. Camphoratum fiet, si singulis Unguenti libris, Camphoræ in Spiritûs Vini modico solutæ Drachma immisceatur.

Unguentum *vulgò dictum* Balsamum Arcei.

℞. Terebinthinæ claræ, } *ana* . . . . *Unciam iß.*
Gummi Elemi, }
Sevi hircini . . . . *Uncias ij.*
Axungiæ Porci recentis . . . . *Unciam.*

Simul liquentur. Cola. Agita donec refrixerint.

Unguentum de Althæa.

℞. Olei de Mucaginibus . . . . *Libram iß.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias vj.*
Picis albæ . . . . *Uncias iij.*
Terebinthinæ claræ . . . . *Unciam iß.*

Simul liquentur, ab igne remove & agita donec refrixerint.

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Olei Olivarum . . . . *Libram iß.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias vj.*
Terebinthinæ claræ . . . . *Uncias ij.*
Picis albæ, } ana . . . . *Unciam iß.*
Coloponiæ, }
Olibani, } ana . . . . *Unciam.*
Mastiches, }
Croci pulverati . . . . *Drachmam.*

Cera, Pix, Colophonia liquentur. Ab igne semotis adde Terebinthinam. Agita donec spissescere incipiant. Tum Olibanum, Mastichem pulverata & Crocum immisce. Fiat Unguentum.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Æruginis . . . . *Uncias v.*
Aluminis crudi . . . . *Unciam.*
Mellis puri . . . . *Uncias xiiij.*
Aceti Vini acerrimi . . . . *Uncias vij.*

Bulliant simul ad Unguenti consistentiam.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Picis albæ, }
navalis, } *ana* . . . . *Uncias vj.*
Ceræ flavæ, }
Olei Olivarum . . . . *Libram iß.*

Omnibus simul liquentur. Cola. Serva ad usum.

UNGUENTUM CITRINUM.

℞. Mercurii crudi purificati . . . . *Uncias ij.*

Dissolve in sufficienti quantitate Spiritûs Nitri, calore leni balnei arenæ, tum,

℞. Axungiæ suillæ recentis . . . . *Libras ij.*

Liquefac in vase figulino vitreato, leni calore. Adde, sensim affundendo, Mercurii dissolutionem. Assiduè agita, donec coagulatio incipiat. Citò chartis in quadratam formam plicatis inde. Paulò post indurescet Axungia in formam Tabellarum.

UNGUENTUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei Lini, } *ana* . . . . *Uncias xij.*
Sebi arietini, }
Lithargyri aurei præparati, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Ceræ flavæ, }
Boli Armenæ præparatæ, }
Minii pulverati, }
Camphoræ . . . . *Drachmam.*
Aceti Vini . . . . *Uncias vj.*

Lithargyrum cum tertiâ Olei parte, injecto per vices Aceto, coque. Adde Oleum residuum, Ceram, Minium, Bolum & Sevum. Liquatis & refrigeratis immisce Camphoram in Spiritûs Vini modico solutam, assiduè movendo ad Unguenti perfectionem.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

℞. Olei Solani . . . . *Libram.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias v.*

Liquescant igne leni. Ab igne semotis adde,

Pompholygis, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Cerussæ præparatæ, }
Plumbi usti . . . . *Uncias iiij.*

Paululum refrigeratis insperge,

Thuris masculi pulverati . . . . *Unciam.*

Agita assiduè ad Unguenti formam.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Axungiæ Porci . . . . *Uncias viij.*

Butyri recentis insulsi,
Ceræ flavæ,
Sebi arietini,
Lithargyri præparati, } *ana* . . . . . *Uncias viij.*
Olei Olivarum . . . . *Libram.*

Coque agitando donec fuscum acquisiverit colorem.

Unguentum griseum mercuriale.

℞. Axungiæ Porci . . . . *Libram iß.*
Saponis nigri . . . . *Uncias vj.*
Sulphuris vivi pulverati . . . . *Uncias ij.*
Staphisagriæ pulveratæ . . . . *Unciam ß.*
Mercurii crudi . . . . *Uncias ij.*

Mercurium in Axungiâ extingue, tùm cætera misce ad Unguentum.

Unguentum mundificativum de Apio.

℞. Foliorum recentium Apii . . . . *Libram.*
Nicotianæ,
Solani,
Sempervivi maj. } *ana Libram ß.*
Vincæ Pervincæ,
Agrimoniæ,
Betonicæ,
Chelidonii major.
Marrubii albi,
Millefolii,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Brunellæ,
Absinthii,
Anagallidis,
Summitatum recentium Centaurii minoris,
Scordii,
Veronicæ, } *ana Uncias ij.*

Olei

Olei Olivarum . . . . *Libras iiij.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias xij.*
Sebi arietini . . . . *Libram ß.*
Picis albæ, } *ana* . . . . *Uncias v.*
Terebinthinæ claræ, }

Herbas contusas in Oleo & Sebo per viginti quatuor horas macera. Bulliant ad humiditatis consumptionem. Cola cum expressione, per subsidentiam & decantationem depura. Adde Ceram, Picem & Terebinthinam. Post liquationem cola. Unguento semi refrigerato adde sequentia pulverata,

Myrrhæ,
Aloës,
Radicum Aristolochiæ clematitis,
Iridis florentinæ,
Scrophulariæ majoris,
Cyperi longi,
} *ana* . . . *Unciam.*

Misce. Fiat Unguentum.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM.

℞. Axungiæ porcinæ, } *ana* . . . . *Quantum vol.*
Mercurii purificati, }

Misce diligenter, incipiendo cùm paululo Axungiæ, donec globuli mercuriales disspareant.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Foliorum recentium Abrotani,
Absinthii,
Apii,
Chamæmeli,
Costi hortensis,
Chamæpithyos luteæ,
Lavandulæ,
Lauri,
Meliloti, cum floribus,
} *ana Unciam.*

Foliorum recentium Primulæ veris, } ana Unciam.
Rosmarini,
Rutæ,
Salviæ,
Thymi,

Menthæ romanæ, } ana Unciam ß.
Betonicæ,
Petroselini,
Pulegii,
Summitatum recentium Hyperici,
Centaurii minoris,

Contusa omnia macerentur per aliquot dies in,

Sebi ovini . . . . *Librâ iß.*
Medullæ ex cruribus bovinis . . . . . *Libris iiij.*

Tum bulliant ad humiditatis consumptionem. Cola cum expressione. Adde,

Olei de Spicâ . . . . *Unciam ß.*

Agita donec Unguentum refrixerit.

UNGUENTUM NUTRITUM.

℞. Lithargyri præparati . . . . *Uncias vj.*
Aceti acerrimi . . . . *Uncias viij.*
Olei Olivarum . . . . *Libram.*

Lithargyrum in mortario agita, affundendo modo Oleum, modo Acetum, donec Lithargyrus liquorem ebiberit & Unguenti debitam acquisiverit crassitiem.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

℞. Tuthiæ . . . . *Unciam.*
Lapidis Calaminaris, } *ana* . . . . . . *Drachmas ij.*
Boli Armenæ,
Cerussæ,
Camphoræ . . . . *Scrupulum ß.*
Unguenti rosati . . . . *Uncias vj.*

Omnia ut decet præparata, Unguento rosato excipiantur & fiat Unguentum.

Unguentum Populeum.

℞. Axungiæ porcinæ . . . . *Libras vj.*
Gemmarum seu Oculorum Populi arboris *Libras iij.*

Liquatæ Axungiæ Gemmas immisce, & in vase figulino vitrato serva, donec sequentes Herbæ colligi possint, tùm,

℞. Foliorum Bardanæ,
Hyosciami nigri,
Lactucæ,
Crassulæ,
Papaveris nigri,
Sedi majoris,
minoris, } *ana* . . . *Uncias vj.*
Solani . . . . *Uncias xij.*

Contusa omnia, commisce Axungiæ prius liquatæ cum Oculis Populi. Coque igne leni assiduè agitando ad dimidiam humiditatis consumptionem. Inter coquendum adjice per vices,

Succi Solani . . . . *Libram iß.*

Cola cum expressione forti. Refrigescat; humiditatem in fundo vasis superstitem aufer. Liquefac iterum; per subsidentiam & decantationem depura. Unguentum serva.

Unguentum rosatum.

℞. Axungiæ Porci,
Rosarum pallidarum cum calycibus, } *ana Quant. vol.*

Rosas in mortario marmoreo contusas, igne leni cum Axungiâ detine ad humiditatis consumptionem. Anchusâ tinge. Cola & serva.

Unguentum de Styrace.

℞. Olei Nucum . . . . *Uncias xj.*
Colophoniæ . . . . *Uncias xv.*

Gummi Elemi, } *ana* . . . . *Uncias viiß.*
Ceræ flavæ, }

Igne moderato liquefiant, liquefactis, colatis, adde,

Styracis liquidæ purgatæ . . . . *Uncias viiß.*

Fiat Unguentum.

UNGUENTUM POTABILE VIRIDE.

℞. Herbarum recentium Abrotani,
Artemisiæ,
Bellidis,
Betonicæ,
Fœniculi,
Hyssopi,
Menthæ,
Asperulæ,
Millefolii,
Majoranæ,
Plantaginis,
Veronicæ,
Salviæ,
Rutæ, } *ana Unciam.*

Baccarum Juniperi viridium . . . . . . *Uncias iij.*
Butyri recentis insulsi . . . . *Libras iiß.*

Incisa & contusa coque cum Butyro, leni igne, ad humiditatis evaporationem. Cola cum expressione. Serva ad usum.

CERATUM REFRIGERANS, GALENI.

℞. Olei Olivarum . . . . *Libram.*
Ceræ albæ . . . . *Uncias iiij.*

Vase fictili vitrato excepta, igne moderato liquentur; ab igne remota pistillo ligneo agitentur donec refrixerint. Aquâ frigidissimâ sæpius renovatâ laventur, & fiat Ceratum.

Simili modo paratur CERATUM AMYGDALINUM cum Oleo Amygdalarum dulcium, loco Olei Olivarum.

CERATUM LITHARGYRATUM.

℞. Olei Olivarum . . . . *Uncias iiij.*
Ceræ albæ . . . . *Unciam.*

Liquentur igne leni in vaſe figulino vitrato, ab igne remove & agita donec refrixerint, tum adde,

Aceti lithargyrati . . . . *Unciam.*

Spathulâ ligneâ agita cum Aquæ puriſſimæ ſufficienti quantitate, ad Ceratum.

PARAGRAPHUS TERTIUS.

DE EMPLASTRIS, SPARADRAPIS ET CEREIS.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ANDREÆ A CRUCE.

℞. Reſinæ Pini . . . . *Libram.*
Gummi Elemi . . . . *Uncias iiij.*
Terebinthinæ venetæ, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Olei Laurini, }

Liquefac igne moderato, cola & fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Herbarum recentium Betonicæ . . . . *Libras iij.*
Apii vulgaris, } *ana Libras iij.*
Plantaginis, }

Ceræ flavæ, } *ana* . . . . *Libram.*
Reſinæ Pini, }

Herbas contuſas coque cum Cerâ & Reſinâ donec humiditas ſit conſumpta, Cola cum expreſſione. Poſtea immiſce,

Gummi Elemi, } *ana* . . . . *Libram.*
Terebinthinæ claræ, }

Liquatis omnibus, cola. Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE CERUSSA.

℞. Ceruſſæ præparatæ . . . . *Libras iij.*
Olei roſati . . . . *Libras vj.*
Aquæ fontanæ . . . . *Libras ij.*

Bulliant ad humiditatis conſumptionem ſub finem adde,

Ceræ Albæ . . . . *Uncias ix.*

Omnibus liquatis & fere refrigeratis Magdaleones efforma, manibus Aquâ madidis.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Succi foliorum Cicutæ . . . . *Libram.*
Aceti ſcillitici, } *ana* . . . . *Libram ß.*
Gummi Ammoniaci, }

Poſt Gummi ſolutionem in Aceto, ſuccum adde, cola, vaporet ad Emplaſtri conſiſtentiam. Magdaleones efforma.

EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

℞. Lithargyri levigati . . . . *Libras iij.*
Olei de Mucaginibus, } *ana* . . . . *Libras vj.*
Decocti Fœnugræci, }

Coque igne lento ad Emplaſtri conſiſtentiam.

EMPLASTRUM DIACHYLUM GUMMATUM.

℞. Emplaſtri Diachyli ſimplicis . . . . . . *Libras iij.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias iiij.*

Liquefac. Ab igne remove. Adde ſequentia pulverata.

Gummi Galbani, }
Ammoniaci, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Opopanacis, }
Sagapeni, }

Terebinthinæ . . . . *Uncias iiij.*

Miſce exactè ut fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DIAPALMA.

℞.		
Lithargyri præparati, Olei Olivarum, Axungiæ ſuillæ,	*ana*	*Libras iij.*
Aquæ communis		*Suffic. quantit.*

Coque aſſiduè agitando ſpathulâ ligneâ, ſub finem coctionis adde,

Vitrioli albi in Aquâ ſoluti	*Uncias iiij.*
Ceræ albæ	*Uncias ix.*

Perage coctionem ad Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞.		
Olei Olivarum, Lithargyri præparati,	*ana*	*Uncias xviij.*

Miſce in cacabo æneo. Adde;

Aquæ communis	*Suffic. quantit.*

Coque ad Emplaſtri conſiſtentiam. Tùm adjice,

Ceræ flavæ	*Uncias viij.*

Liqueſcat. Cacabum ab igne remove, immiſce ſequentia pulverata,

Opopanacis, Maſtiches, Ariſtolochiæ longæ, Æruginis,	*ana*	*Unciam.*
Olibani		*Drachm. ix.*
Galbani, Myrrhæ,	*ana*	*Drachmas x.*
Terebinthinæ claræ, Bdellii,	*ana*	*Uncias ij.*
Gummi Ammoniaci		*Uncias iij & Drachm. iij.*
Magnetis præparati		*Uncias iij.*

Ritè permiſceantur, erit Emplaſtrum coloris viridis.

NOTA. Si quis Emplaſtrum rubrum exoptet, Ærugi-nem cum Lithargyro coquat.

EMPLASTRUM EPISPASTICUM.

℞. Cantharidum recèns pulveratarum . . . *Uncias iiij.*
Euphorbii pulverati . . . . *Unciam ß.*
Picis albæ, Terebinthinæ, } *ana* . . . . *Uncias vj.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias ij.*

Ceræ, Terebinthinæ & Pici liquatis, ab igne ſe-motis, admiſce pulveres. Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM GRISEUM.

℞. Lithargyri aurei, Sebi ovilli, Olei Olivarum, } *ana* . . . . *Uncias iiij.*
Lapidis Calaminaris præparati . . . . . *Uncias ij.*
Ceruſſæ præparatæ . . . . *Unciam.*
Aquæ communis . . . . *Libram.*

Bulliant igne moderato, aſſiduè agitando, ad Em-plaſtri conſiſtentiam, adde,

Ceræ albæ . . . . *Uncias iij.*

Cerâ liquatâ ab igne remove aſſiduè agitando. Em-plaſtro ſemi frigido adde,

Terebinthinæ . . . . *Unciam iß.*

Et ſequentia pulverata ſimul mixta,

Tutiæ præparatæ . . . . *Drachmas ij.*
Thuris . . . . *Drachmas x.*
Maſtiches . . . . *Drachmas vj.*
Myrrhæ . . . . *Unciam ß.*

Sub finem immiſce,

Camphoræ in pauco Oleo ſolutæ . . . *Drachmas iij.*

Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM AD HERNIAM.

℞. Picis navalis . . . . *Libram.*
Ceræ flavæ, } *ana* . . . . *Uncias iij.*
Terebinthinæ claræ, }

Simul liquatis cola. Adde sequentia pulverata,

Masticiches, } *ana* *Uncias ij.*
Radicis Consolidæ majoris siccæ, }
Labdani, } *ana* . . . . *Unciam iß.*
Hypocistidos, }
Terræ sigillatæ, }
Nuces Cupressi . . . . *Numero xij.*

Fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Summitatum Meliloti floridarum & recentium . . . . *Libras iij.*

Contunde in mortario marmoreo, misce cum

Sebi Ovilli liquefacti . . . . *Libris iiij.*

Coque ferè ad humidi consumptionem. Cola cum expressione. Adde,

Picis albæ . . . . *Libras vj.*
Ceræ flavæ . . . . *Libras iij.*

Fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE MUCAGINIBUS.

℞. Olei de Mucaginibus . . . . *Uncias vj.*
Ceræ citrinæ . . . . *Uncias xx.*

Liquescant. Ab igne remove; agita donec refrixerint tantisper; adde sequentia in Aceto soluta,

Gummi Ammoniaci, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Galbani, }
Sagapeni, }

Ritè mixtis adde,

Terebinthinæ . . . . *Uncias ij.*
Croci pulverati . . . . *Drachmas ij.*

Fiat Emplaſtrum.

Emplastrum Norimbergense.

℞. Olei Olivarum . . . . *Uncias ix.*
Ceruſſæ præparatæ . . . . *Uncias v.*

Coque igne lento ad Emplaſtri conſiſtentiam. Adde,

Ceræ flavæ . . . . *Uncias viij.*

Liquefac. Ab igne Emplaſtrum remove, & ſemi-refrigerato admiſce,

Camphoræ in modico Olei Olivarum ſo-
lutæ . . . . *Unciam.*

Fiat Emplaſtrum.

Emplastrum Oxycroceum.

℞. Colophoniæ, }
Picis albæ, } *ana* . . . . *Uncias iiij.*
Ceræ flavæ, }
Terebinthinæ . . . . *Unciam iß.*

Liquefac igne lento. Cola. Emplaſtro ab igne ſemoto, immiſce ſequentia pulverata,

Gummi Ammoniaci, }
Galbani, }
Olibani, }
Myrrhæ, } *ana* . . . . { *Unciam & Drachmas iij.*
Maſtiches, }
Croci, }

Fiat Emplaſtrum.

Emplastrum Saponaceum.

℞. Minii . . . . *Libram*
Ceruſſæ . . . . *Libram ß.*
Olei Olivarum . . . . *Libram iiß.*
Aquæ communis . . . . *Quant. ſuffic.*
Saponis albi deraſi . . . . *Uncias iiij.*

Coque omnia ad debitam conſiſtentiam, tùm adde ut liquantur,

Ceræ flavæ . . . . *Uncias iij.*

Miſce, fiat Emplaſtrum.

Nota. Addi poteſt extemporè Camphoræ tritæ quantum libuerit & erit Emplastrum saponaceum camphoratum.

Emplastrum stipticum, Crollii.

℞. Minii, / Lapidis Calaminaris præparati, } *ana*. *Uncias iij.*
Lithargyri præparati . . . . *Uncias vj.*
Oleorum Lini, / Olivarum, } *ana* . . . . . . *Uncias ix.*
Aquæ communis . . . . *Suffic. quantit.*

Coque aſſiduè agitando, ſpathulâ ligneâ ad Emplaſtri conſiſtentiam. Adde,

Olei laurini . . . . *Uncias iij.*
Ceræ flavæ, / Colophoniæ, } *ana* . . . . *Uncias vj.*

Liquatis omnibus, ab igne remove. Emplaſtro ſemirefrigerato, immiſce ſequentia pulverata,

Reſinæ Sandaracæ . . . . *Uncias iij.*
Gummi Ammoniaci, / Bdellii, / Galbani, / Opopanacis, / Sagapeni, } *ana* . . . . . . *Unciam iß.*
Succini præparati, / Olibani, / Myrrhæ, } *ana* . . . . *Unciam ß.*

Aloës,
Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ, } *ana* . . . . . *Unciam* ß.
Hæmatitæ præparatæ . . . . *Uncias iiij.*
Radicis Tormentillæ . . . . *Drachmas vj.*
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ,
Vitrioli albi, } *ana*. . . . . *Unciam* ß.
Florum Antimonii rubrorum,
Croci Martis aſtringentis, } *ana* . . *Drachmam.*

Miſce exactè, Emplaſtro ferè frigido, adde,

Camphoræ in Olei eſſentialis Juniperi *Seſquidrachmâ* ſolutæ . . . . *Unciam* ß.

Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE VIGO.

℞. Ranas aquaticas viventes boni habitûs . *Numero vj.*
Lumbricorum terreſtrium à Terrâ purgatorum . . . . *Uncias iiiß.*
Vini generoſi . . . . *Libras iiß.*

Digere per aliquot horas. Bulliant ad tertiæ partis conſumptionem. Sub finem adde,

Matricariæ recentis cum floribus . . . . *Unciam.*
Junci odorati,
Stœchados, } *ana* . . . . *Unciam* ß.

Reſideant ad teporem. Cola cum expreſſione. Adde,

Succi radicum Ebuli,
Helenii, } *ana* . . . . . . *Uncias ij.*
Olei anethini,
Chamæmeli romani, } *ana* . . . . *Uncias iij.*
Axungiæ Taxi . . . . *Uncias iiß.*
Porci . . . . *Uncias xj.*
Pinguedinis Vituli . . . . *Uncias vj.*
Lithargyri aurei præparati . . . . *Uncias xviij.*

Coque, aſſiduè movendo, ad Emplaſtri conſiſtentiam; tùm adjice, ut liqueſcant,

Ceræ flavæ . . . . *Uncias vj.*
Olei laurini . . . . *Unciam iß.*

Omnibus liquatis adde,

Styracis liquidæ, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Terebinthinæ claræ, }

Omnibus ritè permixtis, ex Emplaſtro ferè frigido dimidiam partem aufer & ſeorſim ſerva. Tum,

Reliquo Emplaſtri, adde,
Olei eſſentialis Lavandulæ . . . . *Unciam.*

Miſce & erit EMPLASTRUM DE VIGO SINE MERCURIO.

℞. Dimidiam partem Emplaſtri ſupradicti ſeorſim ſervati.

Liquefac, adde,

Mercurii è Cinnabari revivificati & extincti in *Unciâ* Axungiæ Porci rancidæ *Uncias iiij.*

Ritè mixtis & Emplaſtro ferè frigido adde,

Olei eſſentialis Lavandulæ . . . . *Unciam.*

Miſce, & erit EMPLASTRUM DE VIGO CUM MERCURIO.

SPARADRAPA.

SPARADRAPUM RUBRUM.

℞. Ceræ flavæ . . . . *Uncias viij.*
Terebinthinæ . . . . *Uncias iiij.*

Liquefac. Adde ſequentia pulverata,

Minii . . . . *Drachm. iiiß.*
Cinnabaris . . . . *Drachmas iij.*
Ireos florentinæ . . . . *Drachmam iß.*

Fiat Emplaſtrum. In Emplaſtro liquato immerge Telas vetuſtate attritas & fiat Sparadrapum, ſupra marmor cylindro ligneo levandum.

Sparadrapum album.

℞. Ceræ albæ, } ana . . . . . Uncias iiij.
Emplaſtri de Ceruſſâ, }
Olei Olivarum, } ana . . . . Drachmas ij.
Camphoræ, }

Fiat Emplaſtrum, inquo liquido Telam vetuſtate detritam immerge. Fiat Sparadrapum ſupra marmor cylindro ligneo levandum.

CEREI.

Prima Cerei species.

℞. Ceræ flavæ liquatæ . . . . Libram iß.
Aceti Lithargyrati . . . . Unciam.

Liquefac igne lento, agitando; ab igne remotis immerge Telas vel filamenta Goſſipii: & fiant Cerei.

Altera Cerei species.

℞. Ceræ flavæ liquatæ . . . . Uncias vj.
Aceti Lithargyrati . . . . Unciam.

Fiant ut ſupra Cerei.

APPENDIX.

Cataplasma emolliens.

℞. Herbarum quatuor emollientium . . Uncias iiij.
Florum Chamæmeli, } ana . . . . Unciam.
Meliloti, }

Omnibus pulveratis adde,

Farinæ Lini . . . . Uncias iij.
Aquæ communis . . . . Quant. ſuffic.

Miſce fiat Cataplaſma.

CLASSIS SECUNDA.

DE OPERATIONIBUS CHYMICIS.

ARTICULUS PRIMUS.

DE DISTILLATIS.

Distillationis ope eliciuntur;

1.° AQUÆ vel SIMPLICES, vel è pluribus ingredientibus COMPOSITÆ.

2.° AQUÆ VINOSÆ, cum Vino elicitæ.

3.° SPIRITUS: hi triplicis ſunt generis. *Primò*, ARDENTES ſeu cum Spiritu Vini diſtillati, vel fermentatione vinoſâ producti. *Secundò*, ACIDI à fermentatione acidâ orti, vel è quibuſdam naturalibus ſubſtantiis eliciti. *Tertiò* ALKALINI vel VOLATILES è fermentatione putridâ nati, vel è ſubſtantiis ſucco aut Sale volatili præditis, extracti.

4.° OLEA ESSENTIALIA, odorem ſubſtantiarum referentia.

5.° SUBLIMATA, ſubſtantiæ volatiles, ſolidæ, vaſorum diſtillatoriorum ope obtentæ.

CANON. I. Subſtantias diſtillandas cucurbitæ inde. Super ignem cucurbitam capitello inſtructam impone. Juncturis veſicâ madidâ lutatis, refrigeratorium aquâ frigidâ reple. Recipiens roſtro adapta. Ignem ſenſim auge ad liquoris ebullitionem; ab exploſione ſeu expanſione cavendo. Diſtillationem protrahe quamdiù elicitus liquor diſtillandorum odorem & ſaporem refert, cavendo ab empyreumate. Melior & tutior quandoquè erit diſtillatio ex cucurbitâ balneo maris aut arenæ impoſitâ.

II. In diſtillatione Spirituum ardentium & ſublimatione Salium volatilium, vaſa quò altiora, eo meliora; è contrario in Spirituum acidorum diſtillatione, quò humiliora, eo meliora ſunt.

PARAGRAPHUS PRIMUS.

DE AQUIS STILLATITIIS SIMPLICIBUS.

CANON. I. Herbæ & Flores ſint recentes, odoræ & in vigore ætatis. Ut plurimùm tripla quantitas Aquæ, major ſiccioribus, affundatur.

II. Species vel integras, vel pro re natâ inciſas aut contuſas, maceratas ſi opus ſit, vaſi diſtillatorio immitte, tertiâ ejus parte vacuâ remanente.

III. Plantas Cruciferas (*Tetradynamias*,) & ſimiles, alkali volatili turgentes, vaſis non metallicis ſed vitreis vel terreis diſtilla.

IV. Aquæ ſtillatitiæ non odoræ, utpotè nullâ virtute præditæ rejiciuntur: Aquam communem ſtillatitiam vel ebullitam, ubique eis ſubſtitue.

MODUS DISTILLANDI.

1.° Plantas *Cruciatas* ſeu *Cruciferas* & ſimiles, volatili ſucco prægnantes, leviter conciſas, non contuſas, cum Aquæ communis pondere duplo diſtilla, & elice quartam partem. In harum familiâ ſunt,

BECCABUNGA,
COCHLEARIA,
NASTURTIUM,
LEPIDIUM,
RADICES RAPHANI RUSTICANI *ſcobinâ deraſæ*, *&c.*

2.° Plantas *odoras*, recentes & cum floribus mundatis ac diſcarptis diſtilla, ex Aquæ communis triplo & elice tertiam partem. Huc veniunt,

ABSINTHIUM,
ANGELICA,
ARTEMISIÆ,
CHAMÆMELUM,
FÆNICULUM,
HYSSOPUS,
MAJORANA,
MELISSA,

MENTHA,

MENTHA,
RUTA,
SALVIA,
SCORDIUM,
TANACETUM,
THYMUS, &c.

3.° Floribus *Odoris & Succosis*, recens mundatis Aquæ quadruplum affunde, & partes duas elice: hi sunt,

Flores { AURANTIORUM,
TUNICÆ,
ACACIÆ,
LILII CONVALLIUM,
LILIORUM ALBORUM,
ROSARUM PALLIDARUM,
SAMBUCI,
TILIÆ,
PRIMULÆ VERIS, &c. }

NOTA. Hi flores mundati possunt balneo maris perse, id est sine Aqua distillari; & elicies *Aquæ* distillatæ, (*essentialis* dictæ) Uncias circiter sex, ex singulis florum libris.

4.° Flores *odoros*, *minùs succosos* cum calycibus, quadruplo Aquæ communis affuso, macera per viginti quatuor horas. Aquæ partes duas distilla. Inter has recense,

Flores { CHAMÆMELI,
LAVANDULÆ,
MATRICARIÆ,
MELILOTI,
ROSMARINI,
STÆCHADOS, &c. }

NOTA. Horum florum *Aquas essentiales*, methodo supradictâ elicies; è singulis florum libris Uncias circiter sex distillabis.

5.° Baccas & Semina contunde, octuplum Aquæ communis affunde, per viginti quatuor horas digere, ad medias distilla. Verbi gratia,

Baccæ LAURI,

Semina { ANGELICÆ,
APII HORTENSIS,
CORIANDRI,
CARVI,
CUMINI,
FŒNICULI, &c. }

6.° *Cortices Citrei & Aurantiorum* cum ſextuplo Aquæ communis per biduum macera & ad medias diſtilla.

7.° *Ligna*, *Cortices*, *Radices ſiccas* & ſimilia, radulâ abrade, cum octuplo Aquæ communis per aliquot dies digere, & diſtilla ad medias.

PARAGRAPHUS SECUNDUS.

DE AQUIS STILLATITIIS COMPOSITIS.

CANON. I. Herbæ earumque partes ſint mediocriter & recenter ſiccatæ, exceptis quæ recentes præſcribuntur.

II. Finitâ maceratione debitâ, tantum Aquæ fontanæ adjice quantum empyreumati cavendo ſufficit.

III. Liquorem primò diſtillatum, non ſeorſim ſub nomine Spiritûs ſerva, ſed cum poſtremis miſce.

AQUA CASTOREI.

℞. Caſtorei optimi . . . . *Unciam.*
Summitatum florentium Botryos americanæ,
Matricariæ, } *ana Uncias iiij.*
Flavedinis ſiccæ aurantiorum . . . . . . *Unciam ß.*

Infunde per aliquot horas in quantitate Aquæ communis ſufficienti ut evitetur empireuma. Diſtilla balneo maris & elice Aquæ *Pintas iij.*

AQUA CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti contuſi leviter . . . . *Libram.*
Vini generoſi . . . . *Pintas viij.*

Macera per duos dies vaſe clauſo. Diſtilla ſecundum Canones, donec liquor elicitus Cinnamomi odorem & ſaporem referre neget.

AQUA THERIACALIS.

℞. Radicum Vincetoxici,
Angelicæ,
Dictamni albi,
Petaſitidis,
Gentianæ, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Carlinæ,
Contrayervæ,
Zedoariæ, } *ana* . . . . . *Unciam.*
Corticum recentium Citri,
Baccarum Juniperi } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Herbarum Rutæ,
Scordii,
Galegæ, } *ana* . . . . *Unciam.*
Theriacæ Andromachi . . . . *Uncias vj.*
Vini generoſi . . . . *Pintas xij.*

Incidenda incide, contundenda contunde. Macera vaſe clauſo per triduum. Diſtilla lege artis.

PARAGRAPHUS TERTIUS.

DE SPIRITIBUS.

SPIRITUS ARDENTES.

CANON. Spiritus ardentes facillime flammam concipiunt, ideo cave ab ignis nimio gradu & à flammæ appropinquatione.

AQUA VITÆ.

℞. Vini generoſi . . . . *Quant. ſuffic.*

Ad implendam mediam cucurbitæ partem. Lento igne diſtilla ſecundum Canones, donec liquor prodiens flammam concipere neget.

NOTA. SPIRITUS VINI CAMPHORATUS fit ex Camphoræ *Unciâ ß.* in Aquæ vitæ *Unciis viij.* ſolutâ.

Spiritus Vini rectificatus.

℞. Aquæ vitæ . . . . *Quant. ſatis*,

Ut impleatur dimidia pars cucurbitæ. Diſtilla ut artis eſt ad medias.

Nota. Spiritum Vini omninò dephlegmatum & alkooliſatum cognoſces dùm totus accenſus conſumitur; vel dùm Pulveri Pyrio affuſus & accenſus illum deflagrando conſumit; vel tandem quando Oleum amygdalinum ſupernatat.

Spiritus Anisi.

℞. Seminum Aniſi contuſorum . . . . *Libram* ß.
Aquæ vitæ, }
Aquæ communis, } *ana* . . . . *Pintas iiij*.

Per diem macera. Diſtilla donec *Pintæ iij*. ſint elicitæ.

Eodem modo parantur Spiritus { Anethi, Carvi, Coriandri, Fœniculi, &c.

Spiritus carminativus, Sylvii.

℞. Radicum Angelicæ . . . . *Drachmam*.
Imperatoriæ, }
Galangæ, } *ana* . . . . . . *Drachmam* iß.
Foliorum Roſmarini, }
Majoranæ, }
Rutæ, }
Ocimi, } *ana* . . . . . . *Unciam* iß.
Baccarum Lauri . . . . *Drachmas iij*.
Seminum Angelicæ, }
Leviſtici, }
Aniſi, } *ana* . . . . *Unciam* ß.
Zinziberis, }
Nucis moſchatæ, }
Macis, } *ana* . . . . *Drachmam* iß.
Cinnamomi. . . . . *Drachmas iij*.

Caryophyllorum, }
Corticum Aurantiorum, } *ana* . . . . . *Drachmam.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintas vj.*

Incide & crasse contunde. Macera per triduum, vase clauso. Distilla cum Aquæ communis sufficienti quantitate ad evitandum empyreuma, donec elicitæ sint *Pintæ iij.*

AQUA VULNERARIA.

℞. Florum Lavandulæ,
Herbarum recentium Salviæ,
Angelicæ,
Absinthii,
Satureiæ,
Fœniculi,
Menthæ Crispæ,
Hyssopi,
Melissæ,
Ocimi,
Rutæ,
Thymi,
Majoranæ,
Rosmarini,
Origani,
Calaminthæ,
Serpilli, } *ana Unc. iiij.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintas xij.*

Incisa omnia, macera per viginti quatuor horas, vase clauso. Cum Aquæ communis sufficienti quantitate, ad evitandum empyreuma, balneo maris distilla donec elicitæ sint *Pintæ xij.*

AQUA MELISSÆ, COMPOSITA.

℞. Herbæ Melissæ recentis . . . . *Libram iß.*
Flavedinis corticum recentium Citri . *Uncias iiij.*
Nucis moschatæ, }
Seminum Coriandri, } *ana* . . . . . . *Uncias ij.*

Cinnamomi,
Caryophyllorum, } *ana* . . . . *Unciam.*
Radicum Angelicæ,
Aquæ vitæ . . . . *Pintas ix.*

Incisa & contusa ut artis est, macera per triduum. Cum sufficienti quantitate Aquæ communis ad evitandum empyreuma, distilla donec *Pintæ xij.* sint elicitæ.

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Florum Rosmarini recentium, cum calycibus . . . . *Libras ij.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintas xvj.*

Distilla illico, cum sufficienti quantitate Aquæ communis ad evitandum empyreuma, donec elicitæ sint *Pintæ viij.*

Simili modo eliciuntur SPIRITUS { LAVANDULÆ, CORTICUM CITRI, &c.

SPIRITUS ARDENS CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum maturorum rejectis nucleis . . . . *Libras xx.*

Contunde. Vase figulino inde. Affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas x.*
Mellis optimi . . . . *Libras ij.*

Macera in hypocausto donec vinosus odor exhaletur. Ex arte balneo maris distilla. Spiritum indè elicitum rectifica.

Eodem modo parantur SPIRITUS ARDENTES { Fructuum FRAMBŒSIÆ, FRAGARIÆ, Baccarum JUNIPERI, SAMBUCI, &c.

SPIRITUS ARDENS COCHLEARIÆ.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis & floridæ . *Libras v.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintas x.*

Herbam contusam cum Aquâ vitæ macera per biduum vase Clauso. Juncturas ritè obtura ; Distilla donec liquoris *Libræ v.* elicitæ sint.

Sic parantur *Spiritus ardentes* plantarum omnium *Cruciferarum* & *Antiscorbuticarum.*

SPIRITUS ACIDI.

SPIRITUS ACETI.

℞. Aceti acerrimi . . . . *Quantum vol.*

Mitte in ollam humilem , lento calore balnei arenæ vaporet circiter tertia pars quæ phlegma est. Duas partes alteras inde cucurbitæ vitreæ. Distilla , prodibit Spiritus. Ab operatione cessabis , ubi primùm stillans liquor empyreumaticum odorem spiraverit.

NOTA. Si distillatio instituatur cum Aceto gelu ad medias concentrato , statim prodibit spiritus.

SPIRITUS ET OLEUM VITRIOLI.

℞. Vitrioli viridis ad levem flavedinem calcinati & pulverati . . . . *Quant. satis.*

Inde retortæ loricatæ ita ut dimidia pars vacua remaneat. Adaptato amplissimo recipiente , distilla igne primùm leni , prodibit guttatim phlegma (*Ros Vitrioli*) si libuerit servandum. Phlegmate exempto , recipiente iterùm adaptato. Juncturis ritè lutatis distillationem perge igne graduato , mox acriori , tandem acerrimo , per tres aut quatuor dies.

Operatione finitâ , materia superstes in retortâ COLCOTHAR appellatur.

Liquorem elicitum balneo arenæ diſtilla ad medias, erit *Spiritus*, *Oleum* (impropriè dictum) in retorta ſupererit.

NOTA. OLEUM ſeu SPIRITUS SULPHURIS *per campanam* nihil aliud eſt quam SPIRITUS VITRIOLI, ſeu ACIDUM VITRIOLICUM.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS, HOFFMANNI.

℞. Olei Vitrioli concentratiſſimi, }
Spiritûs Vini rectificatiſſimi, } *ana* . . *Libram iß*.

Mitte Spiritum Vini in retortam vitream ſatis amplam, huic affunde paulatim & cautè Oleum Vitrioli, in gyrum agitando retortam ut liquores miſceantur accuratè. Mixtura incaleſcit, colorem acquirit rubrum. Diſtilla igne arenæ ita adminiſtrato ut liquor ſemper leviter bulliat. Prodibit primò *Spiritus Vini fragrans* quem exime & ſerva.

Diſtilla iterùm eodem caloris gradu donec ſulphureus odor prodire incipiat, obtinebis ſecundò *Spiritum volatilem fragrantiorem & ſuaviorem* quem excipe & ſerva.

Deindè igni leniſſimo materiam ſuperſtitem expones, (ne offa nigra, in fundo retortæ apparens aſcendat ac tranſeat in recipiens,) prodibit *Phlegma acidum, ſulphureum & volatile*.

Tandem apparebit *Oleum Vini dulce*, à Phlegmate acido ſtatim & accuratè ſeparandum. Tùm;

℞. Spiritûs Vini fragrantis primò diſtillati . }
Spiritûs volatilis fragrantioris ſecundò } *ana Unciam*.
diſtillati . . . . }
Olei Vini dulcis ultimò diſtillati . . . *Gutas xij*.

Miſce, & erit *Liquor anodynus mineralis*.

NOTA. I. Si Liquor anodynus mineralis aliquid ſulphurei odoris ſpiraverit, cum Salis Tartari tantillo digeratur.

II. Liquorem ſecundò elicitum balneo arenæ, igne omnium leniſſimo, lampadis flammæ ope, lentè diſtilla, obtinebis liquorem ÆTHER dictum.

SPIRITUS NITRI.

℞. Nitri puri triti . . . . *Libras ij.*
Argillæ exſiccatæ pulveratæ . . . . . . *Libras vj.*

Mixta inde retortæ terreæ, capaci, luto loricatæ. Igne leni primùm phlegma elice, quod abjicito. Adaptato recipiente amplo, ritè lutato, ſenſim ignem auge ad ſummum gradum. Elapſis horis quatuordecim finita erit operatio.

NOTA. I. Diſſolve Mercurii crudi *Unciam* in matratio cum ſufficienti quantitate Spiritûs Nitri & erit SOLUTIO ſeu AQUA MERCURII CAUSTICA.

II. Spiritûs Vini rectificati *Unciis xij.* affunde cautè & ſenſim Spiritûs Nitri *Uncias vj.* digère per aliquot dies in vaſe circulatorio amplo & habebis SPIRITUM NITRI DULCIFICATUM.

SPIRITUS NITRI CONCENTRATUS.

℞. Nitri puri ſicciſſimi pulverati . . . . . *Partes iij.*
Olei vitrioli concentrati . . . . *Partem j.*

Inde Nitrum retortæ ſatis capaci. Super affunde Oleum Vitrioli. Statim balneo arenæ igne leni diſtilla. Ignem auge gradatim & cautè. Liquorem elicitum in lagenâ epiſtomio vitreo obturatâ ſervabis.

NOTA. Inter diſtillandum, recipientis foraminulum identidem aperies, ne vaſa frangantur.

AQUA FORTIS.

℞. Nitri puri ſiccati,
Vitrioli viridis ad albedinem calcinati, } *ana Libras ij.*

Seorſim tere. Mixta ſimul inde retortæ capaci loricatæ recipienti ampliſſimo inſtructæ. Igne primùm leni phlegma elice, quod abjicito. Juncturis ritè lutatis diſtilla igne graduato ad reverberii gradum. Intra duodecim horas abſolvetur operatio.

NOTA. I. Reſiduum in Aquâ calidâ ſolutum, filtratum, ad pelliculam vaporatum, ad cryſtalliſationem repone. Erit ARCANUM DUPLICATUM.

II. Immitte matratio capaci, Salis Ammoniaci puri *Uncias iiij.* cum Aquæ fortis vel Spiritûs Nitri *Librâ*, digere ad integram Salis solutionem. Erit AQUA REGIA.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS.

℞. Salis communis exsiccati & pulverati . *Libram.*
Argillæ exsiccatæ & pulveratæ . . . . . *Libras viij.*

Distilla ut de Spiritu Nitri dictum est.

NOTA. Inde matratio capaci Spiritûs Vini rectificati *Uncias viij.* sensim affunde Spiritûs Salis *Uncias iiij.* digere per aliquot dies. Erit SPIRITUS SALIS DULCIFICATUS.

APPENDIX.

AQUA RABELLIANA.

℞. Spiritûs Vini rectificatus . . . . *Uncias xij.*

Mitte in vas vitreum satis amplum. Huic instilla paulatim, cautè vas in gyrum assiduè movendo,
Olei Vitrioli . . . . *Uncias iiij.*

Digere vase aperto, & serva.

SPIRITUS VOLATILES.

SPIRITUS SALIS VOLATILIS OLEOSUS, SYLVII.

℞. Cinnamomi . . . . *Uncias ij.*
Macis . . . . *Unciam ß.*
Caryophyllorum . . . . *Drachmam.*
Corticum Citri . . . . *Unciam ifß.*
Salis Ammoniaci . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintam ifß.*

Digere per aliquot dies vase probè clauso. Tùm adde,
Salis Tartari . . . . *Uncias iiij.*

Distilla balneo arenæ ad medias.

Spiritus, Oleum et Sal volatile Cornu Cervi.

℞. Cornu Cervi frustulatim secti . . . . . *Quantum vol.*

Imple retortam. Distilla igne primùm leni. Primò prodibit phlegma rejiciendum. Gradatim aucto igne, Spiritum, Sal volatile & Oleum obtinebis.

Vasa refrigerata agitato, ut Oleum, Sal volatile & Spiritus commisceantur. Hæc inde retortæ, & balneo maris sublime fiat Sal volatile, affuso Spiritu Vini rectificandum. Superstes liquor filtretur ut Oleum spissum separetur à Spiritu.

Simili ratione distillantur { Ossa animalium, Viperæ, &c.

Oleum, Spiritus et Sal volatile Succini.

℞. Succini flavi contriti . . . . *Quant. voluer.*

Inde retortæ loricatæ, capaci, & orificii ampli, cujus impleantur duæ tertiæ partes. Recipiens amplissimum adapta. Igne primùm leni distilla, stillabit phlegma. Auge ignem gradatim; Spiritus, Sal volatile & Oleum prodibunt.

Sal, recipientis parietibus adhærens, Aquâ calidâ collige & solve. Oleum à Spiritu per chartam bibulam priùs Aquâ madefactam separa. Spiritum Sale imbutum in cellâ repone: concrescent crystalli, quas à liquore seu Spiritu separabis.

Oleum cum ossibus ad albedinem calcinatis misce in retortâ. Distilla igne graduato. Prodibunt Olea, primò album, Dein flavum, postremò rubrum: singula seorsim excipe & serva.

Nota. I. Primum Oleum diu servabitur album, si cum Aquâ iterum balneo arenæ ex retortâ distilletur.

II. Sal volatile Succini acidum est, & inter Salia essentialia recensendum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE.

℞. Salis Ammoniaci . . . . *Uncias viij.*
Calcis vivæ . . . . *Libram iß.*

Seorſim pulvera. Mixta inde cucurbitæ vitreæ ita capaci ut media pars ſit vacua. Affunde,

Aquæ communis . . . . *Uncias vj.*

Materiam agita, à vaporibus cavendo, & ſtatim capitellum impone ſatis amplum ac recipiente inſtructum; juncturis non lutatis, ſed arctè conniventibus. Eductis per horæ quadrantem ſine igne primis Spiritibus, juncturas luta. Ignem adhibe leniſſimum gradatim augendum. Aſcendit primò Sal volatile ſiccum capitello adhærens; ſecundò ſequitur Spiritus Sal ſolvens. Unà in recipiens delabuntur. Refrigeratis vaſis Spititum ſerva in lagenâ probè obturatâ epiſtomio vitreo.

NOTA. Maſſam ſuperſtitem calcina, erit SAL AMMONIACUM FIXUM. Aëri humido expoſitum deliqueſcit, & vocatur OLEUM CALCIS.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM ALKALI FIXO.

℞. Salis Tartari, } *ana* . . . . *Partes æquales.*
Salis Ammoniaci, }

Procede ut in operatione Spiritûs Salis Ammoniaci cum Calce.

NOTA. Maſſa reſidua in Aquâ ſoluta, filtrata & evaporata, dat SAL DIGESTIVUM ſeu FEBRIFUGUM SYLVII.

APPENDIX.

SPIRITUS MINDERERI.

℞. Spiritûs Salis Ammoniaci cum Alkali fixo parati . . . . *Quantum vis.*
Spiritus Aceti . . . . *Quant. ſuffic.*

Ad ſaturationem.

PARAGRAPHUS QUARTUS.

DE OLEIS ET BALSAMIS DISTILLATIS.

CANON. I. Pro Oleorum eſſentialium diſtillatione, plantas aromaticas vigentes adhibe.

II. Cortices fructuum recentium nullâ maceratione indigent, corpora tenerrima vix ullam, tenuia & mollia macerationem per biduum triduumve, viſcoſa diuturniorem exigunt.

III. Ante macerationem ſemina, baccas & aromata contunde. Ligna radulâ abrade.

IV. Olea eſſentialia ipſemet Pharmacopœus præparet ut adulteratio evitetur.

OLEUM ESSENTIALE ABSINTHII.

℞. Herbarum Abſinthii conciſarum . . . . *Quantum. vol.*
Aquæ communis . . . . *Quant. ſuffic.*

Ut Herbæ innatare poſſint. Macera per aliquot dies. Diſtilla igne nudo, paulò intentiore quàm qui Aquis diſtillandis adhibetur. Oleum ab Aquâ ſepara.

Eodem modo diſtillantur OLEA ESSENTIALIA,

- Herbarum
  - MENTHÆ,
  - ORIGANI,
  - PULEGII,
  - SABINÆ,
  - ROSMARINI, *cum floribus*,
  - RUTÆ, *cum ſeminibus.*
- Florum LAVANDULÆ.
- Seminum
  - ANISI,
  - CARVI,
  - FŒNICULI.
- Baccarum JUNIPERI.
- Corticum
  - AURANTIORUM,
  - CITREORUM,
- Ligni
  - SASSAFRAS,
  - RHODII.

Eodem modo distillantur { Olea Essent. { Caryophyllorum, Cinnamomi, Nucis moschatæ. Spiritus Terebinthinæ, &c.

Oleum Ceræ.

℞. Ceræ flavæ odoratiſſimæ . . . . Libram.

Diſtilla ex retortâ loricatâ igne graduato. Prodibit primo *phlegma acidulum*, & *Spiritus fetens.* Igne aucto ſequetur *Oleum* inſtar Butyri collo retortæ adhærens. Admotâ prunâ Oleum redde fluidum ut in recipiens fluat; ex retortâ leniſſimo igne diſtilla iterùm. Rectifica & Oleum clarum evadet.

Oleum Guajaci.

℞. Ligni Guajaci radulâ abraſi . . . . *Quant. ſatis*,

Ut dimidiam partem retortæ adimpleas. Recipiens ampliſſimum adapta. Foraminulum identidem aperiendo, diſtilla igne graduato. Prodibit primò *phlegma* rejiciendum. Lutatis juncturis, diſtillatione continuatâ prodibit *Spiritus acidus*, & tandem *Oleum* nigrum craſſum & fetidum fundum liquoris petens. Oleum à Spiritu ſeparatum rectifica & ſerva ad uſum.

Eodem modo eliciuntur Olea Fetida ex quibuſcumque lignis.

Oleum de Lateribus.

℞. Lateres confractos . . . . *Quot volueris*.

Candefac & illico immerge Oleo claro Olivarum, Statim vas coöperiendo ne accendatur Oleum. Sinito donec refrixerint. Exemptos Lateres terito. Retortæ loricatæ recipiente capaci inſtructæ indito. Commiſſuris lutatis, Oleum igne reverberii elicito. Prolectum Oleum rectifica & ſerva.

Balsamum Fioraventi.

℞. Baccarum recentium Lauri . . . . . . *Uncias iiij.*
Styracis liquidæ . . . . *Uncias ij.*

Gummi Elemi, Tacamahacæ, } *ana* . . . . . . *Unciam.*

Galbani, Thuris, Myrrhæ, Hederæ, Ligni Aloës, } *ana* . . . . *Uncias iij.*

Galangæ minoris, Caryophyllorum, Cinnamomi, Nucis moſchatæ, Zedoariæ, Zinziberis, Foliorum Dictamni cretici, Aloës Soccotrinæ, Succini præparati, } *ana* . . . *Unciam.*

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Pintas vj.*

Digere vaſe clauſo per dies novem. Tùm adde,

Terebinthinæ venetæ . . . . *Libram.*

Diſtilla balneo maris.

APPENDIX.

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Camphoræ tritæ . . . . *Uncias iij.*

Mitte in matratium, affunde,

Spiritûs Nitri . . . . *Uncias vj.*

Vaſe obturato digere ad integram Camphoræ ſolutionem. Oleum Camphoræ ſupernatans ſepara & ſerva.

OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. Ova recentia, cocta ad duritiem & per medium ſecta.

Vitellis exemptis, Myrrhâ tenuiſſimè tritâ imple cava,

Æmulas Albuminum medietates coadunatas filo ligabis, & craticulæ ligneæ ſuper paropſidem impones. Stent in cellâ. È Myrrhâ liqueſcente Oleum ſtillabit.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

℞. Florum Sulphuris . . . . *Uncias ij.*
Olei eſſentialis Terebinthinæ . . . . . . *Uncias viij.*

Digere balneo arenæ. Leviter bulliant donec Oleum rubeſcat. Decanta & ſerva ad uſum.

Eodem modo paratur BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM,
SUCCINATUM,
JUNIPERINUM, &c.

PARAGRAPHUS QUINTUS.

DE FLORIBUS ET SUBLIMATIS.

FLORES ANTIMONII RUBRI.

℞. Antimonii crudi,
Salis Ammoniaci, } *ana* . . . . *Uncias iiij.*

Tere ſeorſim. Miſce. Inde cucurbitæ figulinæ. Adaptato receptaculo digere. Igne moderato per duas treſve horas ſublima. Tota ferè maſſa aſcendet. Flores exime quos Aquâ tepidâ multoties ablue & edulcora, lotiones Floribus admixtas per chartam bibulam trajiciendo. Pulverem chartæ inſidentem exſicca.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoïni electi, triti . . . . *Quant. vol.*

Mitte in ollam fictilem. Chartam in modum capitelli ad coni formam convolutam adapta. Igne leni ſublima. Singulis horis chartaceum conum muta; Flores albos colliges donec flavi ſuccedant.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

℞. Salis Ammoniaci pulverati . . . . *Libram ß.*
Limaturæ Martis . . . . *Uncias iiij.*

Miſce

Misce. Aëri humido per viginti-quatuor horas expone. Inde retortæ vitreæ. Balneo arenæ, igne graduato sublima. Primò stillabit liquor salinus penetrantissimus; dein Flores ad collum retortæ sublimabuntur. Flores elicitos, ex residuo pulverato, bis, tervè cohoba.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis triti . . . . *Quantum vol.*

Inde cucurbitæ in balneo arenæ positæ. Affixâ, capitelli vice, cucurbitâ alterâ non vitreatâ, inversâ, vel superappositis vasculis *Aludels* dictis, sublima igne graduato. Identidem capitellum renova & Flores collige.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Florum Sulphuris. . . . . *Libram ß.*

Liquefac in patellâ terreâ non vitreatâ. Adde statim,

Mercurii vivi . . . . *Libras ij.*

Agita perpetuò spathâ ferreâ, donec ambo coëant & Mercurius fiat inconspicuus. Massam hanc pulveratam sublima in vase idoneo, igne nudo. Sublimationem semel aut iterùm repete.

HYDRARGYRI REVIVIFICATIO.

℞. Cinnabaris factitiæ pulveratæ, } *ana* . *Quant. satis;*
Limaturæ Ferri non rubiginosæ, }

Ut impleatur dimidia pars retortæ loricatæ. Receptaculum Aquâ plenum adapta. Igne graduato reverberii distillationem institue, donec Hydrargyrus in totum transierit.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii è Cinnabari redivivi . . . . . *Uncias xij.*

Mitte in matratium. Affunde,

Spiritûs Nitri optimi . . . . *Uncias xiv.*

Impone arenæ tepenti ad diſſolutionem Mercurii. Hanc decapula in cucurbitam vitream: igne leni vaporet ad ſiccitatem. Maſſam ſuperſtitem in mortario vitreo pulvera. Adde,

Vitrioli ad albedinem calcinati, } *ana* . . *Uncias xij.*
Salis Marini decrepitati, }

Mixturam inde matratio triplo capaciori. Igne graduato, balneo arenæ ſublima. Intra duodecim horas perfecta erit operatio.

MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.

℞. Mercurii ſublimati corroſivi . . . . . . *Uncias viij.*
Hydrargyri è Cinnabari redivivi . . . . *Uncias vj.*

Sublimatum in mortario vitreo tere, Mercurii portiunculam identidem adjiciendo donec Mercurius penitùs fiat inconſpicuus. Inde matratio vel plurimis phialis. Igne arenæ graduato ſublima. Rejecto pulvere rubente in fundo & circa collum albicante; ſublimatum exime. Iterùm eodem modo pulvera & ſublima, idque tertiò repete.

NOTA. I. Mercurius ſublimatus ſepties CALOMELAS RIVERII vocatur.

II. Mercurius ſublimatus undecies PANACEA MERCURIALIS nuncupatur.

BUTYRUM ET CINNABARIS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi, } *ana* . . . *Part. æquales.*
Mercurii ſublimati corroſivi, }

Pulvera ſeorſim. Miſce. Inde retortæ loricatæ brevioris & latioris colli, cujus media pars remaneat vacua. Diſtilla igne graduato. Egredietur & in collo concreſcet Butyrum, quod ibi prunâ admotâ liquabis, ut in recipiens decidat. Diſtillare perge donec vapores rubri exire incipiant: tùm Butyrum exime. Adapta alterum recipiens aquæ ad quartam partem repletum, ut Mercurius ſuper abundans colligatur: juncturis non lutatis,

iterùm ad retortæ candefcentiam diftilla. Intra tres aut quatuor horas abfoluta erit operatio. Collo retortæ Cinnabarim Antimonii adhærentem invenies.

NOTA. Producta hujus proceffûs rectificabis feorfim fi opus fit.

ARTICULUS SECUNDUS.

DE TINCTURIS ET ELIXIRIIS.

MEdicamentorum partes viribus præftantiores à fubftantiâ inutili per Tincturam feparantur ac folvuntur. Quapropter TINCTURÆ ad extracta pertinere videntur, & à quibufdam *Extracta liquida* improprie vocantur.

ELIXIRIA feu ENCHILOMATA non differunt ab Extractis liquidis.

CANON. I. Vide Canones pro Vinis & Cerevifiis parandis.

II. Vafa circulatoria ampliffima adhibe.

III. Digeftionis tempore, crebro vas agita.

IV. Tincturas fubfidentiâ depuratas filtra.

TINCTURA ABSINTHII.

℞. Summitatum floridarum Abfinthii majoris ficcatarum . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintam ifs.*

Digere vafe claufo per aliquot dies. Cola cum expreffione. Filtra. Serva ad ufum.

Simili modo parantur TINCTURÆ SCORDII,
RUTÆ,
SALVIÆ, &c.

TINCTURA BENZOINI COMPOSITA.

℞. Benzoïni optimi . . . . *Drachmas vj.*
Styracis Calamitæ . . . . *Unciam fs.*
Mofchi orientalis . . . . *Grana iij.*

Contunde leviter. Affunde,

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Uncias x.*

Digere vase clauso per duos tresve dies. Decanta, filtra, & serva in lagenis benè obturatis.

TINCTURA *vulgò dicta* BALSAMUM COMMENDATORIS.

℞. Radicis siccæ Angelicæ Bohemicæ minutim incisæ . . . . *Unciam ß.*
Florum Hyperici siccorum . . . . . . *Unciam.*
Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libras ij & Uncias iiij.*

Digere balneo arenæ, vase clauso identidem agitando, ad perfectam tincturam. Cola cum expressione. Adde,

Myrrhæ, Olibani, } *ana* . . . . *Unciam ß.*

Digere ut supra, tum adde sequentia contrita;

Styracis calamitæ . . . . *Uncias ij.*
Benzoïni amygdaloïdes . . . . *Uncias iij.*
Balsami tolutani . . . . *Unciam*
Aloës soccotrinæ . . . . *Unciam ß.*

Digere per quadraginta dies. Cola. Filtra. Serva ad usum.

TINCTURA CEPHALICA, SENNERTI.

℞. Radicum Pæoniæ maris, Foliorum salviæ siccatorum, } *ana* . . . *Unciam.*
Florum siccatorum Lilii convallium, Stœchados arabicæ, Lavandulæ, Rosmarini, Seminum Anisi, Pæoniæ, } *ana Drac. ij.*

Corticum exteriorum Citri ficcatorum,
Caryophyllorum.
Cubebarum, } *ana Drach. j.*
Spicæ Nardi indicæ,
Cardamomi minoris, } *ana* . . . . *Scrupulum.*
Macis,

Omnibus contufis ut artis eft, affunde,

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libras ij.*

Digere vafe claufo per octo dies, fæpè agitando. Torculari exprime. Filtra. Serva in lagenis optimè claufis.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞. Radicum Hellebori nigri . . . . *Uncias iiij.*
Coccinellæ . . . . *Drachmam ß.*

Contufis, affunde,

Aquæ vitæ . . . . *Pintas ij.*

Digere per triduum. Cola. Filtra, & ferva.

TINCTURA ANTI-HYSTERICA.

℞. Radicum ficcatarum Bryoniæ . . . . . *Uncias ij.*
Baccarum Sambuci maturarum & moderato clibani calore ficcatarum . . . *Unciam iß.*
Foliorum Artemifiæ recenter in umbrâ ficcatorum,
Foliorum Dictamni cretici,
Matricariæ,
Nepetæ,
Ocymi,
Pulegii,
Rutæ,
Sabinæ,
Seminum Leviftici,
Dauci fylveftris, } *ana* . . . *Unciam ß.*

Corticum exteriorum Aurantiorum ſiccatorum, ... *Unciam iß.*
Myrrhæ electæ, } *ana* . . . . *Drachmas iij.*
Caſtorei, }
Croci . . . . *Drachmam.*

Omnia ritè conciſa & contuſa, digere vaſe clauſo, per aliquot dies in,

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libris iiiß.*

Cola cum expreſſione. Filtra & ſerva.

TINCTURA JALAPPÆ.

℞. Radicum reſinoſarum Jalappæ . . . . *Uncias ij.*
Ireos florentinæ, } *ana Drach. j.*
Cinnamomi acuti, ... }

Craſſiuſculè tere. Adde,

Aquæ vitæ . . . . *Libram.*

Digere vaſe clauſo per octo dies. Filtra & ſerva.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi Laccæ electæ . . . . *Unciam.*
Aluminis uſti . . . . *Drachmam.*
Spiritûs ardentis Cochleariæ . . . . . *Uncias viij.*

Digere balneo arenæ, vaſe clauſo, ad Tincturæ rubræ perfectionem. Decanta, filtra, & ſerva.

TINCTURA MARTIS APERIENS.

℞. Limaturæ Ferri . . . . *Uncias vj.*
Tartari albi pulverati . . . . *Libram.*

Mitte in ollam ferream capaciſſimam. Super affunde,

Aquæ pluvialis . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat maſſa per viginti quatuor horas reponenda. Tùm adde,

Aquæ pluvialis . . . . *Pintas xij.*

Bulliant omnia per horam. Identidem agita, Aquam ferventem addendo, eo fine ut evaporatione, liquidi quantitas non imminuatur. Ebullitione factâ quieſcant. Supernatantem liquorem decanta. Filtra. Vapora ad Syrupi liquidioris conſiſtentiam. Adde,

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Unciam.*

Serva ad uſum.

Tinctura Martis cum Succo Pomorum.

℞. Limaturæ Ferri . . . . *Libram.*
Succi Pomorum accidorum . . . . *Pintas iij.*

Procede ut ſupra.

Laudanum liquidum, Sydenhami.

℞. Opii ſelecti in taleolas ſecti . . . . . . *Uncias ij.*
Croci . . . . *Unciam.*
Cinnamomi pulverati,
Caryophyllorum pulveratorum, } *ana Drachmam.*
Vini Hiſpanici . . . . *Pintam.*

Digere balneo maris per aliquot dies, vaſe clauſo identidem agitando, cola, filtra, & ſerva.

Tinctura Myrrhæ.

℞. Myrrhæ electæ contritæ . . . . *Uncias ij.*
Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libram*

Digere balneo maris. Filtra & ferva.

Eodem modo parantur TINCTURÆ { ALOES, SUCCINI, KINÆ-KINÆ, CASTOREI, CROCI, CINNAMOMI, &c.

NOTA. TINCTURA BALSAMI TOLUTANI ad Syrupum parandum, fit ex Balfami Tolutani *Unciis ij.* & Spiritûs Vini *Librâ ß.*

TINCTURA feu LIQUOR VISCERALIS.

℞. Corticum exteriorum recentium & incisorum Aurantiorum, . . . *Unciam.*
Spiritûs Vini rectificati . . . . *Uncias vj.*

Digere. Cola cum expreffione. Adde,

Extracti Chamædryos,
Abfinthii,
Menyanthes,
Tincturæ Martis aperientis, } *ana* . . . *Drachmas iij.*
Spiritûs Nitri dulcis . . . . *Uncias ij.*
Aquæ ftillatitiæ corticum Citreorum . . *Uncias vj.*

Digere iterum. Filtra.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Reguli Antimonii Martialis . . . . . . *Uncias iiij.*
Cupri puriffimi *vulgò de Rofette,*
Stanni anglicani optimi, } *ana*, *Uncias ij.*

Igne violento fundantur. Fufa effundantur in conum fuforium. Tum,

℞. Reguli hujus in pulverem redacti . . . *Uncias ij.*
Nitri puri, ficci & pulverati . . . . . . *Uncias vj.*

Mifce exactè, & paulatim in crucibulum candens injice; detonatione peractâ, crucibulum tegulâ tege. Igne violentiffimo liquefac & calcina. Materiam è cru-

cibulo

cibulo extractam & crassiusculè tritam, adhuc calentem mitte in matratium & illicò affunde,

Spiritûs Vini rectificatissimi . . . . . . *Libras ij.*

Digere donec Tinctura rubescat.

TINCTURA SALIS TARTARI.

℞. Salis Tartari . . . . *Uncias iiij.*

Fundantur in crucibulo. In mortarium ferreum calefactum effunde; illico indurescit; pulvera. Calens matratio inde. Statim affunde Spiritûs Vini *Libram.* Digere ad perfectam Tincturæ ruborem. Filtra & serva.

NOTA. LILIUM PARACELSI maximè accedit ad TINCTURAM SALIS TARTARI.

ELIXIR AMARUM.

℞. Radicis gentianæ . . . . *Uncias ij.*
Flavedinis Aurantiorum amarorum . . *Unciam.*
Coccinellæ . . . . *Drachmam.*
Spiritûs Vini . . . . *Libram iß.*

Digere per triduum. Filtra & serva.

ELIXIR PROPRIETATIS.

℞. Tincturarum Myrrhæ, Croci, Aloës, } *ana* . . . . . *Partes æquales.*

Misce, serva ad usum.

NOTA. Has Tincturas simul mixtas distilla & erit ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM.

ELIXIR STOMACHICUM.

℞. Ligni Aloës, Santali rubri, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Radicum Liquiritiæ . . . . *Unciam.*
Cinnamomi . . . . *Uncias ij.*

Galangæ minoris, Caryophyllorum, Zedoariæ, Cardamomi minoris,	ana . . . . *Drachmam.*
Seminum Anisi, Fœniculi, Granorum Kermes, Salis prunellæ, Terræ Japonicæ,	ana . . . . *Drachmas ij.*
Passularum mundatarum	*Uncias ij.*
Dactylorum	*Numero x.*
Florum Papaveris rhæados siccatorum, Rosmarini,	*ana Drach. ij.*
Spiritûs Vini	*Libras iiij.*

Digere per aliquot dies. Adde,

Sacchari albissimi . . . . *Libram.*

Filtra. Serva ad usum.

Elixir Vitrioli, A. Mynsicht.

℞. Galangæ minoris	*Unciam iß.*
Calami aromatici	*Unciam.*
Menthæ crispæ, Salviæ,	ana . . . . *Unciam ß.*
Cinnamomi, Caryophyllorum, Zinziberis,	ana . . . . *Drachmas iij.*
Nucis Moschatæ, Cubebarum,	ana . . . . *Drachmas ij.*
Corticum Citrei, Ligni Aloës,	ana . . . . *Drachmam.*
Sacchari albi	*Uncias iij.*
Spiritûs Vini rectificati	*Libras ij.*

Digere per triduum lenissimo calore, balneo arenæ, tum instilla paulatim,

Olei Vitrioli . . . . *Uncias iiß.*

Digere rursùs per triduum, eodem modo. Filtra per infundibulum vitreum, & ſerva.

ARTICULUS TERTIUS.

DE SALIBUS.

SAL eſt corpus ſapidum, cryſtallinum, diaphanum & ſolubile. Triplicis eſt generis.

1.° SAL ACIDUM, ſine caliditatis ſenſu linguam pungit, dentes hebetat, cum Alkali effervеſcit & Tincturæ Violarum aut *Tourneſol* (*Heliotropium tricoccum.* PIN. 253. *Croton tinctorium.* LIN. SP. 1425.) admixtum, rubrum colorem excitat.

2.° SAL ALKALI cum Acido effervеſcit, linguam urinoſi ſaporis inficit & acri ac urenti ſtimulo vellicat; Tincturam Violarum vel *Tourneſol* viridem reddit.

3.° SAL NEUTRUM, ex Alkali & Acido combinatis ad ſaturationem, oritur. Iterum diſtinguntur,

SALIA ESSENTIALIA quæ odorem, ſaporem, vel alias proprietates corporum è quibus excerpta ſunt retinent.

SALIA FIXA, ſublimationis incapacia ſunt. Solutio Salis Alkalini fixi LIXIVIUM dicitur.

SALIA LIXIVIALIA, è cineribus eliciuntur.

SALIA VOLATILIA, in auras avolant.

PARAGRAPHUS PRIMUS.

SALIA ESSENTIALIA.

SAL ESSENTIALE ACETOSÆ.

℞. Succi Acetoſæ per ſubſidentiam depurati. *Quantum. vol.*

Vaporet ita ut tertia pars circiter remaneat. Cola per chartam bibulam. Fiat vaporatio ad pelliculam. In vas Vitreum immitte. In cellâ repone, ut concreſcant cryſtalli,

Aquâ purâ abluendæ & exſiccandæ. Vaporationem, Cryſtalliſationem, & ablutionem denuò inſtitue donec cryſtallos omnes exhauſeris.

Nota. I. Simili modo parantur Salia ex omnibus plantis acidis, auſteris, aſtringentibus & amarulentis pauco oleo donatis.

II. Non abſimili modo præparantur Salia eſſentialia ex ſuccis fructuum.

III. Herbæ ſicciores, inter contundendum pauxillo Aquæ irrorentur, vel ſufficienti quantitate Aquæ elixentur; viſcoſæ, igne leni emolliantur.

PARAGRAPHUS SECUNDUS.

SALIA FIXA ACIDA.

Gilla Theophrasti.

℞. Vitrioli albi pulverati . . . . *Quantum vol.*

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ puræ. Filtra. Evapora ad pelliculam, balneo arenæ, in vaſe vitreo. Repone ad cryſtalliſationem.

Vitrioli calcinatio.

℞. Vitrioli viridis . . . . *Quantum vol.*

Calcina in crucibulo. Maſſa evadet ex albo cinericia; erit Vitriolum ad albedinem calcinatum.

Igne intenſiori maſſam urge. Colorem induet rubrum; & erit Colcothar. Vide *Aqua fortis*.

Nota. Æſtivo tempore Vitriolum romanum æſtuantis Solis ardore calcina; erit Pulvis Sympathicus.

Vitiolum Martis.

℞. Limaturæ Martis . . . . *Libram.*
Aquæ communis . . . . *Pintas iij.*
Spiritûs Vitrioli . . . . *Libram iß.*

Digere igne arenæ in matratio vitreo amplo, per viginti quatuor horas, sæpius agitando. Decanta. Filtra. Vaporet ad pelliculam. Repone in cellâ. Concrescent crystalli. Has collige. Decantationem, filtrationem, evaporationem & crystallisationem repete donec crystallos omnes exhauseris; collectas siccè in lagenâ ritè obturatâ serva.

SAL MARTIS, RIVERII.

℞. Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libram ß.*
Olei Vitrioli . . . . *Uncias iiij.*

Simul mixta, inde sartagini novæ ferreæ, asserva donec crystalli formentur, quas abrade & serva.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Limaturæ Argenti purissimi . . . . . . *Partem unam.*
Spiritûs Nitri . . . . *Partes iij.*

Argentum in Spiritu Nitri dissolve. Balneo arenæ dissolutio vaporet ad medias. Tùm crucibulo capaci inde, iterum igne moderato vaporet, donec cessante ebullitione, materia Olei instar liquescat. In modiolum fusorium calefactum prius & Sebo illitum effunde. Concretam massam exime, & siccè in lagenâ apprimè obturatâ serva.

PARAGRAPHUS TERTIUS.

SALIA ALKALINA FIXA.

SAL TARTARI.

℞. Tartari crudi triti . . . . *Quantum vol.*

Corniculis chartaceis siccis include; tùm Aquâ madefiant. Stratifica cum carbonibus. Igne aperto calcina ad albedinem. Massam calcinatam Aquâ solve. Lixivium filtra. Vaporet ad siccitatem.

NOTA. Sal Tartari in loco humido repone, in liquorem liquescet, filtra, erit OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

Nitrum Tartaro fixatum.

℞. Nitri puri, } ana . . . . Partes æquales.
Tartari crudi, }

Pulvera. Misce. Mitte in patellam. Materiam prunâ accende. Detonatione factâ, massam in Aquâ calente solve. Filtra. Vaporet ad siccitatem.

Nota. Nitrum Tartaro fixatum in loco humido repone, in liquorem liquescet. Filtra. Erit ALKAEST HELMONTII.

Nitrum Carbonibus fixatum.

℞. Nitri puri . . . . Quantum vol.

Liquefac in crucibulo capaci. Projice,

Carbonis pulverati . . . . Cochlear j.

Peractâ detonatione alterum cochlear projice. Repete, donec Nitrum nec fluat nec detonet. Calens è crucibulo exime. In Aquâ calente solve. Filtra. Vaporet ad siccitatem.

Nota. Nitrum Carbonibus fixatum, in cellâ repositum, in liquorem vertitur, ALKAEST GLAUBERI vel LIQUOR NITRI FIXI nuncupatum.

SALIA ALKALINA VOLATILIA.

Sal volatile Ammoniacum.

℞. Salis Ammoniaci . . . . *Libram.*
Salis Tartari . . . . *Libras ij.*

Seorsim pulverata Misce. Inde retortæ. Affunde,

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Uncias iiij.*

Receptaculum adapta. Commissuris obseratis stent simul per horas viginti quatuor. Balneo arenæ, igne primùm leni, postea aucto distilla. Distillatione absolutâ, vasis refrigeratis Sal volatile à Spiritu separatum servabis.

Nota. Spiritus elicitus, SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS ſeu DULCIFICATUS nominatur.

PARAGRAPHUS QUARTUS.

SALIA LIXIVIALIA.

SAL FIXUM LIXIVIALE PLANTARUM.

℞. Herbarum virentium & maturarum cum ſtipitibus . . . . *Quantum vol.*

Igne aperto combure in cineres. Calcina ad albedinem. Fiat Lixivium. Filtra. Vaporet ad ſiccitatem. In Aquâ purâ ſolve iterùm. Filtra, & vaporet ad ſiccitatem. Sal ſerva.

SAL PLANTARUM, TACHENII METHODO PARATUM.

℞. Plantæ cujuſlibet, recèns collectæ . . *Quantum vol.*

In cacabo ferreo combure; flammam, operculi ope impediendo, & maſſam virgâ ferreâ indeſinenter agitando. Cineres per unam alteramve horam calcina. Fiat Lixivium Aquâ fervente. Cola. Ad ſiccitatem vaporet. Siccè ſerva.

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cinerum clavellatorum . . . . *Libras ij.*
Calcis vivæ . . . . *Libram.*

Mitte in vas idoneum. Affunde paulatim,

Aquæ ferventis . . . . *Pintas xvj.*

Fiat Lixivium. Filtra. Vaporet ad ſiccitatem. Maſſam crucibulo inde. Calcina donec Olei inſtar fluat. In patinam calidam effunde. Lenteſcentem in fruſtula ſeca. Adhuc calentem in lagenis bene obturatis ſiccè ſerva.

PARAGRAPHUS QUINTUS.

SALIA NEUTRA.

Sal polychrestum solubile.

℞. Cinerum Kali hiſpanici . . . . *Quantum vol.*

Fiat lixivium. Cola. Dùm ebullit, injice cochleatim,

Cremoris Tartari pulverati . . . . *Quant. ſuffic.*

Ad ſaturationem. Liquorem calidum filtra. Vaporet ad pelliculam. Ad cryſtalliſationem repone.

Tartarum solubile.

℞. Salis Tartari . . . . *Uncias vj.*
Aquæ communis calentis . . . . *Pintas iiiiß.*

Solve. Lixivio calenti adde,

Cremoris Tartari tenuiſſimè triti, *circiter Uncias xij.*

Scilicet ad punctum ſaturationis. Bulliant leviter. Cola. Vaporatio fiat ad ſiccitatem.

Tartarum chalybeatum.

℞. Tartari ſolubilis . . . . *Uncias iiij.*
Tincturæ Martis . . . . *Libram.*

Vaporent ſimul balneo arenæ, ad ſiccitatem. Serva ſiccè in lagenâ benè obturatâ.

Nota. Difficilius deliqueſcit ſi cum Sale polychreſto ſolubili paretur.

Tartarum emeticum.

℞. Vitri Antimonii ſubtiliter pulverati, } *ana Partes æqual.*
Cremoris Tartari pulverati, }

Mixta bulliant in vaſe fictili vitreato per ſemi horam, cum,

Aquæ

Aquæ puræ . . . . *Quant. ſuffic.*

Liquorem calentem filtra. Repone in cellâ. Concreſcent cryſtalli. Cryſtallos exime. Evaporationem & cryſtalliſationem repete donec Sal totum exhauſeris. Cryſtallos omnes miſce & leviga.

TARTARUM VITRIOLATUM.

℞. Olei Tartari per deliquium . . . . . . *Quantum vis.*

Inde vaſi vitreo. Affunde guttatim,

Spiritûs Vitrioli . . . . *Quant. ſufficit,*

Ad perfectam ſaturationem. Filtra. Vaporet ad pelliculam. Repone ad cryſtallos obtinendas.

TERRA FOLIATA TARTARI.

℞. Salis Tartati puriſſimi . . . . *Partem unam.*

Inde in cucurbitam vitream. Affunde per vices, & agitando,

Spiritûs Aceti acerrimi, *circiter* . . . . *Partes xvj.*

Scilicet, ad punctum ſaturationis. Filtra. Vaporet igne leni ad ſiccitatem. Salinam maſſam ſolve in,

Aquæ communis . . . . *Suffic. quantit.*

Filtra. Vaporet ad ſiccitatem. Solutionem & evaporationem repete donec materia ſuperſit ſicca & foliacea. Serva in vaſe optime clauſo.

SAL PRUNELLÆ.

℞. Nitri puri . . . . *Uncias iiij.*

Mitte in crucibulum igni impoſitum. Nitro liquefacto injice per vices,

Florum Sulphuris . . . . *Drachmam ß.*

Peractâ deflagratione, crucibulo parùm refrigerato, Nitrum in pelvim ſiccam & calefactam effunde & continuò undequaque verſa ut expandatur. Exemptum ſerva.

Sal Mirabile, Glauberi.

℞. Salis marini decrepitati . . . . *Uncias viij.*

Mitte in crucibulum. Senſim affunde ſub camino,

Olei Vitrioli . . . . *Uncias vj.*

Vaporibus albis ceſſantibus, materiam è crucibulo exime. In Aquâ calidâ ſolve. Filtra. Vaporet. Cryſtalli quiete concreſcant.

Sal sedativum, Hombergii.

℞. Boracis depuratæ . . . . *Uncias iiij.*

Solve in Aquæ communis ferventis *ſufficienti quantitate.* Filtra. Affunde per vices ſaltem ad perfectam ſaturationem,

Olei Vitrioli concentrati, *circiter* . . . *Unciam iß.*

Effervefcentiâ pacatâ, ſine cryſtallos concreſcere. Sal exemptum Aquâ frigidâ ablue. Supra chartam bibulam ſicca & ſerva.

Nota. Sal ſedativum paratur quoquè per ſublimationem longiori proceſſu; ſed utriuſque eadem eſt virtus.

Lapis ophthalmicus.

℞. Vitrioli cærulei, Nitri, Aluminis rupei, } *ana* . . . . *Uncias vj.*

Pulvera. Miſce. Crucibulo inde. Liquefac balneo arenæ. Liquefactis adde,

Camphoræ pulveratæ . . . . *Drachmas ij.*

Miſce. Maſſam refrigeratam ſerva.

Lapis medicamentosus.

℞. Aluminis, Lithargyri, Boli Armenæ, } *ana* . . . . *Libram iß.*

Colcotharis . . . . *Uncias iij.*

Omnibus pulveratis, fiat maſſa cum ſufficienti quantitate Aceti. Maſſam exſicca igne aperto ſæpius agitando ſpathulâ ligneâ.

Sal Saturni.

℞. Ceruſſæ pulveratæ . . . . *Quantum vol.*

Inde vaſi vitreo. Affunde,

Acetum diſtillatum,

Ad eminentiam quatuor digitorum. Effervefcentiâ peractâ, digere balneo arenæ per tres dies, identidem agitando. Liquorem decanta. Superſtiti materiæ novum Acetum affunde. Digere & decanta ut ſuprà. Liquores omnes decantati & mixti vaporent lento igne ad pelliculam. Repone in loco frigido. Cryſtalli concreſcent. Per evaporationem & cryſtalliſationem repetitam, cryſtallos omnes ſine formari. Sicca & ſerva.

Nota. Liquor primò decantatus eſt Acetum Saturni.

ARTICULUS QUARTUS.

DE SAPONIBUS.

Sapo albus.

℞. Calcis vivæ fruſtulatim effractæ . . . . *Libras v.*
Cinerum Kali hiſpanici pulveratorum *Libras x.*

Bulliant in vaſe ferreo, cum,

Aquæ communis . . . . *Suffic. quantit.*

Coletur lixivium. Vaporet donec ponderando, menſura continens Aquæ communis Drachmas octo, contineat hujus lixivii concentrati Drachmas undecim. Tùm repone ad ſubſidentiam in vaſe vitreo clauſo.

℞. Hujus Lixivii . . . . *Partem j.*
Olei Amygdalarum dulcium . . . . . . *Partes ij.*

Misce in vase figulino vitreato. Sæpius spathulâ ligneâ donec materia spissescat agita, post aliquot dies in Saponem coalescet.

ARTICULUS QUINTUS.

DE CROCIS.

CROCUS MARTIS APERIENS RORE MAIALI PARATUS.

℞. Limaturæ Ferri . . . . *Quant. vol.*

Rori maiali expone vel Aquâ pluviali irrora, donec in rubiginem facessat. Super porphyritem leviga.

CROCUS MARTIS CUM SULPHURE PARATUS.

℞. Limaturæ Martis, } *ana* . . . . *Quantum vol.*
Florum Sulphuris, }
Aquæ fontanæ . . . . *Quant. suffic.*

Ut fiat pasta. Stet in fermentatione per quinque horas. Igne acerrimo calcina, sæpius spathâ ferreâ movendo, donec colorem purpureum acquisierit. Leviga & serva ad usum.

CROCUS MARTIS ASTRINGENS.

℞. Limaturæ Ferri . . . . *Quantum vis.*

In ollâ terreâ igne reverberii continuo per plures horas calcina, donec in pulverem rubicundum abierit. Aquâ multoties ablue. Exsicca. Leviga, & serva ad usum.

GLOBULI MARTIALES.

℞. Limaturæ Ferri . . . . *Partem j.*
Tartari crudi albi pulverati . . . . . . *Partes ij.*

Misce. Cucurbitæ inde. Affunde Aquæ vitæ ad eminentiam digiti. Radiis solaribus vel balneo maris digere ad siccitatem. Massæ exsiccatæ & pulveratæ Aquæ vitæ eandem quantitatem affunde. Digere ut supra. Toties id repete donec massa exsiccata, quasi resinosa appareat. Tum globulos ad ovi magnitudinem efforma.

APPENDIX.

ÆRUGO.

℞. Laminas Cupri . . . . *Quot volueris.*

Stratifica cum vinaceis Vino madidis, in cellâ repone donec Ærugine efflorescant, quam abrade & serva.

CERUSSA.

℞. Plumbi in laminas tenues redacti . . . . . *Quantum vol.*

Læmellæ suspensæ bullientis Aceti vapores excipiant. Vase obturato digere donec pulvis albus laminarum superficiei adhæreat. Pulverem à lamellis abrade & serva.

ARTICULUS SEXTUS.

DE SULPHUREIS.

KERMES MINERALE.

℞. Antimonii hungarici in frustula effracti. *Libras iiij.*

Ollæ satis amplæ inde. Super affunde,

Alkaest Glauberi . . . . *Libram.*
Aquæ pluviæ . . . . *Pintas viij.*

Per duas horas bulliant. Duas tertias liquoris bullientis partes per chartas bibulas filtra. Adde, in ollâ,

Aquæ pluviæ bullientis . . . . *Pintas v.*
Alkaeſt Glauberi . . . . *Uncias xij.*

Bulliant ut ſupra & duas tertias partes bullientes filtra. Tandem tertiæ parti ſuperſtiti adde,

Alkaeſt Glauberi . . . . *Uncias viij.*
Aquæ pluviæ ferventis . . . . *Pintas v.*

Bulliant ut ſupra. Liquorem bullientem filtra & cum aliis liquoribus repone. Subſidebit pulvis rubicundus; hunc pulverem rubicundum ſuper chartas bibulas edulcora Aquâ purâ. Sicca & ſerva ad uſum.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii puri . . . . *Unciam.*
Florum Sulphuris . . . . *Unciam iſs.*

In mortario vitreo tere, piſtillo quoque vitreo, donec mercurius ſit extinctus & pulvis intenſe nigreſcat. Serva ad uſum.

ÆTHIOPS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi præparati . . . . *Uncias ij.*
Mercurii puri . . . . *Unciam.*

Tere in mortario vitreo donec Mercurius ſit extinctus.

HEPAR SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris . . . . *Uncias vj.*
Salis Tartari . . . . *Uncias ij.*

Pulvera. Miſce. In patellâ terreâ vitreatâ funde. Materiam ubi colorem ſpadiceum induerit, effunde, & maſſam refrigeratam ſerva.

ARTICULUS SEPTIMUS.

DE MAGISTERIIS ſeu *PRÆCIPITATIS.*

Lac et Magisterium Sulphuris.

℞. Hepatis Sulphuris . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas vij.*

Bulliant ad Sulphuris perfectam ſolutionem. Filtra. Acetum diſtillatum affunde. Liquorem LAC SULPHURIS dictum poſt debitam quietem decanta. Pulverem præcipitatum ſeu MAGISTERIUM pluries Aquâ ablue, ſicca in umbrâ & ſerva.

Mercurius præcipitatus albus.

℞. Mercurii ſublimati corroſivi . . . . *Quantum vis.*

In ſufficienti quantitate Aquæ calidæ ſolve. Affunde guttatim Spiritus Salis Ammoniaci donec præcipitatio ſit abſoluta. Filtra. Aquâ calidâ pluries ablue. Sicca & ſerva.

Mercurius præcipitatus ruber.

℞. Aquæ Mercurii cauſticæ . . . . *Quantum vis.*

Lento igne vaporet ad ſiccitatem. In crucibulo materiam calcina ad rubedinem intenſam. Exime & ſerva.

NOTA. Hæc operatio impropriè dicitur Præcipitatio.

Mercurius præcipitatus flavus.

℞. Mercurii è Cinnabari redivivi, } *ana* . . *Uncias ij.*
Olei Vitrioli rectificati, }

Mercurium mitte in matratium amplioris colli. Affunde Oleum Vitrioli. Balneo arenæ digere ad diſſolutionem perfectam. Ignem auge ad ſiccitatem. Materiam exime. Tere in mortario vitreo. Conjice in Aquam

calentem. Præcipitatum pulverem flavum Aquæ lotionibus repetitis edulcora, ſicca & ſerva.

RESINA JALAPPÆ.

℞. Jalappæ optimæ reſinoſæ contuſæ . . . *Libram.*
Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libras iij.*

Digere balneo arenæ ut tinctura extrahatur. Filtra. Superſtiti materiæ novam Spiritûs Vini quantitatem affunde. Tincturam filtra. Repete donec Tincturæ amplius extrahi nequeant. Tincturas omnes miſce. Vaporent ad medias. Reſiduo affunde Aquæ frigidæ quantum ſufficit ut præcipitetur Reſina. Liquorem decanta. Magiſterium Aquâ ablue multoties. Exſicca, & ſerva.

Simili modo parantur RESINÆ { GUAJACI, SCAMMONII, &c.

ARTICULUS OCTAVUS.

DE REGULIS.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi . . . . *Libram.*
Tartari crudi . . . . *Uncias xij.*
Nitri puri . . . . *Uncias vj.*

Seorſim pulverata, miſce. In crucibulum candens cochleatim injice; ſingulis vicibus detonent cooperto crucibulo. Detonatione peractâ, auge ignem donec fluida ſit materia. Hanc fluentem in conum fuſorium calefactum & Sebo illitum effunde: antequam ſolideſcat materia conum concute ut Regulus præcipitetur. Materiam refrigeratam exime, & Regulum ictu mallei à ſcoriis ſepara.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

℞. Apicum clavorum ferreorum . . . . . . *Uncias viij.*
Antimonii hungarici pulverati . . . . . . *Libram.*

Clavis

Clavis candefactis in crucibulo, Antimonium adde. Antimonio liquato cum clavis, per vices injice,

Nitri . . . . *Uncias iij.*

Ad fusionem perficiendam. In conum fusorium, Sebo illitum & calefactum, materiam effunde: inter refrigerationem conum concute. Regulum à scoriis ictu mallei separa. Separatum tere. Liquefac in crucibulo cum,

Antimonii pulverati . . . . *Unciis ij.*

Injice per vices,

Nitri . . . . *Uncias iij.*

In conum fusorium effunde. Dùm refrigescit conum concute. Regulum à scoriis ut supra separa. Semel & iterum Reguli fusionem repete Nitro solo addito.

ARTICULUS NONUS.

DE TERRIS, CALCIBUS ET CALCIFORMIBUS.

CALX JOVIS.

℞. Stanni . . . . *Quantum vis.*

Liquefac in vase fictili plano non vitreato. Assiduè agita spathulâ ferreâ, donec in Calcem abeat.

PLUMBUM USTUM.

℞. Laminarum Plumbi, } *ana* . . . . . . *Quantum vis.*
Sulphuris pulverati, }

Stratifica in crucibulo, ita ut primum & ultimum stratum sit Sulphuris. Materiam prunâ accende, donec Sulphur totum consumptum fit.

MINIUM.

℞. Plumbi . . . . *Quantum vis.*

Liquefac in vase fictili plano non vitreato. Agita spathulâ

ferreâ donec abeat in pulverem primò ſubnigrum, dein flavum, tandem ruberrimum, cavendo ne vehementiori igne in maſſam vitream abeat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM NITRATUM.

℞. Antimonii electi pulverati . . . . *Partem j.*
Nitri puri . . . . *Partes iij.*

Seorſim pulverata & commixta, cochleatim in crucibulum candens injice. Peractâ detonatione, materiam albam adhuc calentem aufer & ſerva.

NOTA. I. Hoc Antimonium Aquâ calidâ edulcora & ſicca, erit ANTIMONIUM DIAPHORETICUM LOTUM: uſitatius.

NOTA. II. Loturas omnes commiſce & filtra. Leni igne vaporent ad pelliculam, in frigore præbebunt NITRUM STIBIATUM.

ANTIHECTICUM, POTERII.

℞. Reguli Antimonii martialis, } ana . . . *Unciam.*
Stanni anglicani, }

Liquefac ſimul in crucibulo. Refrigerata tere in pulverem. Adde,

Nitri puriſſimi pulverati . . . . *Uncias vj.*

Simul mixta cochleatim injice in crucibulum candens. Peractâ detonatione ignem materiam ex cinereo albeſcentem in Aquam calentem projice. Edulcora, exſicca & ſerva.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii rectificati . . . . . . *Uncias ij.*

Affunde guttatim, à vaporibus cavendo,

Spiritûs Nitri optimi circiter . . . . . *Uncias vj.*

Donec ceſſet efferveſcentia. Diſtilla ad ſiccitatem: igne lento maſſam albam ſuperſtitem calcina. Aquâ ablue multoties, ſicca & ſerva.

Nota. Liquor in diſtillatione elicitus eſt Spiritus Nitri bezoardicus.

Magnesia alba.

℞. Aquæ matris Nitri . . . . *Quantum vis.*

Vaporet ad ſiccitatem. Materiam ſuperſtitem calcina. In pulverem redige. Aquâ tepidâ edulcora. Exſicca & ſerva.

APPENDIX.

Aqua Calcis prima.

℞. Calcis vivæ . . . . *Libram.*

In vaſe idoneo loca. Senſim affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas x.*

Calce ritè extinctâ, miſturam conturba. Sine reſidere. Cola.

Aqua Calcis secunda.

Magmati Aquæ Calcis primæ affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Miſce. Sine reſidere per viginti quatuor horas. Filtra.

Aqua phagedænica.

℞. Aquæ Calcis primæ recentis, } *ana* . . *Pintam ß.*
Spiritûs Vini, }
Sublimati corroſivi . . . . *Grana xxx.*

Miſce in mortario vitreo. Serva ad uſum.

ARTICULUS DECIMUS.

DE VITRIS.

VITRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii pulverati . . . . *Libram.*

In ollâ fictili planâ non vitreatâ, igne leni in cinereum pulverem calcina, ſpathâ indeſinenter movendo donec nullos fumos edat. Pulverem hunc in crucibulum immitte: liquefac igne vehementi. Fuſam materiam ſupra patinam æneam effunde. Concreſcet in Vitrum hyacinthinum ſi proſperè ſucceſſerit operatio.

APPENDIX.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi pulverati, } *ana* . . . . *Partes æquales.*
Nitri pulverati, }

Miſce in mortario ferreo, latere cooperto. Prunâ accende: fiet detonatio, flammam coerce operculi ope. Materiâ refrigeratâ, Hepar à ſcoriis ſepara.

CROCUS METALLORUM.

℞. Hepatis Antimonii tenuiſſime triti . . *Quantum vol.*

Aquâ calente edulcora. Sicca & ſerva.

FINIS.

INDEX SIGNORUM CHYMICORUM.

○ Alumen, 138.
☉ Aurum, 141.
⊖ Sal marinum, 148.
⦶ Nitrum, 146.
🜖 Vitriolum, 150.
⊕ Ærugo, 138.
♀ Æs, 138.
🜫 Antimonium, 139.
🜫 Cinnabaris, 143.
♂ Ferrum. 143.
♉ Sal gemmæ, 147.
☽ Argentum, 140.
☾ Argentum, 140.
o-o Arsenicum, 140.
8 Arsenicum, 140.
OO Auripigm. 140.
♆ Calx, 142.
‡ Cerussa, 142.
✳ Sal Ammoniacum, 147.
🝛 Alumen, 138.
🝛 Borax, 142.
◇ Antimonium. 139.
▽ Aqua, 139.
🜍 Sulphur, 149.
◇-(Sal Gemmæ, 147.
℈ Scrupulus, 156.
☿ Mercurius, 145.
≈ Aqua, 139.
℥ Uncia, 155.
ʒ Drachma, 156.
ʒʒ Cinnabaris 143.
♃ Stannum, 148. *Aliquando hoc signum pro ℞ abusivè ponitur.*
B Bismuthum, 141.
℞ Recipe, 157.
W Borax, 142.
X Talcum, 150.
Z Zincum, 150.
@ Ana, 157.
♄ Plumbum, 147.
℔ Libra, 155.
ß Semis, 155, 156.

INDEX RERUM ET VERBORUM.

A.

A. Ana, 157.
AA. Ana, 157.
Abeille, 122.
Abelmoschus [Hibiscus], 27.
Abies, 11.
Absinthium, 9, 12, 106.
Abricotier, 22.
Abrotanum, 9, 11, 53.
Acacia, 4, 12, 21, 75.
Acajou, 18.
Acanthus, 7, 12, 13.
Accipenser, 119, 121.
Acetabulum, 121.
Acetosa, 9, 13.
Acetosella [Oxalis], 77.
Acetum, 4, 115.
Acetum antipestilentiale, 178.
camphoratum; 178.
distillatum, *id est*, Spiritus Aceti, 263.
è Dracunculo hortensi, 179.
è floribus Sambuci, 179.
è Rosis rubris, 179.
Lithargyri, *id est*, Acetum Lithargyratum, 179.
Saturni *id est* Acetum lithargyratum, 179, 291.
Scilliticum, 179.
Quatuor latronum, *id est*, Acetum antipestilentiale, 178.
Ache, 21.
Achillea, 15, 81, 95.
Acidus Spiritus, *quid*, 255.
Acidum vitriolicum, 264.
Acier 143.
Aconitum, 10, 13, 20.
Acorus, 3, 13, 33.
Actes [Grana], 102.
Adeps, *quid*, 118.
Adiantum, 10, 13, 14.
Adipis præparatio, 163.
Adragante [*Gomme*], 113.
Æluropus, 62.
Ærugo, 138, 293.
Æs, 138.
Æsculus, 40.
Æther, 264.
Æthiops Antimonii, 294.
mineralis 294.
Ætites, 136, 138.
Agallochum, 75.
Agaricus, 10, 14, 15.
Ageratum, 9, 15.
Agrifolium, 21.
Agrimonia, 8, 15.
Agripalma, 36.
Agnus, 131.
Agnus castus, 4, 15.
Ail, 16.
Aimant, 145.
Airelle, 115.
Ajuga, 32.
Album coctum, *id est*, Emplastrum de Cerussâ, 246.
Album græcum, 124.
Alce, 119, 121.
Alcea. 6, 15.
Alembicus, *quid*, 158.
Alisma, 53.
Alkaest Helmontii, 286.
Alkaest Glauberi, 286.
Alkalinus Spriritus, *quid*. 255.
Alkanna, 19.
Alkekingi, 6, 16.
Alkimilla, 9, 15.
Alkool, *quid*, 160, 162.
Alleluia, 77.
Alliaria, 6, 16.
Allioprasum, 6, 16.
Allium, 6, 16, 41, 94.
Alnus, 16, 54.
Aloë, 4, 16, 17.
Aloës (Lignum), 3, 75.
Aloës lotio, 169.
Alsine, 17, 109.
Althæa, 6, 17.
Althææ Mucago, 163.
Alumen, 136, 138, 148.
Aluminis purificatio, 163.
ustio, 164.
Alun, 138.
Amalgama, *quid*, 161.
Amandier, 18.
Amaracus, 77.
Ambarvalis [Flos], 93.
Ambra, 137, 139.
Ambre gris, 138.
Ambre jaune, *id est*, Succinum, 149.
Ambrosia, 85.
Ambrosinæ [Amygdalæ], 18.
Amiantus, 136, 139.
Ammi, 4, 17.
Ammoniaci Gummi purificatio, 164.
Ammoniacum [Gummi], 5, 17; [Sal], 136, 147.
Amomum, 4, 18, 36, 91, 117.
Ampelitis [Terra], 149.
Amyanthus, *lege* Amiantus, 136, 139.
Amygdalis similis, 32.
Amygdaloïdes, 29.
Amygdalus, 4, 18, 90.
Amylum, 113.
Amyris, 26, 54.
An, 157.
Ana, 157.
Anacampseros, 8, 18.
Anacardium, 4, 18.
Anagallis, 19, 27.
Anas, 119, 121, 122.
Anchusa, 3, 19, 31.
Ancolie, 21.
Andropogon, 70, 84.
Androsace, 120, 121.
Anemone, 66, 96.
Anethum, 8, 19, 58.
Angelica, 3, 19, 74.
Anguilla, 119, 122.
Anguria, 44.
Anime [Gummi], 5, 19.
Anis, 20.
Anisum, 4, 20.
Anonis, 2, 7.
Anser, 119, 122.
Anthemis, 42, 96.
Anthirrhinum, 51, 54, 76.
Anthophyllus, 38.
Anthora, 10, 20.
Anthos, 99.
Anthillis, 117.
Antidotum, *quid*, 216.
Antihecticum Poterii, 298.
Antimonii præparatio, 165.
Antimonium, 139.
Antimonium diaphoreticum, 298.
Apalachine, 30, 20.
Aper, 122.
Aphronatron, 146.
Apis, 120, 122.
Apium, 8, 20, 21, 29, 90. 91.
Apotheca, *quid*, 158,
Apozema, *quid*, 172.
Apparine, 5, 21, 24.
Aqua, 136, 139.
Aqua benedicta Rulandi; *id est*, Vinum emeticum, 180.
Calcis, 299.
Castorei, 258.
chrysulca, *id est*, Aqua regia, 266.
Cinnamomi, 258.
Essentialis, *quid*, 257.
Fortis, 265.

Aqua fortis composita, *id est*, Aqua regia, 266.
hungarica, *id est* Aqua Reginæ Hungariæ, 262.
Mater Nitri, 169.
Melissæ composita, 261.
Mercurii caustica, 265.
Millesflorum, 123.
phagedenica, 300.
Rabeliana, 266.
Regalis, *id est*, Aqua Regia, 266.
Regia, 266.
Reginæ Hungariæ, 262.
Stygia, *id est*, Aqua regia, 266.
theriacalis, 259.
Vegeto-mineralis, *id est*, Liquor saturninus, 179,
Vinosa, 255.
Vitæ, 115, 159.
Vulneraria, 261.
Aquæ distillatæ, 255; *quomodo eliciuntur simplices*, 256.
Aquifolium, 21.
Aquila alba, *id est* Mercurius sublimatus dulcis, 274.
Aquilegia, 10, 21.
Arabicum (Gummi), 5, 12.
Araliastrum, 62.
Arbor baccifera, 49.
cacavifera, 32.
excæcans, 75.
febrifuga, 71.
fructu Dactylis simili, 88.
Arbutus, 116.
Arcanum duplicatum, 265, *id est*, Tartarum vitriolatum, 289.
Archangelica, 19, 72.
Arctium, 27.
Ardens Spiritus, *quid*, 255.
Ardesia, 136, 140.
Ardoise, 140.
Areca, 40.
Argentina, 8, 22.
Argentum, 137, 140.
Argilla. 142, 149, 150.
Aries, 131.
Ari Fecula, 165.
Aristolochia, 3, 10, 22, 107.
Armeniaca [Malus], 8, 22, 23.
Armenus (Lapis), 136, 140.
Armoise, 23.
Arnica, 53.
Arrete-Bœuf, 20.
Arroche, 24.
Arsenicum, 137, 140.
Arthanita, 50.
Artemisia, 9, 11, 12, 23, 54, 106.
Artichaut, 44.
Arum, 23, 54.
Arundo, 23, 34.
Asarum, 9, 23.
Asclepias, 6, 23.
Aselli, 131.
Asinus, 119, 122.
Aspalathus, 3, 23, 141.
Asparagus, 6, 24.
Asperula, 24,
Aspic, 73.
Asplenium, 14, 41, 76.
Assare, *quid*, 162.
Assa dulcis, 29.
Assa fetida, 5, 24.
Astacus, 123.
Aster, 55.
Astragalus, 113.
Athamentha, 52, 81.
Athanasia, 111.
Attractilis, 37.
Atriplex, 9, 24, 31.
Atropa, 28, 78.
Attriplex, *lege*, Atriplex, 24.
Aveline, 24.
Avellana, 9, 24, 32,
Avena, 10, 25.
Aûne, 16, 50.
Aûnée, 55.
Avoine, 25,
Aurantium, 8, 25.
Aurea mala, 77.
Aureliana, 61.
Aurichalcum, 150.
Aurificum minerale, *id est* Kermes minerale, 293.
Auricula Judæ, 10, 25.
Muris, 91.
Auripigmentum, 137, 140.
Aurone, 11.
Aurum, 137. 141.
Axungia, *quid*, 118.
Azarum, 68, *vide* Asarum, 9, 23,

B.

BAccæ, 4.
Baccille, 48.
Badian, 4, 20.
Badianifera, *ibidem*.
Baguenaudier, 45.
Balanus myrepsica, 4, 25.
Balaustia, 96.
Balaustium, *ibidem*,
Balena, 126.
Ballota. 79.
Balneum, *quid*, 159.
Balsamina, 82.
Balsamum, 5, *quid*, 230.
Balsamum Arcei, 227.
Commendatoris, 276.
Copaïba, 25.
ex Peru, 26.
judaïcum, *ibidem*.
Lucatelli, 235.
Peruvianum, 26.
Sulphuris anisatum, 272.
Balsamum Sulphuris juniperinum, 272.
succinatum, *ibidem*.
Terebinthinatum, *ibidem*.
Syriacum, 26.
Tolutanum, *ibidem*.
Tranquillans, 236.
traumaticum, *id est*, commendat. 276.
Viride Metensium, 236.
Bamia, 4, 27.
Ban, 32.
Barbadensis (Aloë), 17.
Barbarea, 7, 27.
Bardana, 9, *ibidem*.
Basilic, 86.
Baume de Capahu, 25.
de Judée, 26.
de la Mecque, ibidem.
de Tolu, ibidem.
Bdellii purificatio, 164.
Bdellium, 5, 27.
Beccabunga, *ibidem*.
Bec de Grue, 61.
Bedeguar, 128.
Been, *vide* Behen, 38, 28.
Belladona, *ibidem*.
Belemnites, 141.
Belliricæ [Mirobalani] 82.
Bellis, 9, 28, 29.
Ben, 25,
Benoite, 38.
Benzoïnum, 5, 29.
Berberis, 8, 29.
Berce, 109.
Ber indica, 71,
Berle, 29.
Bernardus heremita, 120.
Berula, 8, 29.
Berus (Coluber), 133.
Beta, 9, 29.
Betonica, 7, 29, 105.
Betula, 9, 16, 30.
Bezoard, 124, 125, 136.
Bezoardicum minerale, 298.
Bilanx, *qomodo eligenda*, 156.
Bismalva, 17.
Bismuthum, 137, 141.
Bistorta, 9, 30.
Bitumen Gagates, 144.
Judaïcum, 137, 141.
Lithantrax, 142.
Petroleum, 147.
Blaireau, 133.
Blanchet, quid, 158.
Bled noir, 57.
Bleuet, 50.
B. M. *id est*, Balneum mariæ, 157, 159.
Bœuf, 123.
Bois d'Aloës, 75.

Bois d'Aspalat, 25.
amer de Surinam, 75.
Genti, 112.
Néphrétique, 75.
de Roses, *ibidem.*
Bol, *id est*, Bolus, 157.
Bol d'Arménie, 142.
Boletus, 15, 16.
Boli præparatio, 165.
Bolus Armena, 136, 142.
orientalis, 142.
Bombax, 30.
Bombyx, 120, 123.
Bon, 32.
Bongo-pala. 89.
Bonne-Dame, 24.
Bontia, 18.
Bonus Henricus, 9. 30.
Boracis purificatio, 164.
Borax, 136, 142, 144, 148.
Borrago, 6, 20.
Bos, 119, 123.
Boschas, 121.
Botanica, *quid*, 2.
Botrys, 3, 31.
Bouc, 124.
Boucage. 92.
Bougie, quid, 230.
Bouillon blanc, 114.
Bovista, 48.
Bouleau, 30.
Bouquetin, 129.
Bourgene, 59.
Bourrache, 30.
Bousserole, 116.
Branca ursina, 12.
Brassica, 7, 31, 32, 55, 84, 97, 108.
Bray sec, 45.
Brebis, 131.
Britannica, 73.
Brochet, 130.
Brunella, 7, 31.
Bruscus, 100.
Bryonia, 6, 31, 68, 107.
Bryoniæ Fecula, 165.
B. V. *id est*, Balneum vaporis, 15, 159.
Bubon, 59, 91.
Bufo, 119, 123.
Bufonites, 196.
Bufonum ustio, 165.
Bugle, 31.
Buglossum, 6, 19, 31, 54.
Bugrande, 20.
Bugula, 7, 31, 32.
Buis, 32.
Bunias, 32.
Bursa pastoris, 6, 32.
Bursera, 108.
Butua, 89.
Butyri maialis præparatio, 166.
Butyrum Antimonii 274.
Cacao, 232.
Buxerole, 116.
Buxus, 9, 32.

C.

CAapeba, 89.
Cabaret, 23.
Cabureiba, 26.
Cacao, 4, 32.
Cachalot, 126.
Cachou, 40.
Cactus, 87.
Cade, 70.
Cadmia, 142.
Café, 32.
Caille-lait, 60.
Cajou, 18.
Calaminaris, 142.
Calaminaris præparatio, 166.
Calamintha, 7, 33, 64.
Calamus, 3, 13, 33, 84.
Calcifraga, 48.
Calcinare, *quid*, 162.
Calcite, 143.
Calcitrapa, 9, 34.
Calculus, 123, 124, 126, 127.
Calebasse, 49.
Calendula, 9, 34.
Calomelas Riverii, 274.
Caltha, 34.
Calx, 142, 143, 145.
Calx Antimonii, *id est*, Antimonium diaphoreticum, 298.
Calx Jovis, 297.
Cambogia, 64.
Camelus, 119.
Camomille, 42.
Camphora, 34.
Camphorata, 35.
Champhorosma, *ibidem.*
Camphre, 34.
Camphrée, 35.
Canadense (Balsamum), 11.
Canard, 121.
Cancellus, 120, 124.
Cancer, 120, 123, 124.
Candisare, *quid*, 162.
Canella, 35, 39, 44, 59.
Canelliforma (Arbor), 39.
Caniram, 85.
Canis, 119, 124, 134.
Cannabis, 10, 35.
Canne de Sucre, 23.
Cantara, 57.
Cantharis, 120, 124.
Cantharus, 132.
Capandu (*Pomme*), 94.
Capillaire, 13, 14.
Capillus Veneris, *ibidem.*
Capitellum, *quid*, 158.
Capparis, 3, 35.
Capra. 119, 124, 125, 129.
Capreolus, 126.
Capricerva, 124.
Caprier, 35.
Caprifolium, 6, *ibidem.*
Capsicum, 4, *ibidem.*
Capucine, 84.
Caput mortuum, *quid*, 161.
Caranna, 5, 35.
Caragne (*gomme*), 35.
Carbo, 137, 142.
Carcapulli, 64.
Cardamindum, 84.
Cardamine, 6, 36.
Cardamomum, 4, *ibidem.*
Cardiaca, 7, *ibidem.*
Cardinalis (Flos), 77.
Carduus, 9, 12, 34, 37, 53.
Carica, 57.
Carlina, 9, 37.
Carota, 52.
Carpe, 125.
Carpio, 119, 125.
Carpobalsamum, 4, 26, 38.
Carthamum, 4, *ibidem.*
Carvi, 4, *ibidem.*
Carum, *ibidem.*
Caryocostinum, 209.
Caryophyllata, 8, 38, 39.
Caryophyllus, 4, 8, 38, 39, 91, 104.
Cascarilla, 3, 39.
Casse-pierre, 103.
Cassia, 3, 4, 35, 39, 106.
Cassia cocta, 217.
Cassine, 20.
Cassis, 63.
Castanea, 8, 9, 40.
Castor, 119, 125.
Castoreum, 125.
Catalongay, 57.
Cataplasma, *quid*, 230.
Cataplasma emolliens, 254.
Catapotia, *quid*, 225.
Cataputia, 10.
Cataria, 85.
Catechu, 4, 40.
Catechu purificatio, 166.
Catelli, 124.
Catedon, 126.
Cattu-tirpali, 93.
Caviar, 121.
Causticum lunare, *id est*, Lapis infernalis, 285.
Cedrus, 70.
Celeri, 21.
Cementare, *quid*, 163.
Cementum, *quid*, *ibidem.*
Cendres gravelées, 143.
Centaurea, 28, 34, 37, 40, 50.
Centaurium, 40.
Centimorbia, 40.
Centinodia, 89.
Cepa, *vel* Cepe, 6, 40.
Cera, 122.
Cerasus, 8, 41.
Ceratum, *quid*, 230.
Ceratum amygdalinum, 244.
lithargyratum, 245.

Ceratum

Ceratum refrigerans Galeni, 244.
Cerefolium, 41, 83.
Cerevisia anti-scorbutica, 180.
diuretica, 180.
Cereus, 254, *quid*, 230.
Cerf, 125.
Cerfeuille, 41, 83.
Cerisier, 41.
Cerussa, 142, 293.
Cerussæ præparatio, 165.
Cervus, 119, 121, 125, 126.
Cestiana (Malus), 94.
Cete *vel* Cetus, 119, 126.
Ceterach, 4, 10.
Cevadilla, 4, 41.
Chaa, 111.
Chacril, 39.
Chærophyllum, 8, 41.
Chalcitis, 143.
Chalybs, *ibidem.*
Chamæcyparissus, 11.
Chamæcystus, 65.
Chamædrys, 7, 42, 79, 104.
Chamæleon, 9, 37.
Chamemælum, 9, 42.
Chamæpitys, 7, *ibidem.*
Chamomilla, 42.
Chanvre, 35.
Charbon, 142.
Chardon, 37, 55.
Charta bibula, *quid*, 158.
Emporetica, *ibidem.*
Chasse-Puce, 45.
Chausse-trappe, 34.
Chaux, 142.
Cheiranthus, 70.
Cheiri, 7, 71.
Chelidonia, 43.
Chelidonium, 8, 43.
Chene, 68, 96.
Chenopodium, 24, 30.
Chermes, 126.
Chevre, 124.
Chevreaux, 124.
Chevre-feuille, 35.
Chiansou, 48.
Chicorée, 43.
Chien, 124.
Chiendent, 62.
China, 3, 43.
Chymia, *quid*, 1.
Chou, 31, 108.
Chrysanthemum, 28.
Chrysocolla, 142.
Cicer, 7, 43.
Cichorium, 9, 43, 55.
Cicla, 29.
Cicuta, 21, 43.
Cicutaria, 83.
Cimbalaria, 51.
Cinabre, 143.
Cinara, 9, 44.
Cinchona, 71.
Cinerarium, *quid* 159.
Cineres clavellati, 143.
Cinips, 127.
Cinnabaris, 143.
Cinnabaris Antimonii, 274.
factitia, 273.
præparatio, 165.
Cinnamomum, 3, 35, 39, 44, 58.
Circium, 37.
Cissampelos, 89.
Cistus, 65, 71.
Citreum (Malum), 8, 44.
Citronelle, 80.
Citronier, 44.
Citrouille, ibidem.
Citrulus, 6, *ibidem.*
Citrus, 25, 44, 76.
Civetta, 134
Clarificatio, *quid*, 160.
Clematitis, 7, 22, 44, 90.
Cloportes, 131.
Cloux, 38.
Clysma, *quid*, 172.
Clyster, *quid*, *ibidem.*
Cnidia [Grana, *seu* Cocci], 112.
Cnicus, 37, 38.
Cocci Cnidii, 112.
Coccinella, 120, 127.
Cocculæ, 44, 97.
Cocculus, 4, 44.
Coccus, 120, 126, 127.
Cochl. *id est*, Cochleare, 157.
Cochenille, 127.
Cochlea, 120, 126.
Cochlearia, 6, 45, 85.
Cochon, 132.
Codam-pulli, 64.
Coffea, 432.
Cohobatio, *quid.* 162.
Coignassier, 51.
Coissi (Lignum), 75.
Colare, *quid*, 160.
Colatura, *quid*, *ibidem.*
Colchicum, 6, 45, 66.
Colchothar, 143, 263, 284.
Colocynthis, 4, 45.
Colophonia, 5, 45.
Coloquinte, ibidem.
Colpesce. 121.
Colsat, 32.
Coluber, 133.
Colum, *quid*, 158.
Columba, 119, 127.
Colutea, 7, 45.
Concha, 127.
Concombre, 49.
Conditum, *quid*, 202.
Confectio, *quid*, 206.
Confectio Alkermes, 223.
Hamech, 219.
Hyacinthina, 224.
Coni Cupressi, 50.
Conium, 43.
Conquassare, *quid*, 160.
Conserva, *quid*, 202.
Conserva Absinthii, 204.
Acetosæ, *ibidem.*
Conserva Anthos, 204.
Betonicæ, *ibidem.*
Calendulæ, *ibidem.*
Cochleariæ, *ibidem.*
Corticum Citri, 205.
Lilii convallium, 204.
Oxytriphylli, 204.
Pæoniæ, *ibidem.*
Primulæveris, *ibidem.*
Rosarum rubrarum, 204.
Salviæ, 204.
Tunicarum, 204.
Violarum, *ibidem.*
Consolida, 31, 45, 115.
Consoude, 45.
Contrayerva, 3, 46.
Convallaria, 76, 94.
Convolvulus, 68, 79, 89, 104, 108, 113.
Conus fusorius, *quid*, 160.
Conysa, 9, 45.
Copahu [*Baume*], 25.
Copaïba [Balsamum], 5, 25.
Copaïfera, 25.
Copal, 5, 46.
Coq, 129.
Coque de levant, 44.
Coquelicot, 89.
Coquelourde, 95.
Coqueret, 16.
Corallina, 46, 120, 127.
Corallium, *vel* Corallum, 46, 120, 130.
Corallorum præparatio, 166.
Cordia, 105.
Coriandrum, 4, 47.
Cormier, 109.
Cornouiller, 47.
Cornu Cervi calcinatio, 166.
Philosophica præparatio, 167.
Spargirica, *id est* philosop. præratio, 167.
Cornu cervinum, 47.
Cornus, 47, 54.
Cornuta, *quid*, 159.
Corona imperialis, 6, 47.
Corona Solis, 65.
Coronopus, 47, 85.
Cortex Eleuterii, 39.
peruvianus, 71.
peruvianus aromaticus, 39.
Winteranus, 3, 35, 47.
Cortices Citri conditi, 205.
Aurantiorum conditi, *ibidem.*
Corylus, 24, 25.
Costus, 3, 35, 48.
Coton, 30.
Cotonea [Malus], 51.
Cotula, 42.
Cotyledon, 116.

Courbaril, 19.
Courge, 49.
Couperose, 150.
Court-pendue [*Pomme*], 94.
Crabe, 123.
Craie, 143.
Crapaud, 123.
Crapaudine, 107.
Crategus, 109.
Craticula, *quid*, 159.
Crepitus Lupi, 10, 48.
Cresson, 36, 84, 85.
Creta, 136, 143.
Cretæ præparatio, 165.
Crithmum, 8, 48.
Crocus, 4, 48.
Crocus Antimonii, *id est* Hepar Antimonii, 300.
Antimonii lotus, *id est*, crocus metallorum, 300.
Martis astringens, 292.
Martis aperiens Sulphure paratus, 292.
Rore maïali paratus, 292.
Metallorum, 300.
Croisette, 49.
Croton, 39, 72, 283.
Cruciata, 5, 49.
Crucibulum, *quid*, 159.
Crystallisare, *quid*, 162.
Crystallus mineralis, *id est*, Sal prunellæ, 289.
Cubebæ, 4, 49.
Cucubalus, 28.
Cucumer, 6, 49.
Cucumis, 45, 49, 80.
Cucurbita, 6, 49, 44.
Cucurbita, *quid*, 158.
Cucurbitifera, 57.
Cuguacu-été, 126.
Cuivre, 138.
Cuminum, 4, 38, 49.
Cuniculus, 119.
Cunila, 87.
Cupressus, 4, 9, 50.
Cuprum, 137, 138, 140, 145.
Curcas [Jatropa], 98.
Curcuma, 3, 50.
Curtipendula [Poma], 94.
Cuscuta, 50.
Cyanus, 9, 50.
Cycas, 100.
Cyclamen, 6, 50.
Cydoniorum Mucago, 163.
Cygne, 43.
Cydonium *vel* Cydonia, 8, 50.
Cymbalaria, 7, 51.
Cyminum, 49.
Cynips, 120, 127, 128.
Cynoglossum, 5, 51.
Cynorrhodos, *vel* Cynosbatos, 51.
Cynosorchis, 103.
Cyparissias, 56.
Cyperus, 3, 46, 50.
Cyprès, 50.
Cyprinus, 125.
Cytiso-Genista, 61.
Cytisus, 75.

D.

DActyli, 4, 88.
Dactylon (Gramen), 10.
Daphne, 112.
Daphnoïdes, 90, *ibidem*.
Datura, 110.
Daucus, 4, 8, 52.
Decantare, *quid*, 160.
Decoctum album Sydenhami, 174.
albumCodicisLillensis, *id est*, Decoctum Scorzoneræ compositum, 175.
amarum, 174.
antiscorbutic. 175.
emolliens, 173.
Foresti, 175.
Laxans, 173.
seu Ptisana regia, 174.
Scorzoneræ compositum, 175.
Sudoriferum, 176.
Decorticare, *quid*, 161.
Decrepitare, *quid*, 162.
Defecare, *quid*, 160.
Deflagratio, *quid*, 163.
Deliquium, *quid*, 162.
Delphinium, 109.
Dens Leonis, 52, 91.
Dentifricium, 224.
Depurare, *quid*, 160.
Despumatio, *quid*, *ibidem*.
Detonatio, *quid*, 163.
Diacatholicum, 217, 218.
Diacodium, *id est*, Syrupus de Papavere albo, 187.
Diacridium, *vel* Diagridium, 164.
Dianthus, 39.
Diapensia, 102.
Diaphœnicum, 218.
Diaphoreticum minerale, *id est*, Antimonium diaphoreticum, 298.
Diascordium, 221.
Dictamnus, 3, 10, 52, 53.
Digestio, *quid*, 161.
Digitalis, 7, 53, 63, 107.
Diplolepis, 128.
Dipsacus, 8, 53.
Dispensatio, *quid*, 160.
Dissolvere, *quid*, 161.
Distillare, *quid*, *ibidem*.
Dompt-venin, 23.
Doronicum, 9, 53.
Dorstenia, 46.
Dos, *id est*, Dosis, 157.
Douce-amere, 54.
Drachma, *quid*, 156.
Draco arbor, 102.
Dracontium, 53.
Dracunculus, 9, 10, 53, 54, 95.
Drakena, 46.
Drosera, 99.
Dulcamara, 6, 54.

E.

EAu des Carmes, *id est* Aqua Melissæ composita, 261.
Eboris calcinatio, 167.
Ebulus, 54.
Ebur, 128, 136.
Echinus, 128.
Echium, 54.
Éclaire, 43.
Eclegma, *quid*, 185.
Écorce de Winter, 47.
Écrevisse, 123.
Églantier, 51.
Élan, 121.
Elaphus, 125.
Elaterium, 49.
Elatine, 54.
Electarium, *quid*, 213.
Electuarium, *quid*, 213.
è Scordio, *id est*, Diascordium, 221.
Hieræ-picræ, 220.
Lenitivum, *ibidem*.
Elemi, 5, 54.
Eleosaccharum, *quid*, 185.
Eleoselinum, 21.
Elephantus, *vel* Elephas, 119, 128.
Elettari, 18, 36.
Eleuterii Cortex, 39.
Elixir, *quid*, 275.
amarum, 281.
proprietatis, 281.
stomachicum, *ibidem*.
Vitrioli, A. Mynsicht, 282.
Elychrysum, 62.
Embroche, *quid*, 172.
Emeraude, 148.
Empetrum, 48, 66.
Empireuma, *quid*, 161.
Emplastrum, *quid*, 230.
ad herniam, 249.
Andreæ à cruce, 245.
Contra rupturam, *id est*, ad herniam, 249.
de Betonicâ, 245.
de Cerussâ, 246.
de Cicutâ, *ibidem*.
de Lapide Calaminari, *id est*, Emplast. griseum, 248.

Emplastrum de Meliloto, 249.
de Mucaginibus, 249.
de Ranis, *id est*, de Vigo, 252.
de Vigo, 252.
Diachilum gummatum, 246.
simplex, 246.
Diapalma, 247.
Divinum, *ibidem*.
Epispasticum, 248.
Griseum, *ibidem*.
Norimbergense, 250.
Oxycroceum, 250.
saponaceum, 251.
stipticum Crollii, 251.
Vesicatorium, *id est*, empl. Epispasticum, 248.
Emulsio, *quid*, 184.
communis, 202.
Encens mâle, 87.
Enchiloma, *quid*, 275.
Endivia, 9, 55.
Enema, *quid*, 172.
Ens Martis, *id est*, Flores Salis Ammoniaci martiales, 272.
Enula, 9 55.
Epidendrum, 114.
Épine blanche, 109.
Épine vinette, 29.
Epithema, *quid*, 172.
Epithymum, 50.
Éponge, 128, 132.
Épurge, 112.
Equisetum, 10, 55.
Equus, 119, 123.
Erigeron, 106.
Erinacei ustio, 165.
Erinaceus, 119, 128.
Eruca, 6, 27, 55.
Ervilia, 88.
Ervum, 74, 88.
Eryngium. 8, 55, 56.
Erysimum, 6, 16, 27, 56, 57.
Escargot, 126.
Esox, 130.
Espercelle, 109.
Essentia, *quid*, 161.
Estragon, 53.
Esturgon, 121.
Esula, 10, 56.
Esulæ præparatio, 167.
Étain, 141, 148.
Etamine, *quid*, 158.
Evonimo affinis, 20.
Eupatorium, 9, 56, 15.
Euphorbia, 56, 112.
Euphorbii purificatio, 164.
Euphorbium, 5, 56.
Euphrasia, 7, 57.
Excipiens, *quid*, 159.
Excœcaria, 75.
Excorticare, *quid*, 161.
Explosio, *quid*, 163.
Extinguere, *quid*, 162.
Extractum, *quid*, 181.
Absinthites, 181.
Agrimoniæ, 181.
Cardui benedicti, 181.
Catholicum, 183.
Centaurii minoris, 181.
Cichorii, 182.
Cicutæ, *ibidem*.
Colocynthidis, 181.
Croci, 182.
DentisLeonis, 182.
Enulæ campanæ, 182.
Fumariæ, *ibidem*.
Gentianæ, 182.
Hellebori nigri, 182.
Juniperi, 182.
Kinæ-Kinæ, 182.
Lapathi, 182.
Menyanthes, 182.
Opii, 184.
Rhei, 182.
seu Sal Kinæ, 184.
Saturni, *id est*, Acetum litargyratum, 179.
Thebaïcum, *id est*, Extract. Opii, 184.
Exungulare, *quid*, 161.

F.

Faba, 4, 7, 18, 59.
Fæces Vini, 113.
Fagopyrum, 9, 57.
Fagus, 40.
Faltrank, 153.
Farfara, 113.
Farina, *ibidem*.
Fasc. *id est*, Fasciculus, 157.
Fausel, 40.
Fecula alkalina, *id est*, Magnesia alba, 299.
Fecula Ari, 165.
Bryoniæ, *ibidem*.
Ireos, *ibidem*.
Felis, 119.
Fenouil, 58.
Fénugrec, ibidem.
Fer, 143.
Fermentatio, *quid & quotuplex*, 160, 161.
Ferrugo, 143.
Ferrum, 137, 143, 145.
Ferula, 24, 59.
Feve, 57.
Feuille indienne, 58.
Fex, *quid*, 160.
Fiber, 125.
Ficaria, 43.
Ficus, 4, 10, 57, 87.
Figuier, 57.
Filicula, 14.
Filipendula, 57.
Filix, 10, 58.
Filtrare, *quid*, 160.
Filtrum, *quid*, 158.
Flamme, 69.
Flores, *quid*, 162.
Flores Antimonii rubri, 272.
Benzoïni, *ibibem*.
Salis Ammoniaci martiales, *ibidem*.
Sulphuris, 273.
Flos Ambarvalis, 93.
Cardinalis, 77.
Cuculi, 36.
Solis, 65.
Focus, *quid*, 159.
Fœniculum, 4, 8, 17, 48, 49, 58, 107.
Fœnugræci mucago, 163.
Fœnugræcum *vel* Fœnum græcum, 7, 58.
Folia orientalia, 106.
Folium indum, 58.
Folliculi, 4, 106.
Fomentum, *quid*, 172.
Formica, 120, 129.
Fotus, *quid*, 172.
Fougere, 58.
Fourmi, 129.
Fragaria, 8, 59.
Fraisier, 59.
Frambæsia, 100.
Frangula, 6, 59.
Fraxinella, 52.
Fraxinus, 10, 59.
Frêne, 59.
Fritillaria, 47.
Froment, 113.
Frumentum, 57.
Fuligo, 59.
Fumaria, 10, 59.
Fume-terre, 59.
Fumigare, *quid*, 162.
Fundare, *quid*, *ibidem*.
Fungus, 14, 25, 48.
Furfur, 113.
Furnus, *quid*, 159.

G.

Gadus, 131.
Gagates *vel* Gagas, 37, 144.
Galanga, 3. 59, 60.
Galbani purificatio, 164.
Galbanum, 5, 60.
Gale, 83.
Galea, *quid*, 158.

Galega, 60.
Galenica, *quid*, 1.
Galeopsis, 72.
Galla, 120, 128.
Gallina, 119, 129.
Gallium, 5, 21, 60.
Gallus, 119, 129.
Garentogen, 61.
Garderobe, 11.
Garence, 99.
Garou, 112.
Garum-Caviar, 121.
Gazelle, 125.
Gelatina, *quid*, 202.
Gelatina Cornu Cervi, 177,
Cydoniorum, 203.
Pomarum, *ibidem.*
Ribium, *ibidem.*
Genet, 60, 61.
Genievre, 70.
Genista, 7, 60, 61.
Gemmæ (Sal), 147.
Gen-feng, 3, 61.
Gentiana, 3, 6, 40, 61.
Geranium, 8, 61.
Germandré, 42.
Geum, 38.
Gilla Theophrasti, 284.
Vitrioli, *id est.* Gilla Theophrasti, 284.
Gins-eng. 61.
Girofle, 38.
Giroflée, 71.
Glans unguentaria, 25.
Glastum, 7, 62.
Glayeul, 69.
Glechoma, 64.
Globuli martiales, 292.
Glu, 115.
Gluten, *ibidem.*
Glycyrrhiza, 3, 62.
Glycyrrizæ succus, 4, 62.
Gnaphalium, 62.
Gomme arabique, 12.
du Sénégal, 21.
Gutte, 64.
Laque, 71.
Séraphique, 100.
Tacamaque, 110.
Gossypium, 4, 30.
Goudron, 92.
Goutte de Lin, 50.
Gradus ignis, *quid & quotuplex*, 159.
Graine d'Ecarlate, 126.
de Peroquet, 38.
Gramen, 10, 62, 63.
Granata, 4.
Granatus [Lapis], 136, 144.
Granatum, 96.
Granum, *quid*, 156.
Actes, 102.
Cnidium, 112.
Dioscoridis, 62.
Kermes, 69.
Granum, Moschatum, 27.
Granum Paradisi, 36.
Grateron, 21.
Gratia-Dei, 63.
Gratiola, 7, *ibidem.*
Grémil, 77.
Grenadier, 96.
Grenat, 144.
Grenouille, 132.
Groselier, 63.
Grossularia, 8, 63.
Gruau, 25.
Guajaci lignum, 3.
resina, 5.
Guajacum, 63.
Gui, 115.
Guimauve, 17.
Gummi, *quid*, 2.
Arabicum, 12.
Bdellium, 27.
Copal, 5, 46.
Elemi, 54.
Guajacum, 5, 63.
Gutta, 64.
Juniperinum, 71.
Lacca, 71.
Senegalense, 21.
Tragacanthum, 113.
Purificatio, 164.
Tragacanthi mucago, 171.
Gur (Calx), 145.
Gutta-Gamba, 5.
Gutta [Gummi], 64.

H.

HÆdus, 124.
Hæmatitæ præparatio, 165.
Hæmatites, 144.
Hæmorrhois Cardui, 120.
Halicacabum, 16.
Hannebanne, 67.
Hauft. *id est*, Haustus, 157.
Hedera, 7, 64.
Hederæ gummi, 5, 64.
Helenium, 55.
Helianthemum, 9, 65.
Helianthus, *ibidem.*
Heliotropium, 65, 283.
Helix, 126.
Hellebori præparatio, 167.
Helleborus, 8, 65.
Helmintholithus, 141.
Helxine, 89.
Hématite [pierre], 144.
Henricus (bonus), 9, 30.
Hepatica, 8, 10, 17, 65, 66.
Hépatique, 65, 66, 74.
Hepar Antimonii, 300.
Antimonii lotum, *id est*, Crocus Metallorum, 300.
Hepar Sulphuris, 294.
Herba britannica 73.
Paralysis, 95.
Paris, 7, 66.
Pulicaris, 95.
stellata, 47.
Turca, 67.
venti, 95.
Herbæ vulnerariæ, 153.
Herbe à éternuer, 95.
à lait, 93.
à pauvre homme, 63.
à Robert, 61.
aux Chats, 85.
aux Cuillers, 45.
aux écus, 85.
aux gueux, 44.
aux perles, 77.
aux poux, 109.
aux puces, 95.
aux verrues, 65.
Ste. Barbe, 27.
d'or, 65.
Heracleum, 109.
Hérisson, 128.
Hermodactylus, 3, 66.
Herniaria, 9, 66.
Hesperis, 16.
Hibiscus, 27.
Hingisch, 24.
Hippocastanum, 40.
Hippuris, 55.
Hircus, 119, 124,
Hirondelle, 129.
Hirudo, 120, 129.
Hirundinaria, 23, 43.
Hirundo, 119, 129.
Hispidula, 62.
Histrix, 128.
Homo, 119, 129.
Hordeum, 10, 67, 41.
Horminum, 7, 67.
Houblon, 77.
Houille, 142.
Houx, 21, 100.
Huille de Gabian, 147.
d'Olive, 86.
Huitre, 131.
Humulus, 77.
Huso, 121.
Hyacinthus [lapis], 136, 144.
Hydrargyri purificatio, 167.
revivificatio, 273.
Hydrargyrum, *vel* hydragyrus, 137, 143, 145.
Hydromel vinosum, 186.
Hydropiper, 90.
Hyeracium, 91.
Hymenea, 19.
Hyosciamus, 6, 67.
Hypericum, 8, 68.
Hypnum, 82.
Hypocistis, 68.
Hyssopus, 68.

I.

IBex, 129.
Ibifcus, 17.
Iccariba, 54.
Ichthyocolla, 121.
Ieble, 54.
Igafur, 57.
Ignis gradus, *quinam funt*, 159.
  reverberii, *quid*, 160.
Illecebra, 105.
Ilex, 21, 68.
Imperatoria, 19, 69.
Incinerare, *quid*, 162.
Inclinatio, *quid*, 160.
Incorporare, *quid*, 161.
Infundere, *quid*, *ibidem*.
Infufio, *quid*, *ibidem*.
Infchi, 117.
Infecte du Bedeguar, 128.
Infolare, *quid*, 161.
Intybus, 55.
Inula, 55.
Ipecacuanha, 3, 69.
Ireos Fecula, 165.
Iris, 3, 6, 13, 66, 69.
Ifatis, 62.
Ifis, 130.
Iva, 42.
Ivette. ibidem.
Ixia, 37.

J.

JAcea, 28.
Jacobæa, 68, 115.
Jade, 146.
Jais, 144.
Jalappa, 3, 68.
Japonica (Terra], 40.
Jafminum, 33.
Jafpis, 145.
Jatropa, 98.
Jayet, 144.
Jetucu, 79.
Jonc, 70.
Joubarbe, 105.
Judaïcum [Balfamum], 5, 26.
  (Bitumen), 137.
Judaïcus (Lapis), 126.
Judée (Beaume de], 26.
Jugeoline, 107.
Juglans, 9, 69.
Jujuba, 4, 69, 71.
Julapium, *quid*, 185.
Julep, *quid*, *ibidem*.
Juncus, 4, 70.
Juniperi Baccæ, 4.
Juniperus, 70, 100.
Jupiter, 148.
Juculum, *quid*, 172.
  è Cancris, 177.
Jufculum Viperinum, 176.
Jufquiame, 67.

K.

KÆmpferia, 59, 117.
Kali, 5, 70.
Katou-Karva, 58.
Karabé, 149.
Keiri, 71.
Kermes, 68, 120, 126.
  minerale, 293.
Ketmia, 27.
Kina, 43.
Kinakina, *vel* Kinkina, 3, 71.

L.

LAbdanum, 5, 71.
Laboratorium, *quid*, 158.
Labrum Veneris, 53.
Lacca, 71.
Lacerta *feu* Lacertus, 119, 130, 132.
Lac Lunæ, 136, 145.
  Sulphuris, 295.
Lactuca, 9, 72.
Lait de Lune, 145.
Laiteron, 109,
Laitue, 72.
Lamium, 7, 72.
Langue de Serpent, 87.
Lapathum, 9, 30, 73.
Lapidum prætioforum præparatio, 167.
Lapis Ætites, 136.
  Armenus, *ibidem*.
  Calaminaris, 142.
  Carpionum, 125.
  Caufticus, 287.
  Divinus, *id eft*, Lapis ophthalmicus, 290.
  Hiftricis, 128.
  Infernalis, 285.
  Judaïcus, 136.
  Lazuli, 145.
  Lyncis, 136, 141.
  Malacenfis, 136.
  Martialis, *id eft*, Globuli martiales, 292.
  Medicamentofus, 290.
  Merlangii, 131.
  Nephriticus, 136.
  Ophtalmicus, 290.
  Percarum, 132.
  Prunellæ, *id eft*, Sal Prunellæ, 289.
  Salutis *id eft*, Lapis Medicamentofus, 290.
  Vitrioli, 143.
Lappa, 27.
Laque (Gomme), 71.
Laferpitium, 76.
Lateres, 145.
Lathyris, 112.
Lavandula, 7, 73, 110.
Laudanum liquidum Sydenhami, 279.
  Opiatum, *id eft*, Extractum Opii, 184.
Laver, 29.
Laureola, 112.
Lauri Baccæ, 4, 73.
Laurus, 29, 34, 39, 44, 59, 73, 103.
Laurifolia, 47.
Lazuli præparatio, 168.
Lazulus, *id eft* Lazuli lapis, 136, 145.
Lemna, 74.
Lens, 7, 74.
Lenticula, 9, 74.
Lentifcus, 79.
Leo, 119.
Leontodon, 52.
Leonurus, 36.
Lepidium, 6, 74, 84.
Lepus, 119, 130.
Leucanthemum, 28, 42.
Leucoium, 71.
Levigare, *quid*, 160.
Leviſticum, 8, 74.
Lézard, 130.
Libra, *quid*, 155,
Lichen, 10, 65, 74.
Lichenoides, 74.
Lierre, 64.
Liévre, 130.
Lignum, 64, 75.
Liguſticum, 47, 75.
Lilium, 6, 47, 76.
  Paracelfi, *id eft* Tinctura Metallorum, 280, 281.
Limaçon, 126.
Limaturæ Martis præparatio, 168.
Limax, 126.
Limones, 76.
Limonia (Malus), *ibidem*.
Limonium, 28.
Linaria, 7, 51, 54, 76.
Linctus, *quid*, 185.
Lingua Avis, 59.
  Cervina, 10.
Lingotiere, quid, 160.
Linimentum Arcei, *id eft* Balfamum Arcei, 227.
Linimentum, *quid*, 230.
Lini Mucago, 163.
Linum, 8, 76.
LiquamenMyrrhæ, *id eft* Oleum Myrrhæ per deliquium, 271.
Liquare, *quid*, 162.
Liquidambar, 5, 76.
Liquiritia, *feu* glycyrrhiza, 62.
Liquor anodynus mineralis, 264.
Liquor Nitri fixi, 286.

Liquor ſaturninus, 179.
Liquor vegeto-mineralis, *id eſt* Liquor ſaturninus, 179.
Liquor viſceralis, 280.
Lis, 76.
Lithanthrax, 142.
Lithargyri præparatio, 165.
Lithargyrus, 145, 147.
Lithoſpermum, 5, 77.
Liveche, 74.
Lixivium, *quid*, 183.
Lobelia, 77.
Lobus, 114.
Loliaceum [Gramen], 10.
Lonicera, 35.
Loock album, 201.
 ex Ovo, 201.
Loock, *quid*, 185.
Loricare, *quid*, 162.
Lotus, 80.
Lucius, 119, 130.
Lujula, 6, 77.
Lumbricorum præparatio, 168.
Lumbricus, 120, 130.
Luna, 140.
Lupinus, 7, 77.
Lupulus, 10, *ibidem*.
Lupus, 119.
Lutare, *quid*, 162.
Lychnis, 28, 104.
Lycoperdon, 48.
Lycoperſicon, 77.
Lycopodium, 82.
Lyncis (Lapis), 136, 141.
Lyſimachia, 86, 101.
Lythrum, *ibidem*.

M.

M. *Id eſt*, miſce, 157.
Macerare, *quid*, 160.
Macis, 4, 86.
Mâcropiper, 4, 92.
Madrepora, 46, 130.
Magdaleo, *quid*, 230.
Magellanicus, [Cortex], 47.
Magiſter Biſmuthi, 141.
 Sulphuris, 295.
Magma, *quid*, 160.
Magnes, 145.
Magneſia alba, 299.
Magneſia Nitri, *id eſt*, Magneſia alba, 299.
Magnetis præparatio, 165.
Majorana, 7, 78.
Malabathrum, 4, 59.
Mala Armeniaca, 8, 22.
 Aurea, 77.
 Cotonea, 50.
Malacenſis lapis, 136.
Malago-Codi, 92.
Malan-Kua, 117.
Malaxare, *quid*, 161.
Malicorium, 96.
Malva, 6, 15, 78.
Malum Granatum, 96.
Malus Curtipendula, 94.
 Limonia, 76.
 Medica, 44.
 Perſica, 90.
 Praſomila, 94.
 Punica, 96.
 Sativa, 94.
Man. *id eſt*, manipulus, 157.
Mandragora, 6, 78.
Manica Hippocratis, *quid*, 158.
Maniguette, 36.
Manna, 4, 78.
Manus Dei, *id eſt*, Emplaſtrum Divinum, 247.
Maranta, 60.
Marchantia, 66.
Marchaſſita, 141.
Marga, 145,
Margaritæ, 136, 127.
Margaritarum præparatio, 166.
Marguerite, 28.
Marjolaine, 78.
Marronnier, 40.
Marrubium, 7, 36, 78, 79.
Mars, 143.
Martis præparatio, 168.
Marum, 7, 79.
Maſſicot, 147.
Maſtiche, 5, 79.
Mater Perlarum, 120, 127.
 Unionum, 127.
Matratium, *quid*, 159.
Matricaria, 9, 42, 79.
MatrisPerlarum præparatio, 166.
Mauve, 15, 78.
Mazama, 119, 126.
Mechoacanna, 3, 79.
Meconium, 89.
Mecque (*Baume de la*), 26.
Medica, 44, 76.
Medicago, 75.
Medicamentum, *quid*, 1.
Medulla, *quid*, 118.
Mel, 122, 185, 186.
Melanteria, 143.
Melanthium, 85.
Melegetta, 36.
Meles, 133.
Melilotus, 7, 79, 80.
Meliſſa, 80, 33.
Mellis deſpumatio, 168.
Mellitum, *quid*, 184.
Melo, 6, 80.
Meloë, 124, 132.
Meniſpermum, 44.
Menſtruum, *quid*, 161.
Menſura, *quid*, 156, 157.
Mentha, 7, 33, 80, 81.
Menyanthes, 6, 81.
Mercurialis, 10, 81.
Mercurius, 145.
 coſmeticus, *id eſt* Mercurius præcipitatus albus, 295.
Mercurius dulcis, *id eſt* Mercurius ſublimatus dulcis, 274.
 præcipitatus, 295.
 ſublimatus corroſivus, 273.
 ſublimatus dulcis, 274.
Meriſier, 41.
Merlangius, 119, 131.
Meſpillus, 8, 81, 109.
Meum, 8, 81.
Meurier, 82.
Mezereum, 6, 112.
Mica, 150.
Millefolium, 9, 81.
Millepedes, 131.
Millepedum præparatio, 168.
Millepertuis, 68.
Milium, 77.
Mimoſa, 12, 21, 75.
Mineralogia, *quid*, 135.
Minium, 147, 297.
Miſy, 143.
Miva, *quid*, 202.
Miva Cydoniorum, 203.
Modiolus fuſorius, *quid*, 160.
Molaris lapis, *quid*, 158,
Moleſne, 114.
Mollugo, 60.
Molon, 57.
Momordica, 6, 49, 82.
Monoceros, 119, 131.
Monodon, *ibidem*.
Morelle, 91, 108.
Morgeline, 17.
Morſuli Antimoniales Kunkelii, *id eſt*, Tabellæ Antimoniales, 216.
Morſus Gallinæ, 17.
Mortarium, *quid*, 58.
Morus, 9, 82.
Moſchatæ [Nuces], 4.
Moſchatum [Granum], 27.
Moſchus, 125.
Mouches à Miel, 122.
Mouches Cantharides, 124.
Mouron, 19.
Mouſſe, 82.
Moutarde, 108.
Moxa, 23.
Mucago, *quid*, 163.
Mucilago, *quid*, *ibidem*.
Muguet, 24, 76.
Mumia, 129.
Mundare, *quid*, 161.
Muræna, 122.
Muré, 71.
Mures, 99.
Muria, 147, 148.
Mus, 119.
Muſc, [*Graine de*], 27.
Muſc, *id eſt*, moſchus, 125.
Muſca, 37, 120.

Muscus, 10, 14, 74, 82, 127.
Muscæ virides, 124.
Myrobalani, 4, 82.
Myrobalanorum torrefactio, 168.
Myrrha, 5, 83.
Myrrhis, 8, 52, 83.
Myrtillus, 115.
Myrtus, 8, 10, 39, 83, 91.
Mytilus, 127.
Myxa (Cordia), 105.

N.

N. *Id est*, Numero, 157.
Nacre de Perles, 127.
Napellus, 13.
Napus, 7, 32, 83.
Nardus, 23, 84.
Narval, 131.
Nasturtium, 6, 10, 36, 84, 85, 109.
Natrum, 136, 146.
Navet, 32, 83, 97.
Naveta, 32.
Néflier, 81.
Nénuphar, 86.
Nepeta, 7, 85.
Nephriticum lignum, 3, 75.
Nephriticus lapis, 136, 146.
Nerprum, 98.
Nicotiana, 6, 85.
Nielle, 85.
Nigella, 7, 85.
Nigrica, 136, 149.
Nihil album, 147.
 griseum, 150.
Ninsi, 85.
Ninsin, 85, 61.
Nitri purificatio, 169.
Nitrum, 136, 146, 144.
 alkalisatum, *id est*, Nitrum Tartaro fixatum, 286.
 carbonibus fixatum, 286.
 stibiatum, 998.
 tabulatum, *id est*, Sal prunellæ,
 Tartaro fixatum, 286.
N.° *id est*, Numero, 157.
Nombril de Vénus, 116.
Noisette, 24.
Noix Muscade, 86.
 Vomique, 86.
Noyer, 69.
Nuces Cupressi, 50.
Nuclei pinei, 4.
Nummularia, 85.
Nux, 69, 86.
Nymphæa, 8, 86.

O.

OChra, 138, 142, 144.
Ochrum, 136.
Oculi Cancrorum, 123, 136.
Oculorum Cancrorum præparatio, 166.
Ocymum, 7, 86.
Œillet, 39.
Œpata, 18.
Œsipum, 131.
Oignon, 40.
Oleosaccharum, *quid*, 185.
Oleum, *quid & quotuplex*, 86, 229.
 Amygdalarum, 231.
 Anethi, *ibidem*,
 Baccarum Lauri, 232.
 seu Butyrum Cacao, *ibidem*.
 Calcis, 268.
 Camphoræ, 271.
 Cannabis, 231.
 Carvi, *ibidem*.
 Ceræ, 270.
 Cornu Cervi, 267.
 Cranii humani, *id est* Ossium Animalium, 277.
 Cumini, 231.
 de Abrotano, 235.
  Absinthio, *ibidem*.
  Anetho, *ibidem*.
  Chamæmelo, 235.
  Castoreo, 232.
  Catellis, *ibidem*.
  Euphorbio, 233.
  Genistâ, 235.
  Hyosciamo, *idem*.
  Hyperico, 233.
  Iride nostrato, *id est* Oleum irinum, 234.
  Keiri, 235.
  Lateribus, 270.
  Liliis albis, 235.
  Lumbricis, 233.
  Majoranâ, 235.
  Meliloto, *ibidem*.
  Menthâ, *ibidem*.
  Mucaginibus, 234.
  Nymphæâ alba, 235.
  Rosmarino, *ibidem*.
  Rutâ, *ibidem*.
  Sambuco, *ibidem*.
  Scarabæis, *ibidem*.
  Solano, *ibidem*.
  Spicâ, *id est* Oleum essentiale Lavandulæ, 269.
  Violis, 235.
 essentiale, *quid*, 255.
 essent. Baccarum Juniperi, 269.
Ol. essent. Caryophylorum, 270.
 Cinnamomi, 270.
 Corticum Aurantiorum 269.
 Cort. Citreorum, *ibid*.
 Florum Lavandulæ, 269.
 Herbarum Absinthii, *ibidem*.
 Herb. Menthæ, *ibidem*.
 Herb. Origani, *ibidem*.
 Herb. Pulegii, *ibidem*.
 Herb. Rosmarini, *ibidem*.
 Herb. Rutæ, *ibidem*.
 Herb. Sabinæ, *ibidem*.
 Ligni Rhodii, *ibidem*.
  Sassafras, *ibidem*.
 Nucis Moschatæ. 270.
 Seminum Anisi, 269.
 Sem. Carvi, *ibidem*.
 Sem. Fœniculi, *ibidem*.
Oleum Fioraventi, 270.
 Fœniculi, 231.
 Guajaci, 270.
 Hyosciami, 231.
 lateritium, *id est* de Lateribus, 270.
 Laurinum, *id est* è Baccis Lauri, 232.
 Myrrhæ per deliquium, 271.
 Nucis Moschatæ, 231.
 Olivarum, 4, 86.
 Ovorum, 232.
 Palmeum, 4, 88.
 Papaveris albi, 231.
 Philosophorum, *id est* de Lateribus, 270.
 Rosatum, 234.
 Succini, 267.
 Sulphuris per campanam, 263.
 Tartari per deliquium, 285.
 Terræ, 147.
 Viperarum, 267.
 Vitrioli, 263.
 Vitrioli dulce, *id est* Vini dulce, 264.
Olibanum, 87.
Olivæ, 4, 86.
Oniscus, 120, 131.
Ononis, 20.
Operatio, *quid*, 160.
Opiatum, *quid*, 216.
Ophioglossum, 10, 87.
Opium, 5, 88.
Opobalsamum, *id est* Balsamum Judaïcum, 26.
Opopanacis purificatio, 164.
Opopanax, 5, 87,
Opuntia, *ibidem*.

Or, 141.
Oranger, 25.
Orcanette, 19.
Orchis, 10, 101, 103.
Oreille de Souris, 91.
Oreofelinum, 60.
Orge, 67.
Origanum, 7, 53, 77, 87.
Orme, 115.
Ornithogalum, 104.
Ornithogloffum, 59.
Orobus, 7, 88.
Orpiment, 140.
Orpin, 18.
Ortie, 72, 116.
Orvala, 67.
Oryza, 4, 87.
Ofeille, 13.
Ofmunda, 58.
Ofteocolla, 136, 146.
Oftrea, 131.
Oftrearum Teftarum præparatio, 166.
Oftreum, 120, 131.
Ovis, 119, 131.
Ovorum-Putaminum præparatio, 169.
Oxalis, 13, 77.
Oxyacantha, 29, 109.
Oxycedrus, 70.
Oxycratum, 179.
Oxylapathum, 73.
Oxymel, 186.
Oxys, 77.
Oxytriphyllum, *ibidem*.
Oye, 122.

P.

PÆonia, 8, 88.
Pagurus, 124.
Pain à chanter, 113.
de Pourceau, 50.
Palma, 40, 88, 98, 100.
Pamel, 67.
Panacea anglica, *id eſt* Magnefia alba, 299.
mercurialis, 274.
Panax, 61, 87.
Panicaut, 56.
Panis, 113.
Cuculi, 77.
porcinus, 50.
Panicum, 63.
Pannus, *quid*, 158.
Paon, 131.
Papaver, 7, 88, 89.
Paquerette, 29.
Par. *id eſt*, paria, 157.
Pardalianches, 53.
Parelle, 73.
Pareyra brava, 3, 89.
Parietaria, 9, 89.
Paris, 7, 96.
Part. Æq. *id eſt* partes æquales, 157.
Parthenium, 79.
Paſſerage, 74.
Paffulæ, 4, 89.
Pafta, *quid*, 213.
Bifmalvæ, *id eſt* de Althæâ, 214.
de Althæâ, *ibidem*.
Paſtel, 62.
Paftilli, 213.
Paftillus, *quid*, 211.
Paftinaca, 29, 52, 87.
Patientia, 73.
Pavo, 119, 131.
Pavôt, 88, 89.
Pêcher, 90.
Pedra del Porco, 128.
Pellicula, *quid*, 162.
Penæa, 103.
Pentaphylloïdes, 22.
Pentaphyllum, 8, 90.
Perca, 119, 132.
Perce-mouſſe, 14.
Perce-pierre, 48.
Perche, 132.
Periclymenum, 35, 47.
Perlæ orientales, 127.
Perlarum præparatio, 166.
Peroquet (Graine de), 38.
Perfica Malus, 90.
Perficaria, 9, 90.
Perſil, ibidem.
Pervinca, *ibidem*.
Peruvianum Balfamum, 5.
Peruvianus Cortex, 39.
Pes Cati, 62.
Columbinus, 61.
Leonis, 15.
Petafites, 9, 90.
Petit Muguet, 24.
Petroleum, 137, 147.
Petrofelinum, 4, 8, 90, 91.
Petum, 85.
Peuplier, 94.
Peziza, 25.
Pharagon, *ibidem*.
Pharmacitis, 136, 149.
Pharmacopœa, *quid*, 1.
Phafianus, 129.
Phlegma, *quid*, 161.
Phlegma acidum fulphureum volatile, 264.
Phlemoïdes, 114.
Phu, 113.
Phyfalis, 16.
Phyfeter, 126.
Phytolacca, 8, 91.
Phytologia, *quid*, 2.
Picea, 11.
Pied de Chat, 62.
de Lion, 15.
de Loup, 82.
de Pigeon, 61.
de Veau, 23.
Pierre à Fuſil, 148.
Calaminaire, 142.
d'Aigle, 138.
d'Armenie, 140.
d'Azur, 145.
de Linx, 141.
de Porc, 128.
Hématite, 144.
Néphrétique, 146.
noire, 149.
Ponce, 147.
Pigeons, 127.
Pignons doux, 92.
Pilofella, 9, 91.
Pilula, *quid*, 225.
Pilulæ aluminofæ, 225.
ante cibum, *id eſt* ftomachicæ, 228.
balfamicæ Mortoni, 225.
Stahli, 226.
benedictæ Fulleri, *ibidem*.
cocciæ Rhafis, 226.
è Colocynthide cum Aloë, *id eſt*, Cocciæ, *ibidem*.
de Cynogloffo, 227.
Hyftericæ, *ibidem*.
Mercuriales, *ibidem*.
Ruffi, 228.
faponaceæ, 228.
fcilliticæ, *ibidem*.
ftomachicæ, *ibidem*.
tartareæ Bontii, 229.
terebinthinatæ, *ibidem*.
Piment Royal, 83.
Pimentum, 18, 91.
Pimpinella, 8, 20, 91, 92.
Pimprenelle, 91, 92.
Pin, 92.
Pinea, *ibidem*.
Pinei Nuclei, 4, 92.
Pinguedo, *quid*, 118.
Pinta, *quid*, 156.
Pinus, 11, 92.
Piper, 4, 35, 91, 92, 93.
Piſſenlit, 52.
Piftachia, 4, 79, 93.
Piftolochia, 22.
Pithyufa, 56.
Pivoine, 88.
Pix, 5, 11, 92.
Plantago, 47, 93.
Plomb, 147.
Plumbum, 137, 142, 147.
Plumbum uftum, 297.
Poireau, 94.
Poirée, 29.
Poirier, 96.
Pois, 43.
Poivre à queue, 49.
Poix, 92.
Polium, 7, 93.
Polygala, 93, 106.
Polygonatum, 6, 93.
Polygonum, 9, 29, 54, 90, 94.
Polypodium, 10, 14, 57, 93.

Polytrichum,

Polytrichum, 14.
Poma, 8, 94.
Pomatia, 126.
Pomme, 77, 82, 94.
Pompholix, 147.
Pondus, 155, 156.
Poo. *id est* potio, 157.
Populus, 9, 94, 110.
Porcus, 128, 133.
Porphyrites, *quid*, 158.
Porrum, 6, 94.
Portulaca, 7, 94.
Posca, *id est* Oxycratum, 179.
Potasse, 143.
Potée d'Etain, 149.
Potentilla, 22, 90.
Poterium, 91.
Poule, 129.
Poulet, ibidem.
Pouliot, 33, 80.
Poupart, 124.
Pourpier, 94.
P. P. *id est* præparare, 157.
Præcipitatus albus, *id est*, Mercurius præcipitatus albus, 295.
Prassium, 78.
Prele, 55.
Primula veris, 95.
Prinos, 20.
Processus, *quid*, 160.
Proscarabæus, 120, 132.
Prunus, 8, 12, 22, 23, 41, 92.
Psyllii Mucago, 163.
Psyllium, 95.
Ptarmica, 9, 15.
Pterocarpus, 102.
Ptisana, *quid*, 172.
Ptisana communis, 172.
Ptisana *seu* Decoctum hordaceum, 173.
Ptisana pectoralis, *ibidem*.
 regia, 174.
Puce [la Chasse], 45.
Pug. *id est* pugillus, 157.
Pulegium, 7, 80.
Pulicaris herba, 95.
Pullus gallinaceus, 129.
Pulmonaria, 5, 74, 95.
Pulmonarius Lichen, 74.
Pulpa Cydoniorum, 205.
 Cynosbati, 205.
Pulsatilla, 95.
Pulveres, *quomodo parantur*, 206.
Pulvis Ari, 206.
 arthriticus amarus, 207.
 cachecticus, 207.
 Carthusianorum, *id est* Kermes minerale, 293.
 Caryocostinus, *id est* Caryocostinum, 209.
 Comitis de Palmâ, *id est* Magnesia alba, 299.
 Comitissæ de Kanth, 207.
 Comitissæ de Warvick, *id est* Pulvis de tribus, 210.
Pulvis Cornachini, *id est*, de Tribus, 210.
 de Gutteta, 208.
 de Tribus, 210.
 è chetis Cancrorum, *id est* Comitissæ de Kanth, 207.
 è Scammonio compositus, *id est* Pulvis de Tribus, 210.
 Haly, 208.
 Hydragogus, 210.
 Principis de la Mirandole, *id est*, Arthriticus amarus, 207.
 sternutatorius, 209.
 stomachicus, 208.
 sympathicus, 284.
 Temperans, 209.
 Vermifugus, 211.

Q.

QUassi [Lignum], 75.
Quassia, *idem*.
Quatuor Semina, 153.
Quatuor Farinæ, 154.
Quatuor Herbæ, 152.
Quercus, 9, 69, 96.
Queue de Cheval, 55.
Quinque-folium, 90.
Quinque Herbæ, 152.
Quinquina, 71.
Q. S. *id est* quantùm satis.
Q. V. *id est* quantùm vis.

R.

R*Acine Vierge*, 107.
Radere, *quid*, 161.
Radices conditæ Angelicæ, 205.
 Ænulæ campanæ, 205.
 Eryngii, *ibidem*.
Radicula 97.
Radis, *ibidem*.
Radix idæa, 116.
 ursina, 81.
Raifort, 97.
Raisin, 66, 89.
Rana, 119, 123, 132.
Ranunculus, 8, 43, 66.
Rapa, 97.
Rape, 32, 97.
Raphanus, 6, 97.
Rapum, 50, 97.
Rapunculus, 77.
Rapuntium, 77.
Raquette, 87.
Rave, 97.
Recipiens, *quid*, 159.
Rectificare, *quid*, 162.
Refrigeratorium, *quid*, 158.
Regia juglans, 69.
Regina prati, 115.
Regifter, *quid*, 159.
Régliffe, 62.
Regulus, *quid*, 135.
Regulus Antimonii, 296.
Reine des Prés, 115.
Rémola, 97.
Renetia Poma, 94.
Renouée, 94.
Renoncule, 97.
Reprise, 18.
Residentia, *quid*, 160.
Resina, 2, 5.
 Guajaci, 296.
 Jalappæ, *ibidem*.
 Scammonii, *ibidem*.
Resta Bovis, 20.
Retorta, *quid*, 159.
Rhabarbarum, 3, 73, 97, 98.
Rhamnus, 6, 59, 70, 71, 98.
Rhapontica, 40.
Rhaponticum, 3, 98.
Rhei torrefactio, 168.
Rheum, 97, 98.
Rhodium Lignum, 3, 75.
Rhodomel, *id est* Mel rosatum, 185.
Rhœas Papaver, 89.
Rhubarbe, 73, 97.
Rhus, 46. 83, 110.
Ribes, 63.
Ribesium, *ibidem*.
Ricinoïdes, 4, 98, 39.
Ricinus, 9, 72, 98.
Riz, 87.
Rizolithus, 146.
Robur Quercus 96.
Rob Ribium, 203.
 Sambuci, *ibidem*.
Rocambole, 16.
Roga, 105.
Romarin, 99.
Ronce, ibidem.
Roquette, 55.
Ros Vitrioli, 263.
Rosa, 8, 51, 98, 99.
Roseau, 33.
Roses (Bois de), 75.
Rosmarinus, 7, 99.
Rossolis, 99.
Rostrum, *quid*, 158.
Rubeola, 24.
Rubeta, 123.
Rubia, 5, 99.
Rubigo, 143.
Rubus, 8, 99, 100.
Rue, 100.
Rumex, 13, 73.
Rupertiana, 61.
Rupricapra, 129.
Ruscus, 100.
Ruta, 8, 14, 60, 100.

S.

S. A. *id est*, secundum Artem, 157.
Sabina, 9, 100.
Saccharum, 5, 23.
Saccharum Saturni, *id est*, Sal Saturni, 291.
Safran, 38, 48, 50.
Sagapeni purificatio, 164.
Sagapenum, 100.
Sagou, 100.
Sagu, 3, 100.
Sal, 5, 283.
 Acidum, *quid*, 283.
 Alkali, *quid*, *ibidem.*
 Ammoniacum, 147, 268.
 Ammoniacum fixum, 268.
 Catharticum amarum, 146.
 Cathart. Glauberi, *id est*, Sal mirabile, Glauberi, 290.
 commune, 148.
 de duobus, *id est* Tartarum vitriolatum, 289.
 Digestivum Sylvii, 268.
 diureticum, *id est* Terra foliata Tartari, 289.
 essentiale, *quid*, 283.
 essent. Acetosæ, *ibidem.*
 febrifugum Sylvii, 268.
 fixum, *quid*, 283.
 fixum lixiviale, 287.
 Kinæ-Kinæ *de la Garaie*, 284.
 Lixiviale, *quid*, 283.
 Marinum, 148, 169.
 Martii Riverii, 285.
 Mirabile Glauberi, 290.
 Narcoticum Vitrioli, *id est*, sedativum Humbergii, 290.
 Neutrum, *quid*, 283.
 Plantarum Tachenii, 287.
 Polychrestum Glaseri, *id est* Tartarum vitriolatum, 289.
 Polychrestum solubile, 288.
 Prunellæ, 289.
 rupellense, *id est* Polychrestum solubile, 288.
 Saturni, 291.
 Sedativum Humbergii, 290.
 Seignette, *id est* Polychrestum solubile, 288.
 Tartari, 285.
 Vegetabile, *id est* Tartarum solubile, 288.
 Vitrioli, *id est* Gilla Theophrasti, 284.
 Volatile, *quid*, 262, 283.
 Vol. Ammoniacum, 286.
 Vol. Cornu Cervi. 267.
 Vol. Cranii humani, *id est* Ossium animalium, 267.
Sal Vol. Succini, 267.
 Vol. Viperæ, *ibidem.*
Salab, 3, 101.
Salicaria, 8, 101.
Salis marini decrepitatio, 169.
Salivaris, 96.
Salix, 9, 101.
Salop, 101.
Salseparelle, 101.
Salsosa, 71, 70.
Salvia, 7, 67, 101.
Sambucus, 6, 54, 102.
Sampsucus, 77.
Sanctum Semen, 12.
Sandaracha, 5, 70.
Sanglier, 122.
Sang-sue, 129.
Sanguis Draconis, 5, 102.
Sanguisorba, 91.
Sanguisuga, 129.
Sanicula, 8, 102.
Santalum, 3, 102.
Santolina, 11.
Santonicum, 12.
Saphyrus, 136, 148.
Sapin, 11.
Sapinette, ibidem.
Sapo, 71.
 albus, 291.
Saponaria, 8, 103.
Sarcocolla, 5, 103.
Sardinus, 136, 148.
Sardonix, *id est* Sardinus, 148.
Sariette, 103.
Sarracenicum Frumentum, 57.
Sarsaparilla, 3, 101.
Sassafras, 3, 103.
Satureia, 7, 103.
Saturnus, 147.
Satyrium, 10, 103.
Sauge, 101.
Saule, 101.
Savon, 71.
Savonière, 103.
Saxifraga, 8, 92, 103.
Saxum, 148.
Scabiosa, 9, 104.
Scammonii præparatio, 164.
Scammonium, 5, 104.
Scandix, 41, 82.
Scarabæus, 132.
Scariola, 72.
Sceau de Notre-Dame, 107.
 de Salomon, 93.
Schistus, 140, 149.
Schænanthus, 70.
Scilla, 3, 104.
Scillæ coctio, 169.
Scillæ exsiccatio, 170.
Scincus, 119, 132.
Sclarea, 67.
Scolopendria, 76.
Scolymus, 44.
Scordium, 7, 104.
Scoria, *quid*, 135.
Scorodoprasum, 16.
Scorpio, 120, 132.
Scourgeon, 67.
Scorzonera, 9, 104.
Scrophularia, 7, 104, 105.
Scrupulus, *quid*, 156.
Sebadillum, 41.
Sebesten, 4, 105.
Sebum, *quid*, 118.
Secale, 10, 105.
Seche, 133.
Sedum, 8, 18, 19, 105.
Sel Ammoniac, 147.
 de Seignette, *id est* Sal Polychrestum solubile, 288.
 des Eaux minérales, 146.
 Gemme, 147.
 Mural, 146.
 ordinaire de Cuisine, 148.
Segle, 105.
Selibra, *quid*, 155.
Semence contre les Vers, 106.
Semen contra, 106.
Semen sanctum, *ibidem.*
Sementina, 4, 106.
Semenzina, 106.
Semidrachma, *quid*, 156.
Semiscrupulus, *quid*, 156.
Sempervivum, 105.
Semuncia, *quid*, 155.
Séné, 45, 106.
Seneca, 3, 106.
Senecio, 9, 68, 106, 115.
Seneçon, 106.
Senegalense Gummi, 21.
Senna, 4, 45, 106.
Sepia, 120, 133.
Seraphique (Gomme), 100.
Seri Lactis præparatio, 170.
Seris picris, 43.
Serpentaire, 54.
Serpentaria, 3, 107.
Serpolet, ibidem.
Serpyllum, *ibidem.*
Serratula, 37.
Seseli, 4, 70, 107.
Sesquidrachma, *quid*, 156.
Sesquilibra, *quid*, 155.
Sevum, *quid*, 118.
Siccitas, 162.
Sideritis, 7, 107.
Sigillum, 93, 107.
Silene, 104.
Siler, 75.
Silex, 136, 148.
Siliqua, 111.
Simarouba, 3, 108.
Similago, 113.
Sinapi, 7, 55, 108.
Sinapismus, *quid*, 230.
Sisarum, 85.
Sison, 17.
Sisymbrium, 6, 27, 55, 8[illegible] 84, 109.
Sium, 21, 29, 85.
Smaragdus, 136, 148.

Smilax, 43, 101.
Soccotrina Aloë, 16.
Soda, 70.
Sol, 141.
Solanum, 6, 16, 28, 44, 54, 66, 77, 91, 108.
Soldanella, 108.
Soldat, 124.
Solidago, 114.
Solvere, *quid*, 161.
Solutio Mercurii caustica, 165.
Sonchus, 9, 109.
Sophia, 6, 109.
Sorbier, 109.
Sorbus, *ibidem*.
Sory, 143.
Souchet, 51.
Souci, 34.
Soucrion, 67.
Soude, 70.
Soufre, 149.
Spatha, *quid*, 158.
Spathula, *quid*, *ibidem*.
Sparadrapum, *quid*, 230.
Sparadrapum album, 254.
rubrum, 253.
Spargirica, *id est* phylosophica Præparatio Cornu Cervi, 167.
Spartium, 61.
Spergula, 8, 109.
Sperma Ceti, 126.
Sperniola, *id est*, Sperma Ranarum, 132.
Species, *quid*, 206.
Species Caryocostini, *id est* Caryocostinum, 209.
Species Diacarthami, 210.
Hieræ picræ, 210.
Sphondylium, 109.
Spica, 3, 73, 84, 110.
Spina, 8, 29, 97, 109.
Spiræa, 57, 116.
Spiritus, *quid & quotuplex*, 161; 255.
Aceti, 263.
Anethi, 260.
Anisi, *ibidem*.
Baccarum Juniperi, 262.
Bac. Sambuci, *ibidem*.
ardens Cerasorum, *ibidem*.
ard. Cochleariæ, 263.
ard. Fragariæ, 262.
ard. Framboesiæ, 262.
Lavandulæ, *ibidem*.
Carminativus Sylvii, 260.
Carvi, *ibidem*.
Coriandri, *ibidem*.
Cornu Cervi, 267.
Corticum Citri, 262.
Cranii humani, *id est* Ossium Animalium, 267.
Spiritus Fæniculi, 260.
Mindereri, 268.
Nitri, 265.
Nit. bezoardicus, 299.
Nit. concentratus, 265.
Nit. dulcificatus, 265.
Nit. fumans, *id est* concentratus, 265.
Ossium Animalium, 267.
Rosmarini, *id est* Aqua Reginæ Hungariæ, 262.
Salis Ammoniaci cum Alkali fixo, 268.
Salis Ammoniaci cum Calce, 268.
Salis Ammoniaci dulcificatus, *seu* vinosus, 287.
Salis communis, 266.
Salis dulcificatus, 266.
Salis volatilis oleosus Sylvii, 266.
Succini, 267.
Sulphuris per campanam, 264.
Terebinthinæ, 270.
Vini, 115.
Vini anthosatus, *id est* Aqua Reginæ Hungariæ, 262.
Vini camphoratus, 259.
Vini communis, *id est* Aqua Vitæ, 259.
Vini fragrans, 264.
Vini rectificatus, 259.
Vini simplex, *id est* Aqua Vitæ, *ibidem*.
Viperæ, 267.
Spodium, 128.
Spongia, 120, 128, 133.
Spongiæ ustio, 165.
Spongiæ præparatio, 170.
Stamen, *quid*, 158.
Stamina, 4.
Stannum, 137, 148.
Staphisagria, 4, 109.
Stercus-diaboli, 24.
Statice, 28.
Stibium, 139.
Stibium diaphoreticum, *id est* Antimonium diaphoreticum, 298.
Stæchas, 4, 110.
Storax, 110.
Stramonium, 6, 110.
Statificare, *quid*, 163.
Stratiotes, 81.
Stratum super stratum, *quid*, 163.
Strichnos, 86.
Styraciflua, Arbor, 76.
Styracis purificatio, 170.
Styrax, 5, 26, 77, 110.
Suber, 3.
Sublimatio, *quid*, 161.
Sublimatum, *quid*, 255.
Sublimatus dulcis, *id est* Mercurius sublimatus dulcis, 274.
Subsidentia, *quid*, 160.
Substantia regulina, *quid*. 135.
Succi, 4.
Succini præparatio, 170.
Succinum, 46, 137, 149.
Succorum defecatio, 170.
Sucre, 23.
Succus laxativus, 64.
Suie, 59.
Sulphur, 82, 137, 149.
Sumach, 110.
Suppositorium, 184, 186.
Sureau, 102.
Sus, 119, 122, 133.
Symphitum, 5, 45, 95.
Syrupus, *quid*, 184.
Absinthites compositus, 191.
anti-scorbuticus, 192.
balsamicus de Tolu, 194.
de Absinthio simplex, 187.
Aceto cum Framboesiis, 182.
Aceto Vini, 190.
Althæâ Fernelli, 192.
Agarico, *id est* de Rosis pallidis cum Sennâ & Agarico, 198.
Artemisiâ, 193.
Capillis Veneris, 187.
Cichorio cum Rheo, 194.
Corticibus Citri, 190.
Erysimo, 195.
Farfarâ, 187.
floribus Persicis, 188.
Tunicæ, 189.
Granis Kermes, 127.
Hyssopo simplex, 190.
Karabe, 197.
Kinâ-Kinâ, 189.
Melissâ simplex, 191.
Menthâ compositus, 196.
simplex, 191.
Nymphæâ, 187.
Papapere albo, 187.
erratico, 188.
Pæoniâ, 197.
Pomis solutivus, 198.
quinque Radicibus, 198.
Rhamno, 191.
Rosis pallidis, 188.
siccis. 188.
Stibio, 189.
Stæchade, 199.
succo Betonicæ, 189.

Syrupus de ſucco Braſſicæ rubræ, 189.
Cichorii, *ibidem.*
Citri, 190.
Cydoniorum, *ibidem.*
Fructuum Berberis, *ibidem.*
Fumariæ, 189.
Limonium, 190.
Mororum, 190.
Ribium, 190.
de Symphito, 199.
Hordeatus, 196.
Kermeſinus, *id eſt* de Granis Kermes, 127.
Regis Sapor, *id eſt* de Pomis ſolutivus, 198.
Stibiatus, *id eſt* de Stibio, 189.
Vermifugus, 200.
Violaceus, 188.

T.

TAbacum, 85.
Tabella, *quid*, 214.
Tabellæ antimoniales, 216.
bechicæ, 214.
de Althæâ, 214.
Mannâ, 215.
Rebechâ, *id eſt* Bechicæ, 214.
Sulphure ſimplices, 215.
Diaſulphuris, 215.
Martiales, 215.
Tacamahaca, 5, 110.
Talcum, 136, 143, 146, 150.
Talpa, 119, 133.
Tamarindus, 4, 111.
Tamariſcus, 3, 111.
Tamarix, *ibidem.*
Tamnus, 107.
Tamus, *ibidem.*
Tanacetum, 9, 111.
Taneſie, ibidem.
Tapſus, 114.
Taraxacum, 52.
Tartarum, 5.
Tartarum chalibeatum, 288.
Emeticum, 288.
Regeneratum, *id eſt* Terra foliata Tartari, 289.
Solubile, 288.
Stibiatum, *id eſt* Emeticum, 288.
Vegetabile, *id eſt* Solubile, *ibidem.*
Vitriolatum, 289.
Taupe, 133.
Taurus, 123.
Taxus, 119, 133.
Telephium, 18.
Terebinthina, 5, 11, 92, 111.
Terebinthinæ coctio, 171.
Terebinthus, 93, 108.
Terra Ampelites, 149.
Catechu, 4, 40.
Cotaria, 149.
Foliata Nitri, *id eſt* Magneſia alba, 299.
Foliata Tartari, 289.
Japonica, 40.
Lemnia, 149.
Merita, 50.
Mortua, *quid*, 161.
Pharmacitis, 149.
Sigillata, 136, 149.
Umbriæ, 136, 150.
Terre de Rémouleur, 149.
Tête de More, quid, 158.
Teſtudo, 119.
Teſſio, 100.
Teucrium, 42, 79, 93, 104.
Thalitron, 109.
Thé, 20, 31, 111.
Thea, 4, *ibidem.*
Theobroma, 32.
Theriaca, 221.
Thim, 112.
Thlaſpi, 6, 32, 111.
Thus, 5, 87.
Thymelea, 6, 112.
Thymus, 7, 107, *ibidem.*
Tilia, 8, *ibidem.*
Tilleul, ibidem.
Tincal (Borax), 142.
Tinctura, *quid*, 275.
Abſinthii, *ibidem.*
Aloës, 280.
antihiſterica, 277.
Balſami Tolutani, 280.
ſeu Balſamum Commendatoris, 276.
Benzoïni, 275.
Caſtorei, 280.
cephalica, 276.
Cinnamomi, 280.
Croci, *ibidem.*
Germanica, *id eſt* Jalappæ, 278.
Hellebori nigri, 277.
Jalappæ, 278.
Kinæ-Kinæ, 280.
Laccæ, 278.
ſeu Liquor viſceralis, 280.
Martis aperiens, 278.
Mart. cum ſucco Pomorum, 279.
Mart. Tartariſata, *id eſt* aperiens, 278.
Metallorum, 280.
Myrrhæ, 279.
Opii anodina, *id eſt* Laudanum liquidum Sydenhami, *ibidem.*
Tinctura Rutæ, 275.
Salis Tartari, 281.
Salviæ, 275.
Scordii, *ibidem.*
Succini, 280.
Tithymali ſpecies, 103.
Tithymalus, 10, 56, 112.
Tolu (*Baume de*) 26.
Toluifera, *ibidem.*
Tolutanum balſamum, 5, 26.
Topinambours, 65.
Tophus Oſteocolla, 146.
Torcular, *quid*, 158.
Tormentilla, 112.
Torrere, *quid*, 162.
Tota bona, 30.
Tortelle, 56.
Tourneſol, 283.
Toute-bonne, 67.
Tragacantha, 113.
Tragacanthi Mucago, 171.
Tragacanthum, 5, 113.
Tragoſelinum, 92.
Trainaſſe, 93.
Trefle d'eau, 81.
Tremella, 25.
Tres Flores cordiales, 153.
Trichomanes, 14.
Trifolium, 66, 77, 79, 80, 81.
Trigonella, 58.
Trique-Madame, 105.
Triſticum, 10, 62, 113.
Trochiſci albi Rhaſis, 211.
eſcharrotici de Minio, 212.
Bechici nigri, *ibidem.*
de Catechu, *ibidem.*
Scillitici, *ibidem.*
Sedantes, 216.
Trochiſcus, *quid*, 211.
Tropæolum, 84.
Trutina, *quomodo eligenda*, 156.
Tsjana-Kua, 48.
Tubularia, 121.
Tuiles, 145.
Tunica, 39.
Turbith, 3, 113.
Turpethum, *ibidem.*
Turpethum minerale, *id eſt* Mercurius præcipitatus flavus, 295.
Turquette, 66.
Tuſſilago, 9, 90, 113.
aniſata, *id eſt* Trochiſci bechici nigri, 212.
Tuthia, 150.
Tuthiæ præparatio, 166.

V.

VAcca, 119, 123.
Vaccinium 115.
Vache, 123.

Vaisseaux de rencontre, 159.
Valantia, 49.
Valeriana, 5, 84, 113.
Vanilla, 4, *ibidem.*
Vappa, *quid*. 162.
Vas circulatorium, *quid*, 159.
Veau, 123.
Veau [*Pied de*], 23.
Velard, 56.
Velvote, 54.
Venter equinus, *quid*, 159.
Vénus, 138.
Ver à Soie, 123.
Veratrum, 65.
Verbascum, 6, 114.
Verbena, 7, 114.
Verdegris, 138.
Ver de terre, 130.
Verge d'or, 114.
Vermiculaire, 105.
Vernix, 70.
Veronica, 5, 27, 54, 114.
Verrucaria, 65.
Verveine, 114.
Vervex, 131.
Vesica, *quid*, 158.
Vesse de Loup, 48.
Vicia, 57.
Vif argent, 145.
Vigne, 115.
Vinca, 90.
Vincetoxicum [Asclepias], 23.
Vinum, 4, 115.
Absinthites, 179.
Antimoniale, *id est* Emeticum, 180.
Antiscorbuticum, 179.
Aromaticum, 176.
Benedictum, *id est* Emeticum, 180.
Emeticum, 180.
Viola, 10, 114.
Violettes, ibidem.
Violier, ibidem.
Viorne, 44.
Vipera, 120, 133.
Viperine, 54.
Virga aurea, 9, 114.
Viride æris, 138.
Viscum, 10, 115.
Vitalba, 44.
Vitex, 15.
Vitis, 31, 77, 89, 90, 107, 115.
Vitrioli calcinatio, 284.
Vitriolum, 136, 150, 143.
Vitriolum Martis, 184.
vomitivum, *id est* Gilla Theophrasti, 284.
Antimonii, 300.
Vitulus, 119, 123.
Vivera, 134.
Volatiles Spiritus, *quid*, 255.
Vomicæ Nuces, 4.
Vulneraria, 116.
Vulnerariæ (Herbæ) 153.
Vulpes, 119, 134.

U.

Ulmaria, 8, 115.
Ulmus, 116.
Umbilicus Veneris, *ibidem.*
Umbra, 150.
Uncia, *quid*, 155.
Unguent de la mere, *id est* Unguentum fuscum, 239.
Unguent de l'Hôpital Comtesse, *id est* Unguentum potabile viride, 244.
Unguentum, *quid*, 230.
Ægiptiacum, 238.
Album Rhasis, 237.
aureum, 238.
seu Balsamum, Arcei, 237.
Basilicum, 238.
citrinum, 238.
de Althæâ, 237.
defensivum rubrum, 239.
de Gummi Elemi, *id est* Balsamum Arcei, 237.
de Styrace, 243.
Diapompholygos, 239.
Fuscum, 239.
griseum mercuriale, 240.
Unguentum lithargyratum, 245.
Mundificativum ex Apio, 240.
neapolitanum, 241.
Nervinum, *ibidem.*
Nutritum, 242.
Ophtalmicum, 242.
populeum, 243.
Potabile viride, 244.
refrigerans Galeni, 244.
Rosatum, 243.
Tripharmacum, *id est* Nutritum, 242.
Uniones, 127.
Ursus, 119, 133.
Urtica, 9, 72, 116.
Uva crispa, 63.
Uva Ursi, 6, 116.
Uvæ passæ, 89.

W.

Wambon, 58.
Winterania, 35.
Winteranus (Cortex) 3, 47.
Winteranus spurius, 25.
Wismuthum, *id est* Bismuthum, 141.

X.

X. *Id est* Talcum, 150.
Xeranthemes, 37.
Xylobalsamum, 3, 26.
Xylon, 30.

Z.

Zedoaria, 3, 117.
Zedoariæ Semen, 12.
Zerumbeth, 117.
Zibethum, 119, 134.
Zincum, 137, 142, 150.
Zinziber, 3, 117.
Zizyphus, 70.
Zoologia, *quid*, 118.

FINIS.

ERRATA.

PAg. 6, *Lin.* 2, *Col.* 2, Citrulus, *lege* Citrullus.
——— 24, ——— 15, Kempf. *lege* Kæmpf.
——— 24, ——— 23-28, Attriplex, *lege* Atriplex.
——— 31, ——— 8, *idem.*
——— 32, ——— 9, differt, *lege* non differt.
——— 34, ——— 27, Amen. *lege* Amœn.
——— 37, ——— 14, Hemorhoïdalis, *lege* Hæmorrhoïdal is.
——— 37, ——— 25, Xerantemos, *lege* Xeranthemos.
——— 71, ——— 9, *le Giroflier*, lege *la Giroflée.*
——— 83, ——— 24, *Myrthe*, lege *Myrte.*
——— 83, ——— 24-28, Myrthus, *lege* Myrtus.
——— 87, ——— 31 & 32, Oriza, *lege* Oryza.
——— 103, ——— 23, Satiryum, *lege* Satyrium.
——— 176, ——— 15, infsfionem, *lege* infufionem.
——— 217, ——— 7, trajiciendos, *lege* trajiciendo.
——— 264, ——— 28, gutas, *lege* guttas.
——— 284, ——— 25, Aqua fortis, *lege* Spiritus & Oleum Vitrioli.
——— 190, ——— 22, *Pintas ij*, lege *Pintas iiij.*